

ANUARI ORNITOLÒGIC DE LES BALEARS



2024

VOLUM 39

ISSN: 1137-831X

ANUARI ORNITOLÒGIC DE LES BALEARS

2024, volum 39

Revista d'observació, estudi i conservació dels aucells

Edita

GRUP BALEAR D'ORNITOLOGIA I DEFENSA DE LA NATURALESA (GOB)
C. Manuel Sanchis Guarnier 10. 07004 Palma (Balears). Espanya
Tel. 971 496060. Fax 971 496078 www.gobmallorca.com

Editor

CARLES LÓPEZ-JURADO. GOB Mallorca. Palma. carlesljm@gmail.com

Comitè editorial

DANIEL HINCKLEY. Florida Ornithological Society. dnhvicom@yahoo.com
FÉLIX DE PABLO. felixdepb@gmail.com
JOAN CARLES PALERM. Grup d'Estudis de la Naturalesa
GEN-GOB Eivissa. jcpalerm@gengob.org
LLUÍS PARPAL. GOB Mallorca. luisparpal@hotmail.com
GUILLEM X. PONS. Departament de Geografia, UIB.
Palma. guillemx.pons@uib.es

Evaluació de textos (volum 39) ha estat realitzada pels especialistes:

OSCAR GORDO, ogvilloslada@gmail.com
STEVE NICOLL, estebannic74@hotmail.com

Traduccions:

BRUGUERS JARDI, bruguers.jardi@gmail.com
STEVE NICOLL, estebannic74@hotmail.com
XESCA RIERA, xesca.rm@gmail.com

Indexat a: Indicadores de Ciencia y Tecnología (ICYT), i
el Directori Latindex (IEDCYT; CSIC)

Disponible a Internet en format pdf:

www.gobmallorca.com/ornit/anuari

Portada: Vitrac siberià de Hemprich, *Saxicola maurus hemprichii*,
mascle de primer hivern, Parc Nacional de Cabrera,
20 d'octubre de 2024. Foto: Juan J. Bazán

Impresa ISSN: 1137-831X

ISSN Online: 2174-4998

Dipòsit Legal: PM 681-1987

Actual: agost de 2025 volum 39

Freqüència: anual

Impressió: esment impremta

Impress en: Paper ecològic ECF

Patrocinat per:



ANUARI ORNITOLÒGIC DE LES BALEARS, 2024. Volum 39

ÍNDEX

Articles

- 1 Estudi de la migració postnupcial d'aus a sa Dragonera mitjançant gravadores acústiques automatitzades: resum de 3 anys de seguiment**
Study of the postnuptial migration of birds through Sa Dragonera using automated acoustic recorders: summary of 3 years of follow-up
REBASSA, M. i MOSS, J.

Notes breus

- 19 Censo de aves invernantes en Baleares, enero 2025**
Census of wintering birds in the Balearics, January 2025
MOUSSA P., MÉNDEZ X., SUÁREZ M., i CARDONA, E.
- 38 Primera observación de tarabilla siberiana *Saxicola maurus hemprichii* en Baleares**
*First observation of Siberian Stonechat *Saxicola maurus hemprichii* in the Balearics*
BAZÁN, J.J.

Altres

- 43 Observacions d'aus rares a les Balears al 2024**
Accepted Balearic bird rarities in the Balearics 2024 report
LÓPEZ-JURADO C., REBASSA M., GARCÍA-FEBRERO O., NICOLL S., GARCÍAS, P., i McMINN, M.
- 62 Novetats ornitològiques de 2024**
Ornithological developments in 2024
HINCKLEY D., LÓPEZ-JURADO C., MOSS J., MARTÍNEZ O., CAULES S., VERGER A., i VILLALONGA, R.
- 246 Ressenyes bibliogràfiques**
Books reviews
JARDI B., MANCHADO J., GARCÍAS P.J., i SUÁREZ, M.
- 255 Annex I: Resum meteorològic**
Meteorological summary
- 266 Annex II: Estatut de l'Avifauna Balear**
Status of the Balearic birdlife
- 278 Annex III: Llista de rareses**
List of rarities
- 283 Índex de espècies, subespècies i noms comuns**
Index of species, subspecies and common names

ESTUDI DE LA MIGRACIÓ POSTNUPCIAL D'AUS A SA DRAGONERA MITJANÇANT GRAVADORES ACÚSTIQUES AUTOMATITZADES: RESUM DE 3 ANYS DE SEGUIMENT

Maties REBASSA¹ i Jason MOSS²

SUMMARY.- *Study of the postnuptial migration of birds through Sa Dragonera using automated acoustic recorders: summary of 3 years of follow-up.* The monitoring of bird movements through remote sensing equipment such as programmable acoustic recording devices has become a common and popular practice in recent years, due to improvements in useability and affordability of such devices. The use of acoustic devices has proved particularly interesting for monitoring the nocturnal migrations of birds, colloquially known as NOCMIG. Here we present the results of 3 years of acoustic monitoring of bird migrations during the autumns of 2021 to 2023, on the island of Sa Dragonera. The study yielded a total of 19.518 detections of migratory birds, pertaining to 77 different species. The recordings were made from 30 minutes before sunset until 30 minutes after sunrise, thus covering all nocturnal hours and a small period of dusk and dawn. Our study has shown acoustic monitoring as highly effective as a tool for monitoring bird migration, demonstrating the phenology of many migratory species, as well as revealing many migratory species that were previously unrecorded through traditional monitoring on Sa Dragonera.

Key words: NOCMIG, programmable acoustic recording, nocturnal migration, Dragonera Island, Balearic Islands.

RESUM.- El seguiment dels moviments de les aus mitjançant equips de teledetecció, com els dispositius d'enregistrament acústic programables, s'ha convertit en una pràctica comuna i popular en els darrers anys gràcies a les millores en la seva usabilitat i assequibilitat. L'ús de dispositius acústics ha resultat especialment interessant per al seguiment de les migracions nocturnes d'aus, conegudes col·loquialment com a NOCMIG. Presentem els resultats de tres anys de seguiment acústic de les migracions d'aus durant les tardors del 2021 al 2023 a l'illa de sa Dragonera. L'estudi va donar un total de 19.518 deteccions d'aus migratòries, que pertanyen a 77 espècies diferents. Els enregistraments es van realitzar des de 30 minuts abans del capvespre fins a 30 minuts després de l'alba, abastant així totes les hores nocturnes i un breu període entre el vespre i el clarejar. El nostre estudi ha demostrat la gran eficàcia del seguiment acústic com a eina per al seguiment de la migració d'aus, mostrant la fenologia de nombroses espècies migratòries i revelant nombroses espècies migratòries que no s'havien registrat prèviament mitjançant el seguiment tradicional a sa Dragonera.

Paraules clau: NOCMIG, enregistrament acústic programable, migració nocturna, illa sa Dragonera, Illes Balears.

Contacte: ¹ matiesrb@yahoo.es

² mossjason85@gmail.com

INTRODUCCIÓ

La majoria de les aus migratòries realitzen vols nocturns. Els importants reptes que això suposa per a les aus, tant a nivell fisiològic com comportamental, es veuen compensats pels avantatges que té a nivell evolutiu, entre els quals es poden anomenar la minva en la predació, una millor regulació hídrica, un major aprofitament de les oportunitats per a alimentar-se, així com la possibilitat d'assolir velocitats de vol més elevades (Komal et al., 2007; ALERSTAM, 2009; Muckhin et al., 2009).

Tot i que la migració nocturna d'aus és un fenomen biològic conegut des de fa molt de temps, fins fa poc no s'ha pogut investigar a fons a causa de les dificultats metodològiques existents i la impossibilitat de poder diferenciar amb garanties les espècies involucrades. Certament, els primers estudis de la migració nocturna, realitzats amb metodologies molt dispars, des d'observacions continuades del disc lunar fins a deteccions amb complexes sistemes d'infrarojos o de radar (veure, per exemple, LOWERY, 1951; CASEMENT, 1966; BRUDERER, 1994; BIEBACH *et al.*, 2000; ZEHNDER *et al.*, 2001; BAUSHEV and SINELSHIKOVA, 2007; SCHMALJOHANN *et al.*, 2009; BRUDERER *et al.*, 2018; NUSSBAUMER *et al.*, 2021), serviren per quantificar la magnitud dels vols nocturns, però no aconseguiren esbrinar la composició específica d'aquest fenomen natural.

Recentment, però, la millora i l'abaratiment dels sistemes d'enregistrament sonor nocturn, d'una banda, i l'aparició de webs i publicacions de referència que possibiliten la identificació de moltes de les espècies gravades (que sovint emeten uns reclams nocturns diferents als diürns), ha fet que s'experimenti en alguns països una veritable explosió de coneixement sobre diferents aspectes de la migració nocturna que fins fa poc restaven ocults (FARNSWORTH *et al.*, 2004; SANDERS *et al.*, 2014; HORTON *et al.*, 2015; WINGER *et al.*, 2019; GUILLINGS and SCOTT, 2021; BROTONS, 2023; VAN DOREN *et al.*, 2023; LIU *et al.*, 2024; MILLON *et al.*, 2024; VAN DOREN *et al.*, 2024; WEISSHAUPT *et al.*, 2024). S'ha de comentar igualment que s'ha descobert que una gran quantitat d'espècies, de grups filogenèticament molt allunyats, reclamen durant els seus vols nocturns (LA, 2012).

El NOCMIG (com així es coneix a l'estudi de la migració nocturna d'aus mitjançant gravadores acústiques) s'està popularitzant en diferents llocs i, atès que sa Dragonera és un "hot-spot" per a la migració, el 2021 vàrem establir allà la primera estació d'estudi nocturn de les Balears. El fet de trobar-se situat a l'extrem sud-occidental de Mallorca fa que a través seu es canalitzi bona part del flux migratori que travessa l'illa de Mallorca. A la migració tardorena o post-nupcial, és l'última terra que troben els migrants abans d'endinsar-se al mar

durant els registres. L'equip estava compost per una paràbola de metacrilat transparent de 34 cm de diàmetre i una gravadora acústica model Song Meter Mini de la marca Wildlife Acoustics, programable via bluetooth a través de l'aplicació mòbil 'Song Meter', programada per enregistrar a una freqüència de mostreig de 24 kHz i configurada a la màxima qualitat. La durada de l'enregistrament es va establir per produir fitxers de 60 minuts i així evitar la pèrdua de grans quantitats de dades en cas de fallida de la bateria. El dispositiu enregistra en mono, amb el canal d'entrada configurat a 18 dB. L'equip es va situar dins un cabàs de goma, subjecte a terra per una vareta roscada, i llatat amb pedres per tal que el vent no el fes trontollar (Figura 2). Tot i que la gravadora pot perfectament realitzar els enregistraments sense

necessitat de paràbola, es va decidir fer el muntatge complet per amplificar els senyals rebuts. L'elecció d'aquest equip d'enregistrament es va fer donat el seu disseny especial per resistir a la intempèrie.

Per a cobrir una major quantitat de migrants, es va programar la gravadora de tal manera que els enregistraments van començar sempre mitja hora abans de l'ocàs (posta del sol) i van acabar mitja hora després de l'alba (sortida del sol). D'aquesta manera es va aconseguir abastar no tan sols la totalitat de cada nit, sinó també un curt espai de temps abans i després de la nit per així poder detectar també els últims i els primers migrants diürns que van decidir fer una escala a les proximitats del Far de Llebeig. Això és especialment interessant ja que està comprovat que els migrants nocturns poden perllongar els seus



Figura 2. Equip d'enregistrament.
Figure 2. Recording equipment.

vols migratoris durant les hores de llum en cas de ser necessari, especialment quan creuen zones que, com la mar Mediterrània, actuen com a barreres geogràfiques (SCHMALJOHANN *et al.*, 2007; ALERSTAM, 2009; ADAMÍK *et al.*, 2016).

Es va fer una visita setmanal a l'illa per reemplaçar la targeta de memòria i les piles de la gravadora. Els fitxers d'àudio van ser analitzats un per un de manera manual amb el programa Audacity, que permet la visualització dels sonogrames i l'audició dels reclams gravats. L'anàlisi va ser realitzada exclusivament pels 2 autors d'aquest treball, ambdós amb molts anys d'experiència en la identificació d'ocells europeus per reclam i cant. No es va fer servir cap programa de reconeixement automàtic, doncs no s'han considerat prou fiables.

A l'estudi de la migració es varen dedicar, entre els 3 anys, 156 jornades. 40 l'any 2021 (entre el 27 de juliol i el 24 d'octubre), 56 l'any 2022 (entre el 5 d'agost i el 13 de novembre) i altres 60 l'any 2023 (entre el 22 de juliol i el 15 de novembre). El nombre total d'hores examinades ha estat de 2.130 h i 18 minuts.

Abans de passar a la secció de resultats, s'han de tenir presents alguns aspectes metodològics importants:

- Les espècies detectades que es considerava que no estaven en migració activa (com ara *Tyto alba*, *Larus michahellis*, *Icthyophaga audouinii*, *Puffinus mau-*

retanicus, *Calonectris diomedea*, *Aquila pennata*, *Falco eleonorae*, *Falco peregrinus*, *Alectoris rufa*, *Burhinus oedipnemus*, *Columba palumbus*, *Curruca balearica*, *Curruca melanocephala*, *Ptyonoprogne rupestris*, *Monticola solitarius*, *Corvus corax*), no s'han tingut en compte per a l'anàlisi de les dades.

- Per a les espècies que presenten a Dragonera tant poblacions sedentàries com migratòries (per exemple, alguns fringíl·lids, o *Turdus merula*), només apareixen les deteccions dels exemplars que semblaven estar migrant (per tipus de reclam, per horari, etc.). En alguns casos, com ara *Chloris chloris* o *Linaria cannabina*, en els que la majoria de deteccions pareixien associades a exemplars residents, s'ha optat per descartar completament aquestes espècies.
- A les poblacions migratòries, la principal dificultat va ser determinar el nombre d'individus involucrats en cada registre. En cas que no es pogués concloure la seva pertinença a més d'un individu, s'ha optat per la prudència i s'ha comptabilitzat el registre com un únic exemplar en pas. Si de les gravacions es podia concloure que estaven involucrades més de 1 au, es van comptabilitzar com a 2. Únicament en el cas de detectar grups d'aus volant juntes es van anotar 5 individus per a grups de mida relativament reduïda, i 10 per als

grups que aparentaven ser més grans. Alguns exemples de grups de mida reduïda i mida gran respectivament a <https://xeno-canto.org/937734> i <https://xeno-canto.org/937760>.

- Finalment, cal comentar que no tots els reclams gravats han estat identificables. Un nombre important (però no quantificat amb exactitud) de reclams han

quedat sense identificar. Aquests reclams no apareixen ni a les taules ni als anàlisis posteriors.

RESULTATS I DISCUSSIÓ

A continuació es presenta la taula resum (veure Taula 1) amb els resultats obtinguts, pel que fa a les espècies que podem considerar migratòries.

A.crecca	6	A.pallidus*	3	P.ochruros	44
N.nycticorax	45	A.otus	2	O.oenanthe*	3
I.minutus	10	A.flammeus	7	F.hypoleuca	2
A.cinerea	87	O.scops	1	M.striata/tyrhenica	13
A.purpurea	26	A.arvensis	42	S.rubicola*	103
Ardea sp	3	D.urbicum*	5	S.vulgaris	51
E.garzetta	16	H.rustica*	31	S.atricapilla*	6
C.aeruginosus*	3	A.pratensis*	854	C.iberiae/cantillans*	4
F.tinnunculus*	12	A.hodgsoni*	2	C.undata*	4
P.porzana	1	A.cervinus*	2	Curruca sp*	1
G.choropus	1	A.spinoletta*	8	P.trochilus	23
F.atra	1	A.trivialis	314	P.collybita	138
R.avosetta	5	A.campestris*	7	P.inornatus*	1
C.dubius	2	M.flava*	1.036	R.ignicapillus	25
C.morinellus	2	M.cinerea*	61	F.coelebs*	794
A.interpres	2	M.alba*	587	F.montifringilla*	5
A.hypoleucos	25	P.modularis	57	C.carduelis*	236
T.nebularia	5	P.collaris	4	S.spinus*	371
T.ochropus	3	E.rubecula	883	C.coccothraustes	20
T.glareola	2	T.philomelos	13.194	L.curvirostra*	4
C.alpina	1	T.merula	17	S.serinus*	128
C.ferruginea	1	T.torquatus	27	E.hortulana	8
N.phaeopus	1	T.iliculus	85	E.cirlus	1
L.lapponica	2	T.pilaris	1	E.citrinella	5
C.ridibundus	1	T.viscivorus	6	E.schoeniclus	6
A.atthis*	4	Turdus sp	5	E.calandra	8
A.apus*	6	P.phoenicurus	9		
				EXEMPLARS	19.518
				ESPÈCIES	77

Taula 1. Resultats del pas migratori sobre Dragonera, tardors de 2021, 2022, i 2023. Amb asterisc les espècies que es varen detectar únicament (o de manera clarament majoritària) a sortida i posta de sol, ja amb llum natural.

Table 1. Results of the migratory passage over Dragonera during the autumns of 2021, 2022, and 2023. The species that were detected only (or clearly in the majority) at sunrise and sunset with natural light are indicated with an asterisk




Figura 3. Fenologia del pas migratori post-nupcial sobre l'illa de Dragonera, anys 2021 a 2023.

Figure 3. Phenology of the post-nuptial migratory passage on Dragonera, 2021 to 2023.

El nombre d'aus en migració detectades i identificades va ser de 19.518, pertanyents a un mínim de 77 espècies migratòries (no es tenen en compte les que es varen registrar a nivell de gènere). El volum de migrants va anar incrementant des de finals de juliol fins a la tercera desena d'octubre, per minvar una mica des d'aquest moment fins a mitjans de novembre (Figura 3).

Durant tot el període de mostreig es varen detectar aus en pas migratori, si bé el pas va ser molt poc aparent fins a les darreries d'agost. Entre acabaments d'agost i començaments d'octubre es detecta una corba normal que reflexa el pas dels migrants trans-saharians, que assoleix el seu màxim a mitjans setembre (Figura 4). En paral·lel a la baixada del pas migratori

dels trans-saharians apareix una segona corba normal que reflecteix el pas de les aus pre-saharianes a partir de finals de setembre. Aquest pas de pre-saharians s'intensifica durant tot el mes d'octubre, per decaure lentament dins novembre. A mitjans novembre, que és quan es va deixar de gravar, el pas encara era significatiu, especialment de *Turdus philomelos*, *Anthus pratensis* i *Fringilla coelebs*. Pel que fa al nombre d'espècies diàries, el màxim es va donar curiosament dins els darrers dies de l'estudi (Figura 3), el que demostra que la migració encara resulta ben aparent a mitjans novembre.

A continuació es mostren vàries gràfiques que exemplifiquen el pas diferencial entre aus trans-saharianes (representades aquí per




Figura 4. Fenologia del pas migratori post-nupcial d'espècies pre i trans-saharianes sobre l'illa de Dragonera, anys 2021 a 2023. Com a espècies trans-saharianes s'han considerat: *A.apus*, *A.pallidus*, *D.urbicum*, *H.rustica*, *A.trivialis*, *A.campestris*, *M.flava*, *Ph.phoenicurus*, *O.oenanthe*, *F.hypoleuca*, *M. striata/tyrrhenica*, *C.iberiae/cantillans*, *Ph.trochilus* i *E.hortulana*. Com a espècies pre-saharianes: *A.atthis*, *A.otus*, *A.flammeus*, *A.arvensis*, *A.pratensis*, *A.spinoletta*, *M.cinerea*, *M.alba*, *Pr.modularis*, *Pr.collaris*, *E.rubecula*, *T.philomelos*, *T.merula*, *T.torquatus*, *T.iliculus*, *T.pilaris*, *T.viscivorus*, *Ph.ochruros*, *S.rubicola*, *S.vulgaris*, *S.atricapilla*, *C.undata*, *Ph.collybita*, *R.ignicapillus*, *Fr.coelebs*, *Fr.montifringilla*, *C.carduelis*, *S.spinus*, *C.coccothraustes*, *L.curvirostra*, *S.serinus*, *E.cirlus*, *E.citrinella*, *E.schoeniclus* i *E.calandra*.

Figure 4. Phenology of the post-nuptial migratory passage of pre and trans-Saharan species on Dragonera, 2021 to 2023. The following trans-Saharan species have been considered: *A.apus*, *A.pallidus*, *D.urbicum*, *H.rustica*, *A.trivialis*, *A.campestris*, *M.flava*, *Ph.phoenicurus*, *O.oenanthe*, *F.hypoleuca*, *M. striata/tyrrhenica*, *C.iberiae/cantillans*, *Ph.trochilus* i *E.hortulana*. Considered pre-saharan species: *A.atthis*, *A.otus*, *A.flammeus*, *A.arvensis*, *A.pratensis*, *A.spinoletta*, *M.cinerea*, *M.alba*, *Pr.modularis*, *Pr.collaris*, *E.rubecula*, *T.philomelos*, *T.merula*, *T.torquatus*, *T.iliculus*, *T.pilaris*, *T.viscivorus*, *Ph.ochruros*, *S.rubicola*, *S.vulgaris*, *S.atricapilla*, *C.undata*, *Ph.collybita*, *R.ignicapillus*, *Fr.coelebs*, *Fr.montifringilla*, *C.carduelis*, *S.spinus*, *C.coccothraustes*, *L.curvirostra*, *S.serinus*, *E.cirlus*, *E.citrinella*, *E.schoeniclus* i *E.calandra*.

Motacilla flava i *Anthus trivialis*) i pre-saharianes (es mostra el pas de *Turdus philomelos* i *Spinus spinus*). A les gràfiques es mostra la mitjana diària del pas migratori d'aquestes 4 espècies entre els anys 2021 i 2023.

En el cas de *M. flava* (Figura 5) els primers migrants es varen detectar el 28 d'agost, el pas es fa especialment intens dins els primers 15 dies de setembre, i davalla molt significativament a partir dels primers dies d'octubre, amb una darrera




Figura 5. Fenologia del pas post-nupcial de *Motacilla flava* sobre l'illa de Dragonera, anys 2021 a 2023.
Figure 5. Phenology of the post-nuptial passage of *Motacilla flava* on Dragonera, 2021 to 2023.




Figura 6. Fenologia del pas post-nupcial d'*Anthus trivialis* sobre l'illa de Dragonera, anys 2021 a 2023.
Figure 6. Phenology of the post-nuptial passage of *Anthus trivialis* on Dragonera, 2021 to 2023.

dada de dia 22 d'aquell mes. S'ha de comentar que la gran majoria de migrants d'aquesta espècie es varen detectar a la matinada, ja amb llum natural, el que denota una migració principalment diürna en aquesta espècie. La fenologia del pas migratori d'*Anthus trivialis* (Figura 6) és bastant similar, si bé s'allarga una mica més, amb observacions esporàdiques gairebé fins a acabaments d'octubre, i amb 2 registres aïllats a mitjans de novembre, molt tardans. Molts exemplars d'aquesta espècie es varen registrar de dia, però també durant la nit, donat que aquesta espècie té al mediterrani una migració predominantment nocturna (veure <https://soundapproach.co.uk/tree-pipit/>).

És interessant destacar el fet que les fenologies detectades mitjançant aquesta tècnica recullen i fins i tot amplien les detectades i publicades mitjançant campanyes d'anellament, realitzades tant a Cabrera (GARCÍAS, 2000) com a la mateixa illa de Dragonera (en el cas d'*Anthus trivialis*, BONNIN, 2007). També semblen mostrar un avançament en el pic de la migració d'aquestes espècies trans-saharianes, aspecte aquest que caldria investigar en el futur per saber si és purament circumstancial o si podria obeir a un canvi real en la fenologia migratòria d'aquestes espècies, tal i com ja s'ha documentat en altres estudis (MEZQUIDA *et al.*, 2007; MILES *et al.*, 2017).




Figura 7. Fenologia del pas post-nupcial de *Turdus philomelos* sobre l'illa de Dragonera, anys 2021 a 2023.

Figure 7. Phenology of the post-nuptial passage of *Turdus philomelos* on Dragonera, 2021 to 2023.




Figura 8. Comparativa de la intensitat del pas de *Turdus philomelos* en els 3 anys de l'estudi. Cada barra mostra la mitjana d'exemplars diaris detectats. L'any 2021 no es va mostrejar al novembre.

Figure 8. Comparison of the passage intensity of Turdus philomelos during the 3 years of the study. Each bar shows the average number of daily birds detected. No sampling was carried out in November 2021.

T. philomelos (Figura 7) es detecta per primera vegada el 15 de setembre, però el pas no és aparent fins als primers dies d'octubre. El pas és molt intens a partir de la segona setmana d'aquell mes, i quan acaben les gravacions (mitjans novembre) segueixen passant tords en gran nombre. A la gràfica es poden apreciar molt bé les fluctuacions del pas. Sovint, els vespres de forta migració eren precedits per altres de migració fluixa o molt fluixa. Aquest pas migratori "en onades", sovint condicionades per la meteorologia local o regional, sembla no ser exclusiu dels tords i en canvi produir-se sovint per a la generalitat de les espècies, si bé de

vegades també es pot donar el pas continu de migrants, especialment si les condicions meteorològiques no resulten adverses (ZEHNDER *et al.*, 2001; SCHMALJOHANN *et al.*, 2009; LA SORTE *et al.*, 2015; DOSSMAN *et al.*, 2016; SJÖBERG *et al.*, 2017; MÜLLER *et al.*, 2018; PACKMORE *et al.*, 2020; CHMURA *et al.*, 2020; NUSSBAUMER *et al.*, 2021; NUSSBAUMER *et al.*, 2024). Igualment, hi va haver notables diferències en la intensitat del pas de *T. philomelos* entre els 3 anys, essent el 2021 especialment bo respecte als altres 2. A la figura 8 es pot veure com aquell primer any el pas va ser molt més intens (es va deixar de mostrejar abans, i per això no hi ha dades del novembre),

mentre que el 2023 va ser l'any amb el pas més fluix.

En el cas del llunonet (*Spinus spinus*), el pas es detecta a partir de la segona setmana d'octubre (Figura 9), i es manté en una intensitat més o menys estable (amb alts i baixos) fins al novembre.

Una vegada més, la fenologia detectada per a aquestes espècies s'ajusta molt bé, i fins i tot amplia, la detectada mitjançant campanyes d'anellament a Cabrera (GARCÍAS, 2020) i Dragonera (GARCÍAS, 1995; BONNIN, 2007). Això demostra, de nou, el potencial d'aquesta metodologia per a afinar les fenologies migratòries de les diverses espècies, sense la necessitat que les aus hagin d'aturar per a ser detectades.

A la taula 2 es fa una comparativa entre la composició específica,

per famílies, entre diferents estudis realitzats a l'illa de Dragonera. Concretament, es comparen les dades de les campanyes d'anellament post-nupcial efectuades a Dragonera entre els anys 1997 i 2006, inclosos (a partir de BONNIN, 2007), i les del present treball.

Com es pot veure, depenent de les famílies que es vulguin monitoritzar, pot resultar més adequat optar per una o altra metodologia d'estudi. Per als sílvids les dades obtingudes amb l'anellament són notablement millors, en canvi per a altres famílies d'aus el NOCMIG presenta unes dades més elevades. Entre aquestes cal destacar els ardeïds, els ràl·lids, les famílies d'aus limícoles, alguns túrdids i, molt especialment, els motacíl·lids.




Figura 9. Fenologia del pas post-nupcial de *Spinus spinus* sobre l'illa de Dragonera, anys 2021 a 2023.

Figure 9. Phenology of the post-nuptial passage of *Spinus spinus* on Dragonera, 2021 to 2023.

Família	ANELLAMENT 1997 - 2006		NOCMIG 2021 - 2023	
	% Exemplars	Espècies	% Exemplars	Espècies
Anatidae	-	-	0,03	1
Phasianidae	0,01	1	-	-
Ardeidae	-	-	0,95	5
Accipitridae	-	-	0,02	1
Falconidae	0,19	1	0,05	1
Rallidae	-	-	0,02	3
Recurvirostridae	-	-	0,03	1
Charadriidae	-	-	0,02	2
Scolopacidae	0,02	2	0,22	9
Laridae	-	-	0,01	1
Columbidae	0,01	1	-	-
Alcedinidae	0,15	1	0,02	1
Apodidae	-	-	0,04	2
Strigidae	0,28	2	0,04	3
Caprimulgidae	0,01	1	-	-
Upupidae	0,07	1	-	-
Picidae	0,04	1	-	-
Alaudidae	0,03	1	0,22	1
Hirundinidae	0,11	1	0,18	2
Motacillidae	0,35	6	14,74	9
Prunellidae	0,22	1	0,31	2
Turdidae	62,42	12	73,63	11
Muscicapidae	1,91	3	0,08	2
Sturnidae	1,68	1	0,25	1
Sylviidae	24,62	18	1,02	7
Paridae	0,01	1	-	-
Passeridae	0,21	2	-	-
Fringillidae	7,57	8	7,98	7
Embericidae	0,09	5	0,14	5
	100 %	70	100 %	77

Taula 2. Comparativa de la composició del pas migratori detectat sobre l'illa de Dragonera mitjançant campanyes d'anellament (anys 1997 a 2006) i campanyes NOCMIG (2021 a 2023). Dades de les campanyes d'anellament extretes de BONNIN (2007).

Table 2. Comparison of the composition of the migratory passage detected on Dragonera throughout ringing campaigns (1997 to 2006) and NOCMIG campaigns (2021 to 2023). Data from the ringing campaigns extracted from BONNIN (2007).

En qualsevol cas, s'ha de ser molt cautelós amb les comparatives, per mor de les peculiaritats que presenta cada mètode de mostreig.

Finalment, entre les espècies més escasses que han estat detectades en aquest estudi es podrien destacar les següents: *Porzana porzana* (1 exemplar el 3 d'octubre de 2022), *Charadrius morinellus* (2 exemplars el 14 de setembre de 2021), *Anthus hodgsoni* (2 aus, el 20 i el 27 d'octubre de 2022), *Anthus cervinus* (2 exemplars el 17 de setembre i el 21 d'octubre de 2021), *Prunella collaris* (3 aus el 19 d'octubre de 2022 i 1 au el 20 d'octubre de 2021), *Turdus pilaris* (1 el 29 d'octubre de 2022), *Phylloscopus inornatus* (6 de novembre de 2023), *Emberiza citrinella* (1 au el 7 d'octubre, i altres 4 el 7 de novembre de 2022) o *Emberiza schoeniclus* (6 aus entre el 7 i el 13 de novembre, anys 2022 i 2023). També són dignes de ser destacades les xifres assolides per altres migrants relativament escassos a les Balears, com ara 10 *Ixobrychus minutus* (inclòs el pas d'un grup el 20 d'octubre de 2023, la primera vegada que es documenta el pas gregari d'aquesta espècie per Balears), 85 *Turdus iliacus* (amb el pas concentrat al novembre), 5 *Fringilla montifringilla*, 20 *Coccothraustes coccothraustes*, o 8 *Emberiza hortulana*.

Amb tot, queda clar que l'estudi de la migració mitjançant gravadores acústiques automatitzades s'està revelant com una tècnica molt potent que de ben segur, si s'aplica

amb regularitat, augmentarà notablement el nostre coneixement del fenomen migratori de les aus per les nostres Illes. S'ha de recordar que ja hi ha treballs que demostren clarament com les dades obtingudes amb aquest tipus d'estudis reflecteixen fidelment tant la fenologia de les espècies migratòries com la intensitat del pas (FARNSWORTH *et al.*, 2004; SANDERS *et al.*, 2014; VAN DOREN *et al.*, 2023; Giuntini *et al.*, 2024; LIU *et al.*, 2024; WEISSHAUPT *et al.*, 2024), almenys per a les espècies que presenten vocalitzacions nocturnes, que són moltes.

Serà també interessant l'acumulació interanual de dades per saber, tal i com ja s'ha postulat (CHMURA *et al.*, 2020), si la migració post-nupcial pot veure's fenològicament alterada en el futur pel canvi climàtic. No és aquest l'únic interrogant que queda encara per resoldre. Es sap (BRUDERER *et al.*, 2018) que precisament per damunt de les Illes Balears un important contingent d'aus passa en vol nocturn sense aturar, a altures excepcionalment altes (especialment durant la primavera, quan s'han detectat altures entre els 6.000 i els 9.000 metres) i, per tant, les seves vocalitzacions quedarien fora de l'abast de les gravadores a nivell de terra. Caldria, doncs, determinar si la fracció d'aus que passen més baixes és representativa de tota la columna migratòria, qüestió a la que les tècniques actuals no semblen estar en disposició de donar resposta. Per a altres interrogants,

l'estudi nocturn amb gravadores acústiques automatitzades comença a donar els seus primers fruits.

AGRAÏMENTS

Aquest projecte ha estat finançat amb càrrec als pressuposts del Parc Natural de Dragonera. Moltes gràcies a la seva directora (Pilar Gómez) i a totes les persones que ens han ajudat amb la logística del treball, particularment a Sergi, Llorenç, Paco i Emili. El nostre agraïment també a totes les persones que ens han ajudat a identificar alguns reclams difícils, a Patrick Moussa per la cessió de la paràbola, a Carlos López-Jurado pels seus comentaris sobre els primers esborranys d'aquest article, i a Òscar Gordo per la revisió crítica del treball, el que ha permès la seva millora.

BIBLIOGRAFIA

- ADAMÍK, P., EMMENEGGER, T., BRIEDIS, M., GUSTAFSSON, L., HENSHAW, I., KRIST, M., LAAKSONEN, T., LIECHTI, F., PROCHÁZKA, T., SALEWSKI, V & HAHN, S. 2016. Barrier crossing in small avian migrants: individual tracking reveals prolonged nocturnal flights into the day as a common migratory strategy. *Sci Rep* 6, 21560. <https://doi.org/10.1038/srep21560>
- ALERSTAM, TH. 2009. Flight by night or day? Optimal daily timing of bird migration, *Journal of Theoretical Biology*, Volume 258, Issue 4, 2009, Pages 530-536, ISSN 0022-5193. <https://doi.org/10.1016/j.jtbi.2009.01.020>
- BAUSHEV, A.N. & SINELSCHIKOVA, A. 2007. On a probabilistic model for the numerical estimation of nocturnal migration of birds, *Mathematical Biosciences*, Volume 205, Issue 1: 44-58, ISSN 0025-5564. <https://doi.org/10.1016/j.mbs.2006.01.001>
- BIEBACH, H., BIEBACH, I., FRIEDRICH, W., HEINE, G., PARTECKE, J. & SCHMIDL, D. 2000. Strategies of passerine migration across the Mediterranean Sea and the Sahara Desert: a radar study. *Ibis*, 142: 623-634. <https://doi.org/10.1111/j.1474-919X.2000.tb04462.x>
- BONNIN, J. 2007. La migració postnupcial al parc natural de sa Dragonera 1997-2006. *Anuari Ornitològic de les Balears* 2006, 21: 15-42.
- BROTONS, LI. 2023. La migració nocturna dels ocells a Solsona. *Oppidum. Revista Cultural del Solsonès*, 21: 116-129, <https://ornitologia.org/mm/file/Oppidum%2021%207è%20article%204.pdf>
- BRUDERER, B. 1994. Nocturnal bird migration in the Negev (Israel)—a tracking radar study. *Ostrich*, 65(2), 204-212. <https://doi.org/10.1080/00306525.1994.9639683>
- BRUDERER, B., PETER, D. & KORNER-NIEVERGELT, F. 2018. Vertical distribution of bird migration between the Baltic Sea and the Sahara. *J Ornithol*, 159: 315-336. <https://doi.org/10.1007/s10336-017-1506-z>
- CASEMENT, M.B. 1966. Migration across the mediterranean observed by radar. *Ibis*, 108: 461-491. <https://doi.org/10.1111/j.1474-919X.1966.tb07205.x>

- CHMURA, H.E., KRAUSE, J.S., PÉREZ, J.H., RAMENOFKY, M. & WINGFIELD, J.C. 2020. Autumn migratory departure is influenced by reproductive timing and weather in an Arctic passerine. *J Ornithol* 161, 779–791. <https://doi.org/10.1007/s10336-020-01754-z>
- DOSSMAN, B.C., MITCHELL, G.W., NORRIS, D.N., TAYLOR, P.D., GUGLIELMO, C.G., MATTHEWS, S.N. & RODEWALD, P.G. 2016. The effects of wind and fuel stores on stopover departure behavior across a migratory barrier, *Behavioral Ecology*, Volume 27, Issue 2, March–April 2016, 567–574, <https://doi.org/10.1093/beheco/arv189>
- FARNSWORTH, A., GAUTHREAUX, JR., S.A. & BLARICOM, D.V. 2004. A comparison of nocturnal call counts of migrating birds and reflectivity measurements on Doppler radar. *Journal of Avian Biology*, 35: 365–369. <https://doi.org/10.1111/j.0908-8857.2004.03180.x>
- GARCÍAS, P. 1995. La migració postnupcial de passeriformes a través de l'illa de sa Dragonera. *Anuari Ornitològic de les Balears* 1994, 9: 21–42.
- GARCÍAS, P. 2000. La migración de las aves a través del archipiélago de Cabrera. In: Pons, G.X. (Ed.), *Las aves del Parque Nacional marítimo-terrestre del archipiélago de Cabrera (Illes Balears, España)*. GOB. Ministerio de Medio Ambiente. (131–180).
- GILLINGS, S. & SCOTT, C. 2021. Nocturnal flight calling behaviour of thrushes in relation to artificial light at night. *Ibis*, 163: 1379–1393. <https://doi.org/10.1111/ibi.12955>
- GIUNTINI, S., SAARI, J., MARTINOLI, A., PRE-ATONI, D.G., HAEST, B., SCHMID, B. & WEISSHAUPT, N. 2024. Quantifying nocturnal thrush migration using sensor data fusion between acoustics and vertical-looking radar. *Remote Sens Ecol Conserv*. <https://doi.org/10.1002/rse2.397>
- HORTON, K.G., SHRIVER, W.G. & BULER, J.J. 2015. A comparison of traffic estimates of nocturnal flying animals using radar, thermal imaging, and acoustic recording. *Ecological Applications*, 25: 390–401. <https://doi.org/10.1890/14-0279.1>
- KOMAL, R., KHUSHBOO, DWIVEDI, A., VAISH, V., & RANI, S. 2017. Conquering the night: understanding nocturnal migration in birds. *Biological Rhythm Research*, 48 (5): 747–755. <https://doi.org/10.1080/09291016.2017.1345452>
- LA, V.T. 2012. Diurnal and Nocturnal Birds Vocalize at Night: A Review. *The Condor*, Volume 114, Issue 2, 1 May 2012, Pages 245–257, <https://doi.org/10.1525/cond.2012.100193>
- LA SORTE, F.A., HOCHACHKA, W.M., FARNSWORTH, A., SHELDON, D., FINK, D., GEEVARGHESE, J., WINNER, K., VAN DOREN, B.M. & KELLING, S. 2015. Migration timing and its determinants for nocturnal migratory birds during autumn migration. *J. Anim. Ecol.*, 84: 1202–1212. <https://doi.org/10.1111/1365-2656.12376>
- LIU, S., TOWNSHEND, T., FARNSWORTH, A., ALEXANDER, D., TIAN, H. & HUA, F. 2024. Monitoring bird migration using nocturnal flight calls on the East Asian–Australasian Flyway: a case from Beijing. *Bird Conservation Interna-*

- ional. 2024; 34: e19. doi:10.1017/S0959270924000121
- LOWERY, G.H. 1951. The Project Gutenberg EBook of A Quantitative Study of the Nocturnal Migration of Birds. A Quantitative Study of the Nocturnal Migration of Birds. Vol. 3 No. 2. University of Kansas
- MEZQUIDA, E.T., VILLARÁN, A. & PASCUAL-PARRA, J. 2007. Timing of Autumn bird migration in central Spain in light of recent climate change. *Ardeola*, 54 (2): 251-259
- MILES, W.T., BOLTON, M., DAVIS, P., DENNIS, R., BROAD, R., ROBERTSON, I., RIDDIFORD, N.J., HARVEY, P.V., RIDDINGTON, R., SHAW, D.N. & PARNABY, D. 2017. Quantifying full phenological event distributions reveals simultaneous advances, temporal stability and delays in spring and autumn migration timing in long-distance migratory birds. *Global Change Biology*. 2017 Apr; 23 (4): 1400-14.
- MILLON, X., MERCIER, CH., TESTAERT, D. & GIRAUD, Q. 2024. Synthèse de 4 années d'écoutes nocturnes (NFC) en Limousin et utilisation de la technique des enregistrements des cris de contact pour l'étude de la migration chez les oiseaux. *Epops* 100: 64-114
- MUKHIN A., GRINKEVICH V. & HELM B. 2009. Under Cover of Darkness: Nocturnal Life of Diurnal Birds. *Journal of Biological Rhythms*. 2009, 24 (3): 225-231. doi:10.1177/0748730409335349
- MÜLLER, F., EIKENAAR, C., CRYSLER, ZJ., TAYLOR, PD. & SCHMALJOHANN, H. 2018. Nocturnal departure timing in songbirds facing distinct migratory challenges. *J Anim Ecol*. 2018; 87: 1102-1115. <https://doi.org/10.1111/1365-2656.12821>
- NUSSBAUMER, R., BAUER, S., BENOIT, L., MARIETHOZ, G., LIECHTI, F., & SCHMID, B. 2021. Quantifying year-round nocturnal bird migration with a fluid dynamics model. *J.R. Soc. Interface*, 18, 20210194. <https://doi.org/10.1098/rsif.2021.0194>
- NUSSBAUMER, R., VAN DOREN, B.M., HOCHACHKA, W.M., FARNSWORTH, A., LA SORTE, F.A., JOHNSTON, A. & DOKTER, A.M. 2024. Nocturnal avian migration drives high daily turnover but limited change in abundance on the ground. *Ecography*, 2024: e07107. <https://doi.org/10.1111/ecog.07107>
- PACKMOR, F., KLINNER, T., WOODWORTH, B.K., EIKENAAR, C. & SCHMALJOHANN, H. 2020. Stopover departure decisions in songbirds: do long-distance migrants depart earlier and more independently of weather conditions than medium-distance migrants?. *Mov Ecol* 8, 6. <https://doi.org/10.1186/s40462-020-0193-1>
- SANDERS, CL., & MENNILL, D. 2014. Acoustic monitoring of nocturnally migrating birds accurately assesses the timing and magnitude of migration through the Great Lakes, *The Condor*, Volume 116, Issue 3, 1 August 2014, Pages 371-383, <https://doi.org/10.1650/CONDOR-13-098.1>
- SCHMALJOHANN, H., LIECHTI, F. & BRUDERER, B. 2007. Daytime passerine migrants over the Sahara—are these diurnal migrants or prolonged flights of nocturnal migrants? In: Craig A (ed), *Proc. Pan African Ornithol. Congress*, Djerba, Ostrich 78: 357-362

- SCHMALJOHANN, H., LIECHTI, F. & BRUDERER, B. 2009. Trans-Sahara migrants select flight altitudes to minimize energy costs rather than water loss. *Behav Ecol Sociobiol* 63: 1609–1619 (2009). <https://doi.org/10.1007/s00265-009-0758-x>
- SJÖBERG, S., ALERSTAM, TH., ÅKESSON, S., & MUHEIM, R. 2017. Ecological factors influence timing of departures in nocturnally migrating songbirds at Falsterbo, Sweden. *Animal Behaviour*, Volume 127, Pages 253-269, ISSN 0003-3472. <https://doi.org/10.1016/j.anbehav.2017.03.007>
- VAN DOREN, B.M., LOSTANLEN, V., CRAMER, A., SALAMON, J., DOKTER, A., KELLING, S., BELLO, J. P., & FARNSWORTH, A. 2023. Automated acoustic monitoring captures timing and intensity of bird migration. *Journal of Applied Ecology*, 60: 433–444. <https://doi.org/10.1111/1365-2664.14342>
- VAN DOREN, B.M., FARNSWORTH, A., STONE, K., OSTERHAUS, D.M., DRUCKER, J. & VAN HORN, G. 2024. Nighthawk: Acoustic monitoring of nocturnal bird migration in the Americas. *Methods in Ecology and Evolution*, 15: 329–344. <https://doi.org/10.1111/2041-210X.14272>
- WEISSHAUPT, N., SAARI, J. & KOISTINEN, J. 2024 Evaluating the potential of bioacoustics in avian migration research by citizen science and weather radar observations. *Plos One* 19(3): e0299463. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0299463>
- WINGER, B.M., WEEKS, B. C., FARNSWORTH, A., JONES, A.W., HENNE, M. & WILLARD, D.E. 2019. Nocturnal flight-calling behaviour predicts vulnerability to artificial light in migratory birds. *Proc. R. Soc. B*.286. 20190364. <https://doi.org/10.1098/rspb.2019.0364>
- ZEHNDER, S., ÅKESSON, S., LIECHTI, F. & BRUDERER, B. 2001. Nocturnal autumn bird migration at Falsterbo, South Sweden. *Journal of Avian Biology*, 32: 239-248. <https://doi.org/10.1111/j.0908-8857.2001.320306.x>

(Rebut: 07,09,2024; Acceptat: 26,09,2024)

CENSO DE AVES INVERNANTES EN BALEARES ENERO 2025

Patrick MOUSSA ¹, Xavier MÉNDEZ ²,
Manolo SUÁREZ ³ y Esteban CARDONA ⁴

SUMMARY.- *Census of wintering birds in the Balearics, January 2025.* The January 2025 census covered the four largest islands (Mallorca, Menorca, Ibiza and Formentera). In total 22,894 birds of 67 species were counted; 76.92% of individuals were counted in Mallorca, 13.06% in Menorca, 8.03% in Ibiza and 1.98% in Formentera.

The most abundant species were the waterfowl with 7,619 birds, 2,743 ardeids, predominantly Cattle Egrets (*Bubulcus ibis*), 3,107 rails (rallidae) of which 1,559 where Eurasian Coots (*Fulicula atra*), 5,354 waders predominantly Golden Plovers (*Pluvialis apricaria*), Kentish Plovers (*Charadrius alexandrinus*) and Lapwings (*Vanellus vanellus*).

Key words: Waterfowl, waders, ardeids, gulls, winter census, Balearics.

RESUMEN.- *Censo de aves invernantes en Baleares, enero 2025.* A mediados de enero de 2025 se han realizados varios censos de aves invernantes, en las cuatro islas mayores (Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera).

En total se han censado 22.894 aves pertenecientes a 67 especies diferentes; el 76,93 % de los individuos se han censado en Mallorca, el 13,06 % en Menorca, el 8,03% en Ibiza y el 1,98 % en Formentera.

Las especies más abundantes son las anátidas con 7.619 ejemplares, los limícolas con 5.354 aves, con predominio de los chorlitos dorados (*Pluvialis apricaria*), los chorlitejos patinegros (*Charadrius alexandrinus*) y las avefrías (*Vanellus vanellus*), los rálidos con 3.107 aves, de los cuales 1.559 son fochas (*Fulica atra*), y las ardeidas con 2.743 ejemplares, con predominio de las garcetas bueyeras (*Ardea ibis*).

Palabras clave: acuáticas, limícolas, ardeidas, gaviotas, censo invernal, Islas Baleares.

¹ Redacción. patrick@elipsix.com

² Compilación Menorca. Societat Ornitològica de Menorca.
xabiernmendez@hotmail.com

³ Compilación Mallorca. GOB-Mallorca. ornitologia@gobmallorca.com

⁴ Compilación Ibiza y Formentera. GEN-GOB Eivissa.
estebaneivissa@gmail.com

A mediados de enero de 2025 se ha realizado el censo de aves acuáticas y limícolas principalmente en las zonas húmedas de las cuatro islas mayores de Baleares (Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera), por así como los de las ardeidas, cormoranes y gaviotas en sus dormideros. El censo se enmarca dentro del “*Monitoring Waterbirds*” que coordina el *International Waterfowl Research Bureau* (IWRB). Además, se realizó, como cada año, un censo de milanos reales (*Milvus milvus*) en dormideros, en la isla de Mallorca.


La metodología empleada se basa en la propuesta por “*Wetlands International*” (DELANY *et al.*, 1999). Las fechas para el censo fueron el fin de semana del 18 y 19 de enero, pero también se recogió información durante toda esta semana y la posterior. La metodología fue diferente en función de las dimensiones de las localidades. En las de mayor superficie se realizó con la participación de grupos pequeños de voluntarios o incluso individuos, formando equipos durante los dos días ya mencionados, mientras que las localidades más reducidas fueron visitadas a lo largo del periodo del censo. Como ha sido habitual en anteriores censos, para censar el Parque Natural de la Albufera de Mallorca, el Prat de Maristany (Alcúdia) y la Reserva Natural de la Albufereta, se empleó un helicóptero que realizó un vuelo a baja altura con un recorrido previa-

mente programado, realizando el mismo trayecto cada año, con el fin de levantar las aves en las zonas de más difícil acceso y facilitar su censo por el personal de tierra.

Como en años anteriores, en el caso de la Albufera de Mallorca, la Albufereta y el Salobrar de Campos, ciertas especies difíciles de censar, como el rascón (*Rallus aquaticus*), la gallineta común (*Gallinula chloropus*), el calamón (*Porphyrio porphyrio*) y la agachadiza común (*Gallinago gallinago*) no se han contado directamente, sino que se han estimado sus poblaciones a partir de los datos y el conocimiento de las mismas que tienen el personal del parque y de la reserva. También hay que añadir que al igual que se hizo el año pasado, no se han censado las aves marinas (fumareles, charranes o alcatraces) en los censos de cada localidad por su poca representatividad. En cuanto a las ardeidas y cormoranes, se han hecho censos tanto en las localidades como en los dormideros. No se incluyen los datos observados de cormorán moñudo (*Gulosus aristotelis*) ya que esta especie se encuentra por estas fechas en las colonias de cría.

Los promedios que aparecen en las tablas se calcularon con los resultados de los censos de enero publicados en el AOB desde 1989.

En los censos de aves acuáticas han participado un total de 164 personas, que prospectaron 69 localidades entre Mallorca con 34, Menorca con 18, Ibiza con 12



Gráfica 1. Totales de los últimos 37 años del censo de enero de 1989 a 2025 en Baleares. En color naranja el número de ejemplares y en azul el número de especies, con líneas de tendencia.

Graph 1. Totals of the last 37 years of the January census in the Balearics, from 1989 to 2025. In orange, the number of individuals, in blue, the number of species, with trendlines.

y Formentera con 5.

En el censo de milano real de Mallorca del 10 de enero, participaron un total de 34 personas que prospectaron 16 dormideros.

RESULTADOS

El total de aves censadas en Baleares alcanzó los 22.894 individuos pertenecientes a 67 especies. El número de ejemplares se encuentra por debajo del promedio de los últimos 20 años (26.415 ejemplares), y por debajo de la línea de tendencia, pero con un leve

repunte sobre el número censado del año pasado, 21.419 aves/2024 (Gráfica 1).

La distribución por islas, así el 76,92 % de las aves se han censado en Mallorca, con 17.611 aves de 66 especies. En Menorca se han contado el 13,06 %, con 2.990 ejemplares de 42 especies. En Ibiza el porcentaje de aves censadas ha supuesto el 8,03 % del total, con 1.839 aves de 37 especies. Y en Formentera ha supuesto el 1,98 % del total, con 454 aves observadas de 22 especies (Tabla 1).

Mapa	Zona	%	Total Zona	Espècies	Ans ans	Tad tad	Mar pen	Mar str	Ana cre	Ana pla	Ana acu	Spa que	Spa cly	Net ruf	Mar ang	Ayt fer
01	PN de s'Albufera	34.05	7796	57	2	243	49	251	986	735	7	3	931	69	16	5
02	PN Es Salobrar	12.02	2751	33		307	12	-	3	83	-	-	94	-	-	-
03	RN de s'Albufera	6.08	1391	39		14	2	12	42	107	5	31	29	-	-	2
04	Prat de Maristany	2.38	545	20		4		14	-	39	-	-	94	16	-	159
05	Estany des Ponts	0.80	184	8				-	-	6	-	-	-	-	-	-
06	Costa'torrent son Real'son Bauló	1.48	338	13				-	-	26	-	-	-	-	-	-
07	Vall Manacor i torrent de na Borges	0.24	55	7				-	-	17	-	-	-	-	-	-
08	Torrent, depuradora i dormidor d'Artà	0.09	20	8				1	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Torrent de Canyamel	0.09	20	6				-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Basses de Son Jordi i Son Jaumell	0.31	70	6				-	-	1	-	-	20	-	-	44
11	Porto Colom	0.08	19	7				-	-	1	-	-	-	-	-	-
12	Parc Natural de Mondragó	0.11	26	10				-	1	6	-	-	-	-	-	-
13	Platges i costa Sud	0.75	172	10				-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Estany i depuradora de Sa Vall	2.32	531	14		66		-	80	94	1	-	19	-	-	-
15	Illots na Llargu, na Cabots	0.18	42	3				-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Estany sa Sal (Colònia S.J.)	0.42	97	9		30		-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Bassa Sa Ràpita	0.26	59	6				-	3	18	-	-	27	-	-	-
18	Prat de Sant Jordi i torrents	2.53	580	15				-	-	36	-	-	-	-	-	-
19	Bassa de can Guidet	1.59	365	12		4	2	-	7	75	1	-	84	-	-	144
20	Es Carnatge, Costa i sa riera Palma	1.28	292	15				-	-	29	-	-	-	-	-	-
21	Depuradora Palma i torrent	0.16	36	11				-	-	2	-	-	-	-	-	-
22	Son Ripoll i UIB	0.26	60	1				-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Golfs Son Muntaner/Quint/Vida	0.76	174	11				-	-	79	-	-	14	-	-	-
24	Marina de Magalluf	0.10	24	8				-	-	5	-	-	-	-	-	-
25	Sta Ponça / ponent golfs i torrent	2.37	542	16				-	10	166	-	-	25	-	-	6
26	Port d'Andratx, Es Saluet i golf	0.30	68	5				-	-	59	-	-	-	-	-	-
27	Port de Sóller	0.13	29	5				-	-	25	-	-	-	-	-	-
28	Embas. de Cúber i Gorg Blau	0.12	28	3				-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Bassa de Selva	0.88	201	3				-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Bassa rec Inca	0.26	60	7				-	1	42	-	-	2	-	-	4
31	Basses Binissaleu	1.52	348	11				-	16	51	-	-	19	-	-	3
32	Basses de Son Nuviet	0.66	150	1				-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	Basses de Son Navata	2.02	463	19		4		-	3	75	-	-	22	-	-	10
34	Basses Porreres i Vilafraça	0.33	75	6		2		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Mallorca		76.92	17611	66	2	674	65	278	1152	1777	14	34	1380	85	16	377
01	s'Albufera des Grau	4.44	1017	18		2	27	98	-	54	-	-	43	6	-	1
02	Port de Maó i torrent San Joan	0.45	102	6				-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Prat de son Bou	1.24	285	17		7		1	119	71	-	-	20	-	-	-
04	Cala Galdana	0.07	15	5				-	-	3	-	-	-	-	-	-
05	Son Saura del Sud	0.41	93	6				-	22	61	-	-	-	-	-	-
06	Llurici i Es Prat	1.72	393	16			8	32	106	33	2	-	178	-	-	8
07	Salines Velles de Fornells	0.22	51	10		14		-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	La Concepció i Badia Fornells	0.26	59	9		8		-	2	-	-	-	-	-	-	-
09	Son Saura del Nord	1.89	433	19				93	3	7	-	-	206	3	-	30
10	Salines d'Addaia	1.21	277	18		49		-	-	45	1	-	3	-	-	-
11	Bassa de Morella	0.11	26	3		1		-	-	24	-	-	-	-	-	-
12	Bassa de Binissuèls	0.07	17	1				-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Binillubet	0.30	68	1				-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Sa Farola	0.22	50	1				-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Ctra Ferreries-Migjorn	0.10	23	1				-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Binifamis	0.15	34	1				-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Sa Muntanyeta	0.15	34	1				-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Sant Cristòfol i Carret	0.06	13	1				-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Menorca		13.06	2990	42	0	81	35	224	252	298	3	-	450	9	-	39
01	Salines Es Codolar	6.00	1374	27		215		-	8	-	-	-	7	-	-	1
02	Salines Es Cavallet i Ses Portes	0.63	144	12		23		-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Salines Sal Rossa	0.20	45	8		12	2	-	-	9	-	-	-	-	-	-
04	Bassa de sa Rota	0.24	55	4				-	-	-	-	-	-	-	-	-
05	Riu de Santa Eulària	0.13	29	5				-	-	20	-	-	-	-	-	-
06	Badia de St Antoni	0.01	3	3				-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Golf Roca Llisa	0.26	60	6				-	8	12	-	-	5	-	-	-
08	Ses Feixes	0.12	28	11				-	3	6	-	-	-	-	-	-
09	Prat de Vila - Prat de ses monges	0.14	32	1				-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Ses Alameres, Sant Antoni	0.18	42	1				-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Port d'Eivissa	0.03	8	3				-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Prat de St Jordi	0.08	19	1				-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Eivissa		7.91	1839	37	0	250	2	-	19	47	-	-	12	-	-	1
01	Estany Pudent i Sal. den Ferrer	1.16	265	18		19		-	11	9	-	-	-	-	-	-
02	Salines de Marroig	0.17	39	5				-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Estany des Poix i ses Bassetes	0.38	87	9		2		-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Punta Gavina	0.19	43	2				-	-	-	-	-	-	-	-	-
05	Es Carnatge	0.09	20	1				-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Formentera		1.90	454	22	0	21	0	-	11	9	-	-	-	-	-	-
Total illes Balears		22894	67	2	1026	102	502	1434	2131	17	34	1842	94	16	417	

Tabla 1 (1/6). Número de acuáticas censadas en cada localidad en enero de 2025, Estimaciones con (*), Water birds counts by localities, January 2025, Estimates with (*), Ans ans, Anser anser; Tad tad, Tadorna tadorna; Mar pen, Mareca penelope; Mar str, Mareca strepera; Ana cre, Anas crecca; Ana pla, Anas platyrhynchos; Ana acu, Anas acuta; Spa que, Spatula querquedula; Spa cly, Spatula clypeata; Net ruf, Netta Rufina; Mar ang, Marmaronetta angustirostris; Ayt fer, Aythya ferina.

Ayt nyr	Tac ruf	Pod cri	Pod nig	Pha car	Ple fal	Pla leu	Bot min	Ixo min	Nyc nyc	Ard rall	Espècies	Total Zona	Zona
-	60*	4	1	371	46	3	1	75*	129	-	57	7794	PN de s'Albufera
-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	33	2751	PN Es Salobrar
-	10*	2	-	169	-	-	-	10*	37	1	39	1391	RN de s'Albufereta
-	14	-	1	1	-	-	-	-	-	-	20	545	Prat de Maristany
-	4	2	-	11	-	-	-	-	-	-	8	184	Estany des Ponts
-	5	-	-	5	-	-	-	-	-	-	13	338	Costa/torrent son Real/son Bauló
-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	7	55	Torrent de na Borges
-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	20	Torrent, depuradora i dormidor d'Artà
-	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	6	20	Torrent de Canyamel
-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	6	70	Bassa de Son Jordi
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	19	Porto Colom i ports de Llevant
-	3	-	-	3	-	-	-	-	-	-	10	26	Parc Natural de Mondragó
-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	10	172	Platges i costa Sud
-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	14	531	Estanys de Sa Vall
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	42	Illots Sa Puntassa, na Liarga i na Cabots
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	97	Estany sa Sal (Colònia S.J.)
-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	59	Bassa Sa Ràpita
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	15	580	Prat de Sant Jordi i torrents
-	7	-	21	1	-	-	-	-	-	-	12	365	Bassa de can Guidet
-	-	-	-	24	-	-	-	-	-	-	15	292	Es Carnatge, Costa i Port Palma
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	11	36	Depuradora Palma
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	60	Son Ripoll i UIB
-	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	174	Golfs Son Muntaner/Quint/Vida
-	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	8	24	Marina de Magalluf
1	18	-	-	5	-	-	-	-	-	-	16	542	Sta Ponça / ponent golfs i torrent
-	3	-	-	2	-	-	-	-	-	-	5	68	Port d'Andratx, es Saluet i golf
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	29	Port de Sòller
-	-	2	-	23	-	-	-	-	-	-	3	28	Embas. de Cúber i Gorg Blau
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	3	201	Bassa de Selva
-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	60	Bassa rec Inca
-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	348	Basses Binissaleu
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	150	Basses de Son Nuviet
-	5	-	-	2	-	-	-	-	-	2	19	463	Basses de Son Navata
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	75	Basses Porreres i Vilafranca
1	176	10	33	628	46	3	1	86	166	3	66	17.611	Total Mallorca
-	115	2	20	98	-	-	-	-	-	-	18	1017	s'Albufera des Grau
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	102	Port de Mao i torrent San Joan
-	1	-	-	3	-	-	-	-	-	-	17	285	Prat de son Bou
-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	5	15	Cala Galdana
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	93	Son Saura del Sud
-	8	-	1	-	-	-	-	-	-	-	16	393	Lluriac i Es Prat
-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	10	51	Salines Velles de Fornells
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	59	La Concepció i Badia Fornells
1	3	-	-	-	-	-	-	-	4	-	19	433	Son Saura del Nord
-	1	11	2	8	-	-	-	-	-	-	18	277	Salines d'Addaia
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	26	Bassa de Morella
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	17	Bassa de Binissuëls
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	68	Santa Eularieta
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	50	Sa Farola
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	23	Ctra Ferreries-Migjorn
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	34	Binifamis
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	34	Sa Muntanyeta
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	13	Sant Cristòfol i Carret
1	129	13	23	113	-	-	-	-	4	-	42	2990	Total Menorca
-	-	-	66	6	-	-	-	-	-	-	27	1374	Salines Es Codolar
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	144	Salines Es Cavallet
-	-	-	-	15	-	-	-	-	-	-	8	45	Salines Sal Rossa
-	43	-	-	4	-	-	-	-	-	-	4	55	Bassa de sa Rota
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	29	Riu de Santa Eulària i Ses Planes
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	3	3	Badies Eivissa (Eivissa i St Antoni)
-	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	60	Golf Roca Llisa
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	28	Ses Feixes
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	32	Prat de Sant Jordi
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	42	Ses Almeres, Sant Antoni
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	3	8	Port d'Eivissa
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	19	Prat de St Jordi
-	59	-	66	27	-	-	-	-	-	-	37	1.839	Total Eivissa
-	-	-	104	35	-	-	-	-	-	-	18	265	Estany Pudent i Sal. den Ferrer
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	39	Salines de Marroig
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	9	87	Estany des Peix i ses Bassotes
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	43	Punta Gavina
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	20	Es Carnatge
-	-	-	104	36	-	-	-	-	-	-	22	454	Total Formentera
2	364	23	226	804	46	3	1	86	170	3	67	22.894	Total Illes Balears

Tabla 1 (2/6). Número de acuáticas censadas en cada localidad en enero de 2025, Estimaciones con (*), Water birds counts by localities, January 2025, Estimates with (*), Ayt nyr, *Aythya nyroca*; Tac ruf, *Tachybaptus ruficollis*; Pod cri, *Podiceps cristatus*; Pod nig, *Podiceps nigricollis*; Pha car, *Phalacrocorax carbo*; Ple fal, *Plegadis falcinellus*; Pla leu, *Platalea leucorodia*; Bot min, *Botaurus minutus*; Ixo min, *Ixobrychus minutus*; Nyc nyc, *Nycticorax nycticorax*; Ard rall, *Ardeola ralloides*.

Mapa	Zona	%	Total	Zona	Espècies	Ard ibi	Egr gar	Ard alb	Arc cin	Ard pur	Gru gru	Pho ros	Cir aer	Cir cya	Pan hal	Rai aqu
01	PN de s'Albufera	34.05	7796	57	211	159	21	18	-	33	194	173	4	3	300*	
02	PN Es Salobrar	12.02	2751	33	-	3	-	1	-	-	126	46	1	2	4	
03	RN de s'Albufera	6.08	1391	39	127	72	18	13	2	-	146	1	-	1	50*	
04	Prat de Maristany	2.38	545	20	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	10*	
05	Estany des Ponts	0.80	184	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
06	Costa/torrent son Real/son Bauló	1.48	338	13	2	3	-	2	-	-	-	-	-	-	-	
07	Vall Manacor i torrent de na Borges	0.24	55	7	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
08	Torrent, depuradora i dormidor d'Artà	0.09	20	8	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
09	Torrent de Canyamell	0.09	20	6	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	Basses de Son Jordi i Son Jaumell	0.31	70	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11	Porto Colom	0.08	19	7	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
12	Parc Natural de Mondragó	0.11	26	10	-	1	-	1	-	-	-	-	-	2	-	
13	Platges i costa Sud	0.75	172	10	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	2	
14	Estany i depuradora de Sa Vall	2.32	531	14	-	-	-	-	-	-	243	8	-	-	-	
15	Illots na Llargà, na Cabots	0.18	42	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16	Estany sa Sal (Colònia S.J.)	0.42	97	9	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
17	Bassa Sa Ràpita	0.26	59	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
18	Prat de Sant Jordi i torrents	2.53	580	15	330	3	-	3	-	-	-	2	-	-	-	
19	Bassa de can Guidet	1.59	365	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20	Es Carnatge, Costa i sa riera Palma	1.28	292	15	-	8	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
21	Depuradora Palma i torrent	0.16	36	11	-	2	-	4	-	-	-	-	-	-	-	
22	Son Ripoll i UIB	0.26	60	1	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
23	Golfs Son Muntaner/Quint/Vida	0.76	174	11	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
24	Marina de Magalluf	0.10	24	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
25	Sta Ponça / ponent golfs i torrent	2.37	542	16	2	2	-	3	-	-	-	-	-	2	-	
26	Port d'Andratx, Es Saluet i golf	0.30	68	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
27	Port de Sóller	0.13	29	5	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
28	Embas. de Cúber i Gorg Blau	0.12	28	3	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	
29	Bassa de Selva	0.88	201	3	198	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
30	Bassa rec Inca	0.26	60	7	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
31	Basses Binissalem	1.52	348	11	213	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
32	Basses de Son Nuviot	0.66	150	1	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
33	Basses de Son Navata	2.02	463	19	232	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
34	Basses Porreres i Vilafranca	0.33	75	6	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
Total Mallorca			76.92	17611	66	1535	262	39	54	2	33	709	231	5	12	366
01	s'Albufera des Grau	4.44	1017	18	-	14	9	6	-	-	-	4	-	-	-	
02	Port de Maó i torrent San Joan	0.45	102	6	70	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-	
03	Prat de son Bou	1.24	285	17	1	4	-	-	-	-	2	-	-	-	-	
04	Calà Galdana	0.07	15	5	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
05	Son Saura del Sud	0.41	93	6	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	
06	Lluriac i Es Prat	1.72	393	16	2	4	1	-	-	-	2	-	-	-	1	
07	Salines Velles de Fornells	0.22	51	10	-	1	-	1	-	12	-	-	-	-	-	
08	La Concepció i Badia Fornells	0.26	59	9	-	1	-	6	-	-	16	-	-	-	2	
09	Son Saura del Nord	1.89	433	19	-	2	-	-	-	-	3	-	-	-	6	
10	Salines d'Addala	1.21	277	18	-	2	4	7	-	-	131	1	-	1	-	
11	Bassa de Morella	0.11	26	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12	Bassa de Binissués	0.07	17	1	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13	Binillubet	0.30	68	1	68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14	Sa Farola	0.22	50	1	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15	Ctra Ferreries-Migjorn	0.10	23	1	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16	Binifamís	0.15	34	1	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
17	Sa Muntanyeta	0.15	34	1	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
18	Sant Cristòfol i Carret	0.06	13	1	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Total Menorca			13.06	2990	42	312	31	15	23	-	12	147	14	-	3	7
01	Salines Es Codolar	6.00	1374	27	1	6	1	4	-	-	830	-	-	3	-	
02	Salines Es Cavallet i Ses Portes	0.63	144	12	-	-	-	-	-	-	70	-	-	-	-	
03	Salines Sal Rossa	0.20	45	8	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	
04	Bassa de sa Rota	0.24	55	4	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
05	Riu de Santa Eulària	0.13	29	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
06	Badia de St Antoni	0.01	3	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
07	Golf Rocca Llisa	0.26	60	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
08	Ses Feixes	0.12	28	11	1	5	-	2	-	-	-	-	-	-	1	
09	Prat de Vila – Prat de ses monges	0.14	32	1	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	Ses Almeres, Sant Antoni	0.18	42	1	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11	Port d'Elvissa	0.03	8	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12	Prat de St Jordi	0.08	19	1	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Total Elvissa			7.91	1639	37	95	12	1	8	-	-	900	-	-	5	1
01	Estany Pudent i Sal. den Ferrer	1.16	265	18	-	7	-	8	-	-	23	-	-	1	-	
02	Salines de Marroig	0.17	39	5	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
03	Estany des Peix i ses Bassetes	0.38	87	9	71	5	-	2	-	-	-	-	-	-	-	
04	Punta Gavina	0.19	43	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
05	Es Carnatge	0.09	20	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Total Formentor			1.90	454	22	71	12	-	11	-	-	23	-	-	2	-
Total Illes Balears			22894	67	2013	317	55	96	2	45	1739	245	5	22	374	

Tabla 1 (3/6). Número de acuáticas censadas en cada localidad en enero de 2025, Estimaciones con (*), Water birds counts by localities, January 2025, Estimates with (*),
Ard ibi, *Ardea ibis*; Egr gar, *Egretta garzetta*; Ard alb, *Ardea alba*; Ard cin, *Ardea cinerea*;
Ard pur, *Ardea purpurea*; Gru gru, *Grus grus*; Pho ros, *Phoenicopiterus roseus*; Cir aer, *Circus aeruginosus*; Cir cya, *Circus cyaneus*; Pan hal, *Pandion haliaetus*; Ral aqu, *Rallus aquaticus*.

Por ana	Gal chl	Por por	Ful atr	Ful cri	Him him	Rec avo	Cha dub	Cha hia	Ana ale	Plu apr	Espécies	Total Zona	Zona
-	350*	300*	296	3	72	57	12	8	146	55	57	7794	PN de s'Albufera
-	-	-	-	-	80	193	-	5	195	1224	33	2751	PN Es Salobrar
-	150*	10*	36	-	28	-	-	-	67	-	39	1391	RN de s'Albufera
-	40	5*	92	-	-	-	-	-	3	-	20	545	Prat de Maristany
-	2	-	146	-	-	-	-	-	-	-	8	184	Estany des Ponts
-	3	-	31	-	-	-	-	-	224	-	13	338	Costa/torrent son Real/son Bauló
-	6	-	8	-	-	-	-	-	-	-	7	55	Torrent de na Borges
-	7	-	-	-	2	-	-	-	-	-	8	20	Torrent, depuradora i dormidor d'Artà
-	8	-	6	-	-	-	-	-	-	-	6	20	Torrent de Canyamell
-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	6	70	Bassa de Son Jordi
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	19	Porto Colom i ports de Llevant
-	4	-	4	-	-	-	-	-	-	-	10	26	Parc Natural de Mondragó
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	104	10	172	Platges i costa Sud
-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	14	531	Estany de Sa Vall
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37	3	42	Illots Sa Puntassa, na Llarga i na Cabots
-	-	-	-	-	20	-	-	2	27	-	9	97	Estany sa Sal (Colònia S.J.)
-	3	-	2	-	-	-	-	-	-	-	6	59	Bassa Sa Ràpita
-	24	-	10	-	8	-	2	4	-	32	15	580	Prat de Sant Jordi i torrents
-	-	-	11	-	-	-	-	-	-	-	12	365	Bassa de can Guidet
-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	15	292	Es Carnatge, Costa i Port Palma
-	17	-	1	-	-	-	1	-	-	-	11	36	Depuradora Palma
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	60	Son Ripoll i UIB
-	33	1	26	-	-	-	-	-	-	-	11	174	Golfs Son Muntaner/Quint/Vida
-	4	2	5	-	-	-	-	-	-	-	8	24	Marina de Magalluf
-	13	42	242	-	-	-	-	-	-	-	16	542	Sta Ponça / ponent golfs i torrent
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	5	68	Port d'Andratx, es Saluè i golf
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	29	Port de Sóller
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	28	Embas. de Cúber i Gorg Blau
-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	201	Bassa de Selva
-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	7	60	Bassa rec Inca
-	14	3	18	-	-	-	-	-	-	-	11	348	Basses Binissaleu
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	150	Basses de Son Nuviat
-	5	2	12	-	-	-	-	-	-	-	19	463	Basses de Son Navata
-	36	-	-	-	-	-	4	-	7	25	6	75	Basses Porreres i Vilafranca
-	723	365	955	3	210	250	19	19	674	1477	66	17.611	Total Mallorca
-	-	-	515	-	-	-	-	-	-	-	18	1017	s'Albufera des Grau
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	102	Port de Maó i torrent San Joan
-	6	-	32	-	1	-	-	-	8	-	17	285	Prat de son Bou
-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	15	Cala Galdana
-	1	3	4	-	-	-	-	-	-	-	6	93	Son Saura del Sud
-	2	-	5	-	-	-	-	-	-	-	16	393	Lluriac i Es Prat
-	-	-	-	-	-	-	-	1	10	-	10	51	Salines Velles de Fornells
-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	-	9	59	La Concepció i Badia Fornells
1	13	28	26	-	-	-	-	-	-	-	19	433	Son Saura del Nord
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	277	Salines d'Addaia
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	26	Bassa de Morella
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	17	Bassa de Binissués
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	68	Santa Eulària
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	50	Sa Farola
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	23	Ctra Ferreries-Miqjorn
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	34	Binifamis
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	34	Sa Muntanyeta
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	13	Sant Cristòfol i Carret
1	30	31	582	-	1	-	-	1	37	-	42	2990	Total Menorca
-	-	-	1	-	11	4	-	4	66	89	27	1374	Salines Es Codolar
-	-	-	-	-	8	-	-	-	24	-	12	144	Salines Es Cavallet
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	45	Salines Sal Rossa
-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	4	55	Bassa de sa Rota
-	6	-	1	-	-	-	-	-	-	-	5	29	Riu de Santa Eulària i Ses Planes
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	Badies Elvissa (Elvissa i St Antoni)
-	8	-	11	-	-	-	-	-	-	-	6	60	Golf Roca Llisa
-	4	-	2	-	-	-	-	-	-	-	11	28	Ses Feixes
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	32	Prat de Sant Jordi
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	42	Ses Alameres, Sant Antoni
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	8	Port d'Elvissa
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	19	Prat de St Jordi
-	18	-	22	-	19	4	-	4	90	89	37	1.839	Total Elvissa
-	3	-	-	-	1	2	-	-	33	-	18	265	Estany Pudent i Sal. den Ferrer
-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	25	5	39	Salines de Marroig
-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	9	87	Estany des Peix i ses Bassetes
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42	2	43	Punta Gavina
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	1	20	Es Carnatge
-	3	-	-	-	1	2	-	-	46	87	22	454	Total Formentera
1	774	396	1559	3	231	256	19	24	847	1653	67	22.894	Total Illes Balears

Tabla 1 (4/6). Número de acuáticas censadas en cada localidad en enero de 2025, Estimaciones con (*), Water birds counts by localities, January 2025, Estimates with (*), Por ana, *Porzana porzana*; Gal chl, *Gallinula chloropus*; Por por, *Porphyrio porphyrio*; Ful atr, *Fulica atra*; Ful cri, *Fulica cristata*; Him him, *Himantopus himantopus*; Rec avo, *Recurvirostra avosetta*; Cha dub, *Charadrius dubius*; Cha hia, *Charadrius hiaticula*; Ana ale, *Anarhynchus alexandrinus*; Plu apr, *Pluvialis apricaria*.

Mapa	Zona	%	Total Zona	Espècies	Plu squ	Van van	Cal pug	Cal min	Cal alp	Cal alb	Gal gal	Num pha	Lim lim	Num arq	Tri ery
01	PN de s'Albufera	34.05	7796	57	3	819	-	8	21	-	400+	-	1	-	31
02	PN Es Salobrar	12.02	2751	33	2	132	8	55	117	-	2	-	-	11	8
03	RN de s'Albufereta	6.08	1391	39	-	56	-	-	-	-	100+	-	-	-	-
04	Prat de Maristany	2.38	545	20	-	-	-	-	-	-	10*	-	-	-	-
05	Estany des Ponts	0.80	184	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Costa/torrent son Real/son Bauló	1.48	338	13	3	-	-	-	16	-	-	-	-	-	-
07	Val Manacor i torrent de na Borges	0.24	55	7	-	-	-	-	-	-	15	-	-	-	-
08	Torrent, depuradora i dormidor d'Artà	0.09	20	8	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
09	Torrent de Canyamel	0.09	20	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Basses de Son Jordi i Son Jaumell	0.31	70	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Porto Colom	0.08	19	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Parc Natural de Mondragó	0.11	26	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Platges i costa Sud	0.75	172	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Estany i depuradora de Sa Vall	2.32	531	14	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
15	Illots na Llargà, na Cabots	0.18	42	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Estany sa Sal (Colònia S.J.)	0.42	97	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Bassa Sa Ràpita	0.26	59	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Prat de Sant Jordi i torrents	2.53	580	15	-	40	-	-	-	-	51	-	-	-	-
19	Bassa de can Guidet	1.59	365	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Es Carnatge, Costa i sa riera Palma	1.28	292	15	-	-	-	-	5	3	1	-	-	-	-
21	Depuradora Palma i torrent	0.16	36	11	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-
22	Son Ripoll i UIB	0.26	60	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Golfs Son Muntaner/Quint/Vida	0.76	174	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Marina de Magalluf	0.10	24	8	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-
25	Sta Ponça / ponent golfs i torrent	2.37	542	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Port d'Andratx, Es Saluet i golf	0.30	68	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Port de Sóller	0.13	29	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	Embas. de Cúber i Gorg Blau	0.12	28	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Bassa de Selva	0.88	201	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Bassa rec Inca	0.26	60	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Basses Binissaleu	1.52	348	11	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
32	Basses de Son Nuvlet	0.66	150	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	Basses de Son Navata	2.02	463	19	-	80	-	-	-	-	4	-	-	-	-
34	Basses Porreres i Vilafrañca	0.33	75	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Mallorca		76.92	17611	66	8	1127	8	63	154	5	598	1	1	11	39
01	s'Albufera des Grau	4.44	1017	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Port de Maó i torrent San Joan	0.45	102	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Prat de son Bou	1.24	285	17	-	7	-	-	1	-	-	-	-	-	-
04	Cala Galdana	0.07	15	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05	Son Saura del Sud	0.41	93	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Lluriac i Es Prat	1.72	393	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Salines Velles de Fornells	0.22	51	10	2	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-
08	La Concepció i Badia Fornells	0.26	59	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Son Saura del Nord	1.89	433	19	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
10	Salines d'Addaia	1.21	277	18	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
11	Bassa de Morella	0.11	26	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Bassa de Binissués	0.07	17	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Binillubet	0.30	68	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Sa Farola	0.22	50	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Ctra Ferreries-Mijorn	0.10	23	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Binifamis	0.15	34	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Sa Muntanyeta	0.15	34	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Sant Cristòfol i Carret	0.06	13	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Menorca		13.06	2990	42	2	7	-	-	7	-	3	-	-	-	-
01	Salines Es Codolar	6.00	1374	27	2	-	-	-	3	-	3	-	-	-	-
02	Salines Es Cavallet i Ses Portes	0.63	144	12	1	-	-	-	2	1	-	-	-	-	1
03	Salines Sal Rossa	0.20	45	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Bassa de sa Rota	0.24	55	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05	Riu de Santa Eulària	0.13	29	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Badia de St Antoni	0.01	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Golf Roca Llisa	0.26	60	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Ses Feixes	0.12	28	11	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
09	Prat de Vila - Prat de ses monges	0.14	32	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Ses Almeres, Sant Antoni	0.18	42	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Port d'Eivissa	0.03	8	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Prat de St Jordi	0.08	19	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Eivissa		7.91	1839	37	3	-	-	-	5	1	4	-	-	-	1
01	Estany Pudent i Sal. den Ferrer	1.16	265	18	-	-	-	1	3	-	-	-	-	-	-
02	Salines de Marroig	0.17	39	5	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Estany des Peix i ses Bassetes	0.38	87	9	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Punta Gavina	0.19	43	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05	Es Carnatge	0.09	20	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Formentera		1.90	454	22	3	-	-	1	3	-	-	-	-	-	-
Total illes Balears		22894	67	16	1134	8	64	169	6	605	1	1	11	40	

Tabla 1 (5/6). Número de acuáticas censadas en cada localidad en enero de 2025, Estimaciones con (*), Water birds counts by localities, January 2025, Estimates with (*), Plu squ, *Pluvialis squatarola*; Van van, *Vanellus vanellus*; Cal pug, *Calidris pugnax*; Cal min, *Calidris minuta*; Cal alp, *Calidris alpina*; Cal alb, *Calidris alba*; Gal gal, *Gallinago gallinago*; Num pha, *Numenius phaeopus*; Lim lim, *Limosa limosa*; Num arq, *Numenius arquata*; Tri ery, *Tringa erythropus*.

Tri tot	Tri neb	Tri och	Act hyp	Are int	Chr gen	Chr rid	Ich aud	Lar fus	Tha san	Alc att	Espècies	Total Zona	Zona	
4	14	7	6	1	-	22	2	2	3	50*	57	7794	PN de s'Albufera	
16	7	6	3	-	-	2	-	-	-	1	33	2751	PN Es Salobrar	
1	8	1	2	-	-	19	2	-	3	5*	39	1391	RN de s'Albufereta	
-	-	-	1	-	-	24	15	-	-	2	20	545	Prat de Maristany	
-	-	-	1	-	-	12	-	-	-	-	8	184	Estany des Ponts	
-	-	-	-	11	-	-	7	-	-	-	13	338	Costa/torrent son Real/son Bauló	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	55	Torrent de na Borges	
-	-	3	1	-	-	-	-	-	-	-	8	20	Torrent, depuradora i dormidor d'Artà	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	6	20	Torrent de Canyamell	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	70	Bassa de Son Jordi	
-	-	-	1	-	-	-	13	-	1	1	7	19	Porto Colom i ports de Llevant	
-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	1	10	26	Parc Natural de Mondragó	
-	-	-	2	16	-	-	24	-	14	-	10	172	Platges i costa Sud	
-	1	3	2	-	-	-	-	-	-	-	14	531	Estany des Sa Vall	
-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	3	42	Illots Sa Puntassa, na Llargà i na Cabots	
-	-	-	1	-	1	-	14	-	-	-	9	97	Estany sa Sal (Colònia S.J.)	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	59	Bassa Sa Ràpita	
-	-	-	15	-	-	20	-	-	-	-	15	580	Prat de Sant Jordi i torrents	
-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	12	365	Bassa de can Guidet	
-	-	1	7	35	-	97	64	-	11	2	15	292	Es Carnatge, Costa i Port Palma	
-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	11	36	Depuradora Palma	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	60	Son Ripoll i UIB	
-	-	-	2	-	-	-	-	1	-	1	11	174	Golfs Son Muntaner/Quint/Vida	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	24	Marina de Magalluf	
-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	2	16	542	Sta Ponça / ponent golfs i torrent	
-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	5	68	Port d'Andratx, es Saluet i golf	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	5	29	Port de Sóller	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	28	Embas. de Cúber i Gorg Blau	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	201	Bassa de Selva	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	60	Bassa rec Inca	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	348	Basses Binissalem	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	150	Basses de Son Nuviot	
-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	19	463	Basses de Son Navata	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	75	Basses Porreres i Vilafranca	
21	30	22	60	63	1	197	149	3	32	68	66	17.611	Total Mallorca	
-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	18	1017	s'Albufera des Grau	
-	-	-	-	-	-	21	3	-	2	-	6	102	Port de Maó i torrent San Joan	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	17	285	Prat de son Bou	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	15	Cala Galdana	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	93	Son Saura del Sud	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	393	Lluriac i Es Prat	
-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	10	51	Salines Velles de Fornells	
-	3	-	2	-	-	-	-	-	-	-	9	59	La Concepció i Badia Fornells	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	19	433	Son Saura del Nord	
-	2	-	6	-	-	-	-	-	-	1	18	277	Salines d'Addaia	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	26	Bassa de Morella	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	17	Bassa de Binissués	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	68	Santa Eulària	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	50	Sa Farola	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	23	Ctra Ferreries-Migjorn	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	34	Binifamis	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	34	Sa Muntanyeta	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	13	Sant Cristòfol i Carret	
-	6	-	11	1	-	23	3	-	2	4	42	2990	Total Menorca	
1	10	1	19	-	-	11	-	-	-	1	27	1374	Salines Es Codolar	
-	3	-	5	3	-	-	3	-	-	-	12	144	Salines Es Cavallet	
-	-	1	4	-	-	-	-	-	-	-	8	45	Salines Sa Rossa	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	55	Bassa de sa Rota	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	29	Riu de Santa Eulària i Ses Planes	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	3	3	Badies Eivissa (Eivissa i St Antoni)	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	60	Golf Roca Llisa	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	11	28	Ses Feixes	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	32	Prat de Sant Jordi	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	42	Ses Almeres, Sant Antoni	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	6	-	3	8	Port d'Eivissa	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	19	Prat de St Jordi	
1	13	3	29	3	-	12	3	-	6	4	37	1.839	Total Eivissa	
-	3	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	18	265	Estany Pudent i Sal. den Ferrer
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	5	39	Salines de Marroig	
-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	9	87	Estany des Peix i ses Bassetes	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	43	Punta Gavina	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	20	Es Carnatge	
-	4	-	2	-	-	-	1	-	-	1	22	454	Total Formentera	
22	53	25	102	67	1	232	156	3	40	77	67	22.894	Total Illes Balears	

Tabla 1 (6/6). Número de acuáticas censadas en cada localidad en enero de 2025, Estimaciones con (*), Water birds counts by localities, January 2025, Estimates with (*), Tri tot, *Tringa totanus*; Tri neb, *Tringa nebularia* Tri och, *Tringa ochropus*; Act hyp, *Actitis hypoleucos*; Are int, *Arenaria interpres*; Chr gen, *Chroicocephalus genei*; Chr rid, *Chroicocephalus ridibundus*; Ich aud, *Ichthyaetus audouinii*; Lar fus, *Larus fuscus*; Tha san, *Thalas-seus sandvicensis*; Alc att, *Alcedo atthis*.

Ordenes 2025	Mallorca	Menorca	Ibiza	Formentera	Baleares
<i>Accipitriformes</i>	248	17	5	2	272
<i>Anseriformes</i>	5.855	1.392	331	41	7.619
<i>Charadriiformes</i>	5.242	104	290	150	5.786
<i>Coraciiformes</i>	68	4	4	1	77
<i>Gruiformes</i>	2.445	663	41	3	3.152
<i>Pelecaniformes</i>	2.197	385	116	94	2.792
<i>Phoenicopteriformes</i>	709	147	900	23	1.779
<i>Podicipediformes</i>	219	165	125	104	613
<i>Suliformes</i>	628	113	27	36	804
Totales	17.611	2.990	1.839	454	22.894

Tabla 2. Totales de aves por órdenes y islas, en Baleares, enero de 2025.
Table 2. Totals of birds by order and island, in the Balearics, January 2025.

Las familias más abundantes son las anátidas con 7.619 ejemplares, 3.107 rálidos, de los cuales 1.559 son fochas (*Fulica atra*), 5.354 limícolas, con predominio de los chorlitos dorados (*Pluvialis apricaria*) con 1.653 ejemplares, de los chorlitejos patinegros (*Anarhynchus alexandrinus*) con 847 ejemplares y de las avefrías (*Vanellus vanellus*) con 1.134 ejemplares (Tabla 2).

De las restantes especies destacan los 1.779 flamencos (*Phoenicopterus roseus*), 804 cormoranes grandes (*Phalacrocorax carbo*), y 364 zampullines comunes (*Tachybaptus ruficollis*). En el censo se contabilizaron 245 aguiluchos laguneros (*Circus aeruginosus*), 5 aguiluchos pálidos (*Circus cyaneus*), y 22 águilas pescadoras (*Pandion haliaetus*).

Respecto al año anterior (2024), se ha observado:

- Un aumento de 1.475 ejemplares en Baleares (+6,88 %)

- Un aumento de 2.351 ejemplares en Mallorca (+15,41 %),

- un descenso de 1.216 ejemplares en Menorca (-28,91 %),

- un aumento de 442 ejemplares en Ibiza (+31,64 %),

- un descenso de 102 ejemplares en Formentera (- 18,35 %).

De las 52 especies más comunes y abundantes durante el censo a lo largo de los años que representan el 99,3 % del total de las aves censadas en 2025, 27 especies son en declive en comparación a su media a 15 años y 20 especies son en declive en comparación a su media a 36 años.

Hay que comentar que las cifras totales tienen, a veces, variaciones importantes debido al censo de aves marinas y también en las estimaciones de las especies que no se pueden censar directamente, como la Gallineta común (*Gallinula chloropus*), Agachadiza (*Gallinago gallinago*), etc.

Además, algunas especies

como la Gaviota patiamarilla (*Larus michahellis*) o el Alcaraván común (*Burhinus oedicnemus*) no se censaron por la poca representación de la población en las localidades censadas.

Por localidades

Como sucede cada año donde se obtienen las cifras más elevadas de aves censadas y de especies observadas es en la Albufera de Mallorca, donde se contaron 7.796 aves de 57 especies diferentes, que representan el 34,05 % de las aves observadas en Baleares. En el Salobrar de Campos, se censaron 2.751 ejemplares de 33 especies, el 12,02 % del total. En las Salines de Ibiza (Es Codolar, Es Cavallet y Sal Rossa) se encontraron 1.374 ejemplares de 33 especies, el 6,83 % del total. En Albufereta se contaron 1.391 aves en 39 especies, el 6,08 % del total. Finalmente en la Albufera des Grau de Menorca se contaron 1.017 aves en 18 especies, el 4,44 % del total de Baleares.

Por especies

Este año el ánade azulón (*Anas platyrhynchos*) es la especie más abundante con 2.131 ejemplares. En segundo lugar, se encuentra la garcilla bueyera (*Ardea ibis*) con 2.013 ejemplares y en tercer lugar el pato cuchara (*Spatula clypeata*) con 1.842 ejemplares.

En la Tabla 3, se puede encontrar algunas de las especies más

numerosas con los totales de los últimos dos años, la media a 15 años y el porcentaje de incremento o descenso del año con relación a la media a 15 años. Son destacable algunas caídas importantes como las del zampullín cuellinegro (*Podiceps nigricollis*), de la focha o del ánade azulón.

Cabe destacar la detección de ejemplares de algunas rarezas locales en invierno: Dos ejemplares de Garza imperial (*Ardea purpurea*) en la Albufereta y tres ejemplares de Garcilla cangrejera (*Ardeola ralloides*) en la Albufereta (1) y Son Navata (2).

Por islas

En Mallorca se han visitado un total de 34 zonas (Mapa 1), igual que en 2024 y se han censado un total de 66 especies diferentes, tres más que el año anterior. En total se han contabilizado 17.611 aves, que respecto a los 15.260 del censo 2024, supone 2.351 aves más. La gran mayoría del aumento de ejemplares se debe principalmente al aumento de dos especies: chorlitos dorados (+ 855 ej.) y avefrías (+ 623 ej.).

En cuanto a las especies más abundantes, el primero es el ánade azulón con 1.777 ejemplares, seguido de la garcilla bueyera con 1.535 aves en descenso de 18,07 % y 14,91 % respectivamente sobre 2024. La tercera especie más abundante fue el chorlito dorado con 1.477 ejemplares. Se pueden

Baleares	Media 2010-2024 (15 años)	Total 2024	Total 2025	% 2025/ Media 15 años
<i>Anas platyrhynchos</i>	4.196	2.625	2.131	-49.22%
<i>Ardea ibis</i>	2.739	2.320	2.013	-26.50%
<i>Spatula clypeata</i>	2.090	1.604	1.842	-11.87%
<i>Phoenicopterus roseus</i>	752	1.195	1.779	136.53%
<i>Pluvialis apricaria</i>	896	822	1.653	84.54%
<i>Fulica atra</i>	3.074	2.531	1.559	-49.28%
<i>Anas crecca</i>	1.690	1.206	1.434	-15.13%
<i>Vanellus vanellus</i>	1.704	525	1.134	-33.45%
<i>Tadorna tadorna</i>	672	635	1.026	52.59%
<i>Anarhynchus alexandrinus</i>	691	771	847	22.55%
<i>Phalacrocorax carbo</i>	658	901	804	22.23%
<i>Mareca strepera</i>	663	638	502	-24.24%
<i>Aythya ferina</i>	537	523	417	-22.34%
<i>Tachybaptus ruficollis</i>	492	656	364	-25.97%
<i>Egretta garzetta</i>	250	279	317	26.77%
<i>Recurvirostra avosetta</i>	71	122	256	261.58%
<i>Circus aeruginosus</i>	139	185	245	75.92%
<i>Himantopus himantopus</i>	154	104	231	50.06%
<i>Podiceps nigricollis</i>	413	206	226	-45.27%
<i>Nycticorax nycticorax</i>	116	134	170	47.14%
<i>Calidris alpina</i>	230	177	169	-26.46%
<i>Mareca penelope</i>	289	51	102	-64.68%

Tabla 3. Medias y totales por especie, en Baleares. Por orden de abundancia en 2025, y el incremento o disminución (%) respecto al periodo 2010-2024.

Table 3. Averages and total per species, in the Balearics. In order of abundance in 2025 with the percentage change relative to the average 2010-2024.

encontrar en la Tabla 4, más detalles sobre las tendencias en otras especies. No se consideran las especies que figuran censadas por estima de sus poblaciones como la agachadiza o la gallineta común.


En Menorca se han censado un total de 18 zonas (Mapa 2), una más que el año anterior, detectando 42 especies, dos más que en 2024, con un total de 2.990 ejemplares, un 13,06 % del total de Baleares, una

cifra muy inferior al anterior censo de enero de 2024, con un descenso de 1.216 ejemplares de aves invernantes (-28,91 %). La Albufera des Grau ha visto sus números pasar de 2.626 ejemplares en 2024 a 1.017 ej. en 2025.

La especie más abundante (Tabla 5) es la focha con 582 ejemplares, con descenso significativo sobre el año anterior (-59,10 %). En segundo lugar, es el pato cuchara

Mallorca	Media 2010-2024 (15 años)	Total 2024	Total 2025	% 2025/Media 15 años
<i>Anas platyrhynchos</i>	3.634	2.169	1.777	-51,10 %
<i>Ardea ibis</i>	2.259	1804	1.535	-32,06 %
<i>Pluvialis apricaria</i>	726	592	1.477	103,52 %
<i>Spatula clypeata</i>	1.740	1.269	1.380	-20,70 %
<i>Anas crecca</i>	1.442	939	1.152	-20,13 %
<i>Vanellus vanellus</i>	1.527	504	1.127	-26,18 %
<i>Fulica atra</i>	1.563	1.095	955	-38,92 %
<i>Phoenicopterus roseus</i>	345	582	709	105,39 %
<i>Tadorna tadorna</i>	450	436	674	49,62 %
<i>Anarhynchus alexandrinus</i>	503	584	674	33,94 %
<i>Phalacrocorax carbo</i>	458	656	628	37,26 %
<i>Aythya ferina</i>	285	259	377	32,13%
<i>Mareca strepera</i>	487	296	278	-42,86 %
<i>Egretta garzetta</i>	189	214	262	38,82 %

Tabla 4. Medias y totales por especie, en Mallorca. Por orden de abundancia en 2025, y el incremento o disminución (%) respecto al periodo 2010-2024.
Table 4. Averages and total per species, in Mallorca. In order of abundance in 2025 with the percentage change relative to the period 2010-2024.



Mapa 1. Situación de las localidades donde se ha realizado el censo en Mallorca en enero de 2025, Los números se corresponden con la tabla 1.
Map 1. Census localities in Mallorca in January 2025, The numbers on the map match those on table 1.



Mapa 2. Situación de las localidades donde se ha realizado el censo en Menorca, Ibiza y Formentera en enero de 2025, Los números se corresponden con la tabla 1.
Map 2. Census localities in Menorca, Ibiza and Formentera in January 2025, The numbers on the map match those on table 1.

con unos 450 ejemplares. En tercera posición son la garcilla bueyera, con 312 ejemplares. También a destacar son los números de flamencos que siguen al alza desde hace pocos años.

En Ibiza se han visitado 12 localidades (Mapa 2), dos mas que el invierno anterior. Se detectaron 37 especies y un total de 1.839 ejemplares. Estos datos representan un aumento de 442 ejemplares o +31,64 % y de 2 especies en relación con el censo 2024.

Como el año anterior, el flamenco sigue siendo la especie más abundante con 900 ejemplares y en segunda posición el tarro blanco con 250 ejemplares. En tercera posición es la garcilla bueyera 95 ejemplares (Tabla 6).

En Formentera se han censado 5 zonas (Mapa 2), igual que el censo anterior, donde se detectaron un

Menorca	Media 2010-2024 (15 años)	Total 2024	Total 2025	% 2025/Media 15 años
<i>Fulica atra</i>	1.498	1.423	582	-61,14 %
<i>Spatula clypeata</i>	337	331	450	33,61 %
<i>Ardea ibis</i>	361	360	312	-13,65 %
<i>Anas platyrhynchos</i>	481	345	298	-38,07 %
<i>Anas crecca</i>	196	232	252	28,70 %
<i>Mareca strepera</i>	175	340	224	28,24 %
<i>Phoenicopterus roseus</i>	25	101	147	480,26 %
<i>Tachybaptus ruficollis</i>	196	267	129	-34,14 %
<i>Phalacrocorax carbo</i>	151	178	113	-25,26 %
<i>Tadorna tadorna</i>	34	54	81	140,59 %
<i>Aythya ferina</i>	251	264	39	-84,47 %
<i>Anarhynchus alexandrinus</i>	19	18	37	99,64 %

Tabla 5. Medias y totales por especie, en Menorca. Por orden de abundancia en 2025, y el incremento o disminución (%) respecto al periodo 2010-202.
Table 5. Averages and total per species, in Menorca. In order of abundance in 2025 with the percentage change relative to the period 2010-2024.

Ibiza	Media 2010-2024 (15 años)	Total 2024	Total 2025	% 2025/Media 15 años
<i>Phoenicopterus roseus</i>	362	477	900	148.48 %
<i>Tadorna tadorna</i>	155	116	250	60.81 %
<i>Ardea ibis</i>	81	141	95	16.71 %
<i>Pluvialis apricaria</i>	78	108	89	14.10 %
<i>Anas platyrhynchos</i>	72	102	47	-34.48 %
<i>Phalacrocorax carbo</i>	36	59	27	-25.41 %
<i>Anas crecca</i>	45	21	19	-57.46 %

Tabla 6. Medias y totales por especie, en Ibiza. Por orden de abundancia en 2025, y el incremento o disminución (%) respecto al periodo 2010-2024.
Table 6. Averages and total per species, in Ibiza. In order of abundance in 2025 with the percentage change relative to 2010-2024.

Formentera	Media 2010-2024 (15 años)	Total 2024	Total 2025	% 2025/Media 15 años
<i>Podiceps nigricollis</i>	340	180	104	-69,39 %
<i>Pluvialis apricaria</i>	91	122	87	-4,88 %
<i>Ardea ibis</i>	37	15	71	92,24 %
<i>Anarhynchus alexandrinus</i>	76	89	46	-39,53 %
<i>Phoenicopterus roseus</i>	19	35	23	18,56 %
<i>Tadorna tadorna</i>	33	29	21	-35,98 %
<i>Anas crecca</i>	7	14	11	60,19 %

Tabla 7. Medias y totales por especie, en Formentera. Por orden de abundancia en 2025, y el incremento o disminución (%) respecto al periodo 2010-2024.
Table 7. Averages and total per species, in Formentera. In order of abundance in 2025 with the percentage change relative to 2010-2024.

total de 22 especies, 2 menos que el año anterior. El número de ejemplares censados fue de 454, lo que supone un descenso de 102 aves respecto a 2024 o -18,35 %.

Las especies causante de este descenso figuran en la Tabla 7, como el zampullín cuellinegro, una especie que sigue en descenso y muy por debajo de la media a largo plazo.

Censos en dormideros

Como en años anteriores, se han hecho los censos en los dormideros de ardeidas y de gaviotas en las localidades que se ha considerado más importantes. Las gaviotas, como en años anteriores, han sido infravaloradas. No se censaron las gaviotas patiamarillas. También se han censa-

do las grullas *Grus grus* invernantes y los cormoranes grandes. Y como es lo habitual desde 2014, se censaron los milanos reales en dormitorios.

Ardeidas y Cormorán grande. En Mallorca se han censado en dormitorio, la Albufera, el Salobrar, Albufereta, el torrente y depuradora de Artà, el prat y la depuradora de Sant Jordi, Son Ripoll, Marivent (Palma), las balsas de Son Nuviet (Petra), Son Navata (Felanitx) y Sa Taulera (Selva). Las depuradoras de Porreres, Vilafranca y Binissalem.

En Menorca se han censado los dormitorios del puerto de Mahón, torrente de Sant Joan, Albufera des Grau, Salinas de Addaia, Santa Mariana, Sa Muntanyeta, Es Clot del Guix, Son Saura del Norte, Bini Ilubet, Lluriac y Es Prat, salinas de Fornells, Binissues, Sant Sebastià, Sant Cristòfol, Son Arret, camino de la depuradora de Ferreries, Sa Farola y Prat de Son Bou.

En Ibiza se visitaron Ses Feixes, las salinas del Codolar, Es Cavallet y de Sal Rossa y los Prats de Vila y de Fita.

Las especies de ardeidas que van a dormitorios son: Martinete (*Nycticorax nycticorax*), la garcilla bueyera (*Ardea ibis*), garceta común (*Egretta garzetta*), garceta grande (*Ardea alba*), garza real (*Ardea cinérea*), y más recientemente, el morito (*Plegadis falcinellus*).

Los resultados dan un total de 2.789 ejemplares de ardeidas, que es inferior a los 2.993 contados en 2024 (Tabla 8). Este descenso respecto al año anterior (-6,82 %) se

debe principalmente al bajo número de garcillas bueyeras. Además hay que destacar que se censaron 2 ejemplares de garza imperial (*Ardea purpurea*) y 3 ejemplares de Garcilla cangrejera (*Ardeola ralloides*).

De cormorán grande, se ha censado 804 ejemplares, un descenso de 10,77 % respecto al año anterior.

El total de grullas censadas ha sido de 45 ej., 33 en s'Albufera y 12 en las Salinas de Fornells (Menorca).

Gaviotas y otras aves marinas. Como en años anteriores, se ha efectuado un censo en dormitorio de gaviotas. En Mallorca se han prospectado la Albufera, Albufereta, prat de Maristany, Estany des Ponts, la costa entre los torrentes de Son Real y son Bauló, Estanys des Tamarells y Gambes (S'Avall) y la costa sur de Mallorca, Estanys de sa Sal (Colònia de Sant Jordi), el prat de Sant Jordi y torrentes cercanos, la balsa de Can Guidet, la bahía de Pollença, torrente de Sant Jordi, la Gola (Puerto de Pollença), y la bahía, el puerto y la depuradora de Palma. En Menorca se han censado gaviotas en el puerto de Mahón y torrente de Sant Joan. En Ibiza se han censado las Salinas del Cavallet, el Codolar y de la Sal Rossa. Finalmente, en Formentera se han censado ambos Estanys Pudent y Des Peix.

Este año sigue el descenso de números de gaviota reidora (*Chroicocephalus ridibundus*) con 232 aves censadas en comparación a las 316 contadas en 2024 y las 540 censadas en 2023 o las más de

Baleares	Media 2010-2024 (15 años)	Total 2024	Total 2025	% 2025/Media 15 años
Ardea ibis	2739	2320	2013	-26,50 %
Egretta garzetta	250	279	317	26,77 %
Nycticorax nycticorax	116	134	170	47,14 %
Ardea cinerea	114	101	96	-15,69 %
Ixobrychus minutus	33	55	86	156,97 %
Ardea alba	33	65	55	66,33 %
Plegadis falcinellus	13	39	46	246,73 %
Total Ardeidas	3.299	2.993	2.789	-15,46 %
Phalacrocorax carbo	658	901	804	22,19 %


Tabla 8. Medias y totales por especie, en Baleares, Por orden de abundancia en 2025, y el incremento o disminución (%) respecto al periodo 2010-2024.
Table 8. Averages and total per species, in the Balearics, In order of abundance in 2025 with the percentage change relative to 2010-2024.

mil contadas en 2016, 2017, 2018 y 2019. Para el resto de las especies, se obtienen datos estimados de presencia invernal de gaviota de audouin (*Ichthyaetus audouinii*) con 156 ejemplares, de charrán patinegro (*Thalasseus sandvicensis*), con 40 ejemplares, y 3 ejemplares de gaviota sombría (*Larus fuscus*), (Tabla 9).

No se pudo hacer adecuada-mente el censo invernal de gaviota patiamarilla debido a que la metodología del censo que se utiliza no da resultados significativos, al no incluir los datos de las islas de Dragonera, Malgrats y Cabrera por poner unos ejemplos, lo que repercute en la bajada del número total de aves.

Baleares	Media 2009-2023 (14 años)*	Total 2024	Total 2025	% 2025/Media 15 años
<i>Chroicocephalus ridibundus</i>	703	316	232	-67,00 %
<i>Ichthyaetus audouinii</i>	53	87	156	194,34 %
<i>Thalasseus sandvicensis</i>	64	35	40	-37,50 %

Tabla 9. Medias y totales por especie, en Baleares, Y el incremento o disminución (%) respecto al periodo 2010-2024. (* No hubo censo en 2014 de estas especies).
Table 9. Averages and total per species, in the Balearics, with the percentage change relative to 2010-2024. (* There was no census in 2014 for these species).



Grafica2. Censos de Milanos reales (*Milvus milvus*) en Mallorca, número de ejemplares por años.

Graph 2. Red Kite (*Milvus milvus*) census in Mallorca, Number of individuals per year.

Milano Real, En Mallorca como en años anteriores en enero, se censaron los dormideros de milanos reales. Se censaron 16 dormideros, destacando con números importantes en Puig de Bellveure con 53 ejemplares y Ses Barraques con 38 ejemplares, El censo total para 2025 es de 354 milanos, un resultado muy por debajo del año pasado y lo anterior (Grafica 2).

Las causas del descenso podrían ser que en algunos de los dormideros de años anteriores se han dejado de usar y se desconoce la localización del nuevo dormidero. Además, se sospecha que varias parejas se quedan a dormir en sus zonas de cría o territorio habitual.

AGRADECIMIENTOS

El censo como en años anteriores, ha sido apoyado por el personal de los espacios naturales pro-

tegidos de las islas Baleares, del Servicios de Protección de especies y por los agentes de Medio Ambiente del Govern de les Illes Balears, Merece un agradecimiento especial el Institut Balear de la Natura (IBANAT) que ha vuelto a autorizar la utilización de un helicóptero para participar en el censo de la Albufera de Mallorca, Albufereta y Prat de Maristany (Alcúdia), así como al piloto, También merece un agradecimiento a todos los voluntarios que asistieron al censo, Para el censo de ardeidas y cormoranes grandes en dormideros de Menorca se ha contado con el apoyo de la Agencia de la Reserva de la Biosfera.

Los equipos de trabajo han sido formados por: Lara Abascal, Francisca Acuña, Tomeu Adrover, Pilar, Alañón, Lluís Allés, Rafel Alorda, Sergio Álvarez, María José Ambrosio, Jordi Amengual, Bernat Artigues, Cati Artigues, Ignasi Bar-

celó, Sarah Barnard, Joan Barreda, Juanjo Bazán, Pasqual Blanco, Miguel Ángel Bolaños, Sofía Bolumar, Joaquín Tomás Borgeat, Tomeu Burguera, Bep Capó, Xavier Capó, Esteban Cardona, Santi Cardona, Susana Carreño, David Carreras, Sergi Caules, Andrés Chillón, Marta Cifre, Rafel Cladera, Jaume Cloquell, Damià Coll, Joan Coll, Mar Coll, Pep Toni Coll, Gero Corró, José Antonio Costa, Júlia Crespi, Lluís Cunill, Mari Ángeles Del Pozuelo, Victor Delgado, Rafa Domínguez, Toni Escandell, Natxo Estefanía, Edel Farrús, Carlos Febrer, María José Fernández, Sebastià Ferragut, Antoni Fontanet, Miquel Frontera, Esperança Fuentespina, Eva García, Oscar García, Rocío García, Cristina Garcias, Emili Garriga, Joan Gelabert, Margalida Gelabert, Ricardo Gómez, Amanda M. Gouldney, Beth Guasp, María Teresa Gustems, Mabel Gutierrez, Daniel Hinckley, Miquel Julià, Pilar Lacalle, Gaspar Lirola, Rosa Llitas, Carlos López-Jurado, Vicent Lluy, Miguel McMinn, Josep Manchado, Xavier Manzano, Joan March, Biel Martí, Daniel Martínez, Oliver Martínez, Carme Martorell, Àlex Bariel Mas, Rafel Mas, Xavier Mas, Toni Mateu, Marc Melià, Nicolau Melià, Javier Méndez, Marta Mochales, Naima Montes, Luís Moreno, Patrick Moussa, Jordi Muntaner, Toni Muñoz, Llum Niell, Miquel Orts, Joan Carles Palerm, Mika Palmer, Àlex Pastor, Gabriel Payeras, Daniel Peces, Dani Penalva, Sebastià Perelló, Oriol Perona, Erika Pínto, Román Piris, Josep Pons, Sam

Pons, Toni Pons, Javi Quintana, Miquel Ramis, Maties Rebassa, Sergio Redondo, Miquel Àngel Reus, Joan Guillem Ribot, Marta Ribot, Marina Rodríguez, Margalida Roig, Maryan Roselló, Elena Ruiz, Biel Sabater, Encarna Sáez, Jaume Salom, Juan Carles Salom, Albert Schoenenberger, Michiel Schoonderwoerd, Catalina Sebastià, Rafel Sedano, Sebastià Seguí, Jordi Serapio, Marc Simó, Margarita Socisa, Manolo Suárez, Eli Talens, Pere Tomàs, Sebastià Torrens, Rafel Triay, Martí Turrión, Pedro Van der Knoop, Miguel Vara, Adrià Verger, Carlota Viada, Pere Vicens, Rafel Villalonga, Mariana Viñas, Ibán Yarza, Dani Zamora.

BIBLIOGRAFIA

DELANY, S, REYES, C,, HUBERT, E,, PHIL, S,, REES, E,, HAANSTRA, L, & VAN STRIEN, A, 1999, *Results from the International Waterbirds Census in the Western Palearctic and Southwest Asia, 1995 and 1996*, Wetlands International Wageningen.

(*Rebut: 23,04,2025; Acceptat: 21,05,2025*)

PRIMERA OBSERVACIÓN DE TARABILLA SIBERIANA *Saxicola maurus hemprichii* EN BALEARES

Juan José BAZÁN

SUMMARY. - *First observation of Siberian Stonechat Saxicola maurus hemprichii in the Balearics.* On the 20th of October 2024, a first-winter male Siberian Stonechat *Saxicola maurus hemprichii* was observed in the Cabrera Archipelago Maritime-Terrestrial National Park, Balearics. This observation was accepted by the Spanish Rarities Committee, a first record of this species in the Balearics.

Keywords: Siberian Stonechat, *Saxicola maurus hemprichii*, Cabrera National Park, Balearics.

RESUMEN. - Primera observación de tarabilla siberiana *Saxicola maurus hemprichii* en Baleares. El 20 de octubre de 2024 un macho de primer invierno de tarabilla siberiana *Saxicola maurus hemprichii* fue observado en el Parque Nacional Marítimo-terrestre del Archipiélago de Cabrera, Baleares. Esta observación fue homologada por el Comité de Rarezas de España, siendo la primera cita de esta especie para Baleares.

Palabras clave: Tarabilla siberiana, *Saxicola maurus hemprichii*, Parque Nacional de Cabrera, Baleares.

Contacto: juanjosebazan@colvet.es

El 20 de octubre de 2024 dos ornitólogos, Martin Schultz y Juan J. Bazán, visitaron el Parque nacional Marítimo-terrestre del Archipiélago de Cabrera, y en la zona del merendero de la isla de Cabrera, J.J. Bazán pudo fotografiar un ejemplar de tarabilla que en principio identificaron como tarabilla común *Saxicola rubicola*. Observando posteriormente las fotos, pensaron en la posibilidad de que se tratase de una tarabilla si-

beriana. Para confirmar esta posibilidad, se enviaron las fotos (Foto 1) al ornitólogo Maties Rebassa, y a los expertos David Santamaría y Marcel Gil que confirmaron que se trataba de un macho de primer invierno de tarabilla siberiana *Saxicola maurus hemprichii*, especie no citada hasta la fecha en Baleares. Esta cita ha sido oficialmente homologada por el Comité de Rarezas SEO/Birdlife (DE SANTAYANA, *et al.*, 2024).

La tarabilla siberiana *Saxicola maurus*, descrita por primera vez por C. G. Ehrenberg en 1833, es un passeriforme politípico de la familia *Muscicapidae* que cría en Asia central y oriental (Mongolia, Kazajistán, y este de Rusia), con su zona de invernada principalmente el sur de China, Indochina y la India, aunque puede alcanzar desde Asia Menor hasta Egipto y zonas de África oriental (Mapa 1). La taxonomía es algo controversial, sufriendo varias revisiones en los últimos años (ZINK *et al.*, 2009; SVENSSON *et al.*, 2012). Actualmente, después de que la tarabilla del Amur *Saxicola stejnegeri* se haya clasificado recientemente como

especie (CLEMENTS, *et al.*, 2024), se reconocen cinco subespecies: *S. m. maurus* que se distribuye por el centro y este asiático, *S. m. variegatus* desde el este de Turquía, sur del Cáucaso hasta Irán, *S. m. indicus* por la Himalaya central y noroccidental, *S. m. przewalski* por la zona del Tibet, China y el norte de Myanmar, y *S. m. hemprichii*, la cual cría en el norte del mar Caspio, entre el este de Ucrania y el delta del Volga, con su zona de invernada el noreste africano hasta Etiopía y península arábiga (COLLAR, 2017). Su presencia en Etiopía está documentada entre los meses de septiembre y abril (ASH & ATKINS, 2010; REDMAN *et al.*, 2010).




Foto 1. Tarabilla siberiana, *Saxicola maurus hemprichii*, macho de primer invierno, Parque Nacional de Cabrera, 20 de octubre de 2024. Foto: Juan J. Bazán.

Photo 1. Siberian Stonechat, Saxicola maurus hemprichii, first-winter male, Cabrera National Park, 20th of October 2024. Photo: Juan J. Bazán.

La tarabilla siberiana, como la tarabilla común, es un ave que se deja ver en hábitats despejados y praderas. Los machos adultos tienen la cabeza negra con la mancha blanca lateral del cuello más extensa que la común y la mancha roja-anaranjada del pecho más pequeña en general, siendo el resto del pecho, vientre y flancos de color blanco. El obispillo es blanco

ocráceo liso y pálido y no estriado (como si se observa en la común). Las infracobertoras son negras produciendo un marcado contraste con el resto de la parte inferior del ala; en la tarabilla común es gris y no se produce ese contraste. La hembra tiene un color marrón predominante con un patrón facial y pectoral más débil y menos contrastado que el de la tarabilla común.



Mapa 1. Distribución de la tarabilla siberiana: Naranja, zona de cría; Amarillo, zona en paso migratorio; Lila, residente todo el año; Azul, zona de invernada. Fuente: Cornell Lab of Ornithology, Birds of the World (actualizado 17 de abril 2025).

Map 1. Siberian Stonechat range: Orange, breeding; Yellow, migratory zone; Purple, year-round resident; Blue, wintering. Source: Cornell Lab of Ornithology, Birds of the World (updated on the 17th of April 2025).

ESPECIE	EDAD	SEXO	FECHA	LOCALIDAD
<i>Saxicola m. maurus/stejnegeri</i>	Desconocida	Hembra	13/09/1997	La Coruña
<i>Saxicola m. maurus/stejnegeri</i>	1er invierno	Macho	04/09/2010	Desembocadura del Besós, Barcelona
<i>Saxicola m. maurus/stejnegeri</i>	Adulto	Macho	16/11/2016	Cabo Peñas, Asturias
<i>Saxicola m. maurus/stejnegeri</i>	1er invierno	Macho	28/10/2012	Gozón, Asturias
<i>Saxicola m. hemprichii</i>	1er invierno	Macho	12/01/2012	Delta del Ebro, Tarragona
<i>Saxicola m. hemprichii</i>	1er invierno	Macho	22/10/2015	La Graciosa, Canarias
<i>Saxicola m. hemprichii</i>	1er invierno	Macho	20/10/2024	P.N. de Cabrera, Baleares

Tabla 1. Citas homologadas de *Saxicola m. maurus/Saxicola stejnegeri* y de *Saxicola maurus hemprichii* en España.
Table 1. Accepted records in Spain of *Saxicola m. maurus/Saxicola stejnegeri* and *Saxicola maurus hemprichii*.

Los machos de primer invierno de la subespecie *Saxicola m. hemprichii* suelen tener garganta blanca, flancos limpios, supracobertoras caudales lisas y listas oscuras anchas en la zona dorsal. Los machos de primer invierno siempre tienen algo de negro en la cabeza, frente a los machos de la subespecie *Saxicola m. maurus* de primer invierno, que habitualmente carecen de ese color negro (JIGUET & AUDEVARD, 2016).

Hay bastantes citas en Europa occidental de individuos divagantes en otoño, sobre todo en Escandinavia y las Islas Británicas. En el Parque Nacional de Cabrera los vien-

tos del Este favorecen la aparición de especies orientales como ésta y eran los vientos imperantes los días previos a la observación del ave. Las citas homologadas hasta la fecha de *S. m.maurus/stejnegeri* en España son cuatro y de *S. m. hemprichii* son tres incluyendo la cita de Cabrera (Tabla 1) (GIL-VELASCO *et al.*, 2019; DE SANTAYANA *ET AL.*, 2024).

AGRADECIMIENTOS

Agradezco al revisor anónimo que ha mejorado el texto final y a Carlos López-Jurado por su insistencia y aportaciones a la presente nota breve.

BIBLIOGRAFÍA

- ASH, J. & ATKINS, J. 2010. *Birds of Ethiopia and Eritrea: an atlas of distribution*. Bloonsbury Publishing.
- CLEMENTS J. F., RASMUSSEN P.C., SCHULENBERG T., ILIFF M. J., FREDERICKS T. A., GERBRACHT J. A., LEPAGE D., SPENCER A., BILLERMAN S. M., SULLIVAN B. L., SMITH M., & WOOD C.L. 2024. *The eBird/Clements checklist of Birds of the World: v2024*.
- COLLAR, N. 2017. Common Stonechat (*Saxicola torquatus*). In: del Hoyos, J., Ellioitt, A., Sargatal, J., Christie, D.A. y de Juena, E. (eds.). *Handbook of the Birds of the World Alive*.
- DE SANTAYANA, M., SÁNCHEZ, H., LÓPEZ, F. LÓPEZ-VELASCO, D., ILLA, M., ,GIL-VELASCO, M.,- MARCO-TRESSERRASA, J. & ROJAS, A. 2024. *Observaciones de Aves Raras en España, informe Septiembre-Octubre, 2024*. Comité de rarezas SEO/Birdlife.
- GIL-VELASCO, M., ROUCO, M., GARCÍA-TARRASÓN, M., GRACÍA-VARGAS, F.J., HEVIA, R., ILLA, M., LÓPEZ, F., LÓPEZ-VELASCO, D., OLLÉ, A., RODRÍGUEZ, G., RODRÍGUEZ, M., Y SAGARDÍA, J. 2019. OBSERVACIONES DE AVES RARAS EN ESPAÑA, 2017. *Ardeola* 66-1: 200-201.
- JIGUET F., AUDEVARD A. 2016. *Tous les oiseaux rares d'Europe*. Delachaux et Niestlé. Paris.
- REDMAN, N., STEVENSON, T. & FANSHAW, J. 2010. *Birds of the Horn of Africa: Ethiopia, Eritrea, Djibouti, Somalia and Socotra*. Bloonsbury Publishing.
- SVENSSON, L., SHIRIHAI, H., FRAHNERT, S., & DICKINSON, E. C. 2012. Taxonomy and nomenclature of the Stonechat complex *Saxicola torquatus* sensu lato in the Caspian region. *Bulletin of the British Ornithologists' Club*, 132: 260-269.
- ZINK R. M., PAVLOVA A., DROVETSKI S., WINK M., ROHWER S. 2009. *Taxonomic status and evolutionary history of the Saxicola torquata complex*.

(Rebut: 20.06.2025; Acceptat: 25.06.2025)

OBSERVACIONS D'AUS RARES A LES BALEARS AL 2024

Informe 34è del Comitè de Rareses de Balears

CARLES LÓPEZ-JURADO ¹, MATIES REBASSA ², OSCAR GARCIA-FEBRERO ³,
STEVE NICOLL ⁴, i MIGUEL McMINN ⁵

RESUM.- *Observacions d'aus rares a les Balears al 2024.* Es presenta el 34è informe anual que presenta el Comitè de Rareses de Balears. S'han homologat 21 registres sobre la presència de 11 tàxons d'aucells. Fins a dos tàxons acceptats per primera vegada a Balears: Cabussó gros *Gavia immer*, i Flamenc nan *Phoeniconaias minor*.

A més dels següents tàxons: Virot gros atlàntic *Calonectris borealis*, Arpella pàl·lida russa *Circus macrourus*, Rasclat petit *Zapornia pusilla*, Corriol pectoral *Calidris melanotos*, Gavina cendrosa *Larus canus*, Siboc *Caprimulgus ruficollis*, Titina de Richard *Anthus richardi*, Pinsà trompeter *Bucanetes githagineus*, i Hortolà blanc *Plectrophenax nivalis*.

També s'hi inclouen, 7 observacions a Balears corresponents a 7 tàxons homologats pel Comitè de Rarezas de la Sociedad Española de Ornitología, y publicats en el seus informes corresponents a 2024, en el qual destaquen dues registres homologats per primera vegada a les Balears: Falcó llaner *Falco biarmicus*, i Vitrac siberià de Hemprich *Saxicola maurus hemprichii*. Els altres tàxons són: Ull de bou fosc *Phylloscopus fuscatus*, Ull de bou subespècie de Sibèria *Phylloscopus collybita tristis*, Busqueret xerriera *Curruca curruca*, Busqueret garriguer oriental *Curruca cantillans*, i Menjamosques de collar *Ficedula albicollis*.

SUMMARY.- *Homologation of bird rarities a Balears. Report 2024.*

The Balearic Ornithological Rarity Committee presents its 34th annual report. Twenty-one records were accepted, corresponding to eleven species. Two species were accepted for the first time in the Balearics: Common Loon *Gavia immer* and Lesser Flamingo *Phoeniconaias minor*.

Other species accepted were: Cory's Shearwater *Calonectris borealis*, Pallid Harrier *Circus macrourus*, Baillon's Crane *Zapornia pusilla*, Pectoral Sandpiper *Calidris melanotos*, Common gull *Larus canus*, Red-necked Nightjar *Caprimulgus ruficollis*, Richard's Pipit *Anthus richardi*, Trumpeter Finch *Bucanetes githagineus*, and Snow Bunting *Plectrophenax nivalis*.

Also included are seven Balearic records corresponding to seven species accepted by the Spanish Rarities Committee (CR-SEO), published in their monthly 2024 reports, including two first accepted Balearic records: Lanner Falcon *Falco biarmicus*, and Siberian Stonechat *Saxicola maurus hemprichii*. The other species were: Dusky Warbler *Phylloscopus fuscatus*, Siberian Chiffchaff *Phylloscopus collybita tristis*, Lesser Whitethroat *Curruca curruca*, Eastern Subalpine Warbler *Curruca cantillans*, and Collared Flycatcher *Ficedula albicollis*.

¹ Coordinador del Comité de Rareses a Balears. carlesljm@gmail.com

² matiesrb@yahoo.es

³ oscargfebrero@gmail.com

⁴ estebannic74@hotmail.com

⁵ miguel.mcminn@gmail.com

Aquest és el 34è informe anual que presenta el Comitè de Rareses de Balears (CRB). S'hi presenten 19 registres relatius a l'any 2024, però s'inclou també tres de 2023, tots ells corresponents a 11 espècies. El percentatge d'homologació d'enguany ha estat d'un 90,9 %. Fins a dos tàxons acceptats per primera vegada a Balears: Cabussó gros *Gavia immer*, i Flamenc nan *Phoeniconaias minor*.

L'informe també ha homologat les espècies següents: Viroto gros atlàntic *Calonectris borealis*, Arpella pàl·lida russa *Circus macrourus*, Rasclat petit *Zapornia pusilla*, Corriol pectoral *Calidris melanotos*, Gavina cendrosa *Larus canus*, Siboc *Caprimulgus ruficollis*, Titina de Richard *Anthus richardi*, Pinsà trompeter *Bucanetes githagineus*, i Hortolà blanc *Plectrophenax nivalis*.

També s'hi inclouen 7 observacions a Balears corresponents a 7 tàxons homologats pel Comitè de Rareses de la Sociedad Española de Ornitología (CR-SEO), y publicats en el seus informes bimensuals corresponent a 2024, en el qual destaquen dos registres homologats per primera vegada a Balears: Falcó llaner *Falco biarmicus*, i Vitrac siberià de Hemprich *Saxicola maurus hemprichii*. Els altres tàxons són: Ull de bou fosc *Phylloscopus fuscatus*, Ull de bou subespècie de Sibèria *Phylloscopus collybita tristis*, Busqueret xerraire *Curruca curruca*, Busqueret garriguer oriental *Curruca cantillans*, i Menjamosques de collar *Ficedula albicollis*.

A l'avaluació dels registres del present informe del CRB han intervingut, Maties Rebassa, Oscar García-Febrero, Steve Nicoll, i Miguel McMinn. Com en anys anteriors, de coordinador ha actuat, Carles López-Jurado. Amb l'objecte d'obtenir la màxima informació sobre les rareses a les Balears, a més de les cites rebudes, al CRB també s'han tingut en compte els registres i la informació publicada, a llocs web com:

Aucells rars a les Balears (<http://rareresornibalears.blogspot.com.es/>)
 Societat Ornitològica de Menorca (<http://www.menorcasom.org/>)
 GOB CitAu (<https://citau.gobmallorca.com/index.php>)
 ForumAus GOB Mallorca (<http://www.gobmallorca.com/forum/view-forum.php?id=2>)
 Comitè de Rarezas SEO/BirdLife (<https://seo.org/rarezas/>)
 Birdforum.net (<http://www.birdforum.net/showthread.php?t=337219&page=1>)
 Reservoir Birds (<https://www.Reservoirbirds.com>)
 Rare Birds i Spain (www.rarebirdspain.net)
 eBird, Laboratorio de Ornitología de Cornell, Ithaca, Nueva York. (<http://www.ebird.org>)

Gràcies a tots ells i a tots els observadors que han volgut comunicar les seves dades.

Les espècies considerades en aquest informe són les que figuren a la "Llista de les espècies sotmeses a homologació per la SEO i el GOB", publicada a l'AOB de 2023 volum 38: 263-267.

PRESENTACIÓ DE L'INFORME

La llista sistemàtica que segueix s'ha elaborat d'acord amb els següents punts:

Des de que existeixen els comitès de rareses de Espanya (CR-SEO, 1984) i de Balears (CRB, 1991) s'han homologat a Balears registres corresponents a 132 espècies, 12 subespècies, dos híbrids, tots ells de la categoria A i una espècie de la categoria B, que estan considerades rareses actualment. En els informes que es publiquen a l'AOB només apareixen els registres, acceptats o no, del darrer informe de cada comitè.

La seqüència taxonòmica seguida és, a partir de 2018, la llista mundial d'aus, editada per *International Ornithological Congress* (IOC) versió 9.1.

Al nom científic li segueix el nom popular recomanat en l'àmbit balear, seguit d'altres noms de cada illa (MA, ME, EI, FO) i espanyol, i anglès.

La xifra entre parèntesi que figura a continuació del nom de l'espècie indica els registres/exemplars homologats ja pel Comitè: 1) d'anys anteriors a 2024; 2) de 2024 (sense incloure els exemplars arribats l'any anterior, marcats amb un * a la llista). En el cas del CR-SEO, els comptadors de registres fan referència a les illes Balears.

A cada registre les dades s'ordenen així: 1) illa; 2) localitat; 3) nombre d'aucells observats; 4) edat i sexe, si es coneixen (per dades primaverals-estivals només s'expressa edat quan no es tracta de plomatge nupcial); 5) indicació sobre si l'auell ha estat caçat, trampejat o trobat mort, i si es conserva i on; també si se'n disposen de fotografies, vídeo o

gravació sonora entre la documentació en poder del Comitè; 6) data/es; 7) observador/s, en general no més de quatre.

Un breu comentari sobre cada espècie intenta situar les observacions en relació a allò que es coneix sobre l'estatus de l'espècie a les Balears, tenint en compte el que s'ha dit ja en informes anteriors i indicant al principi, entre parèntesis, l'àrea essencial de cria en el món.

La propietat de les dades contingudes a l'informe correspon als diferents observadors, que hauran de ser esmentats com autors a la bibliografia, recomanant la referència següent: AUTOR/S. In: LÓPEZ-JURADO, C.; MATIES REBASSA, M.; GARCIA-FEBRERO, O.; NICOLL, S.; i McMINN, M. 2025. Observació d'aus rares a les Balears al 2024. *Anuari Ornitològic de les Balears*. Vol. 39.

LLISTA SISTEMÀTICA DELS REGISTRES HOMOLOGATS

Gavia immer. Cabussó gros, Colimbo grande. Great Northern Diver (CRB, 2024: 0/0, 1/1)

Mallorca: cala Gamba, badia de Palma, un exemplar, hi ha fotos, el 14 de gener de 2024 (Biel Bernat). Identificat per Daniel López-Velasco.

(Paleàrtic). Primera cita que s'homologa a les Balears d'aquest hivernant de l'oest d'Europa. No hi ha cites històriques.

Calonectris borealis. Virot gros atlàntic, Pardela cenicienta atlàntica, Cory's Shearwater

(CRB, 2024, Tipu I: 4/4, 1/1; Tipu II: 1/1, 0/0)

Tipu I, Aus acceptades com a *borealis* pures:

Mallorca: Portocolom, Felanitx, 1 exemplar vist a la costa, el 16 de març de 2024, hi ha foto (Maties Rebassa).

Badia d'Alcúdia, 1 exemplar el 8 de setembre de 2023, hi ha fotos (Ricard Gutiérrez).

Portocolom, 1 exemplar el 12 de març de 2023, hi ha fotos (Maties Rebassa, Josep Manchado).

Cabrera: 1 exemplar al freu el 22 d'abril de 2023, hi ha fotos (Daniel López-Velasco).

Tipu II, Aus acceptades que mostren caràcters de *borealis*.

Cabrera: 1 exemplar al freu el 22 d'abril de 2023, hi ha fotos (Daniel López-Velasco).

(Cria a les illes Açores, Madeira, Canàries i Berlanga). Per a la identificació de *borealis/diomedea*, com pot haver-hi barreja genètica, les hem separat en dos categories, així el primer grup les "*borealis* pures" presentarien les tres primàries exteriors completament negres, i valors de cobertores (GPC i LSC) dins del rang de *borealis*. I el segon grup serien les

“aus que mostren caràcters de borealis” amb p10 completament negre, o p10 amb < 20 % de blanc visible, però amb blanc visible a p9 i p8, si tots els altres valors de cobertores (GPC i LSC) i estructura estan dins dels esperats per a borealis, seguint el mètode de FLOOD & GUTIÉRREZ (2021) i GUTIÉRREZ (2024).

Phoeniconaias minor. Flamenc nan, Flamenco enano, Lesser flamingo (CRB, 2024: 0/0, 1/1)

Mallorca: es Salobrar, Campos. Present 1 ex. des del 29-IV (Maarten Sluijter) fins el 7-V (Biel Bernat, Antoni Soler, Toni Mateu), hi ha foto. Vegeu foto 1).

(Afrotropical). Aquesta espècie africana apareix a Europa procedent de captivitat, però també arriben aus salvatges al sud d'Europa. A les Balears, Espanya i altres països, els exemplars sense signes de captivitat es consideren divagants. Primera cita que s'homologa a les Balears com a salvatge. Raresa en l'àmbit europeu.

Circus macrourus. Arpella pàl·lida russa, Aguilucho papialbo, Pallid Harrier

(CRB 2024: 28/29, 2/2) (CR-SEO, 2014: Balears 14/14)

Mallorca: pla de Lanzell, Vilafranca, un mascle de segon any, el 24 de setembre de 2024, hi ha fotos (Maties Rebassa). Vegeu foto 2.

Botanicactus, ses Salines, un mascle, el 5 d'octubre de 2024, hi ha foto (Josep Manchado, Pablo García, Pau Castell, Susana Quintanilla, Lalo Ventoso).

Menorca: punta Nati, Ciutadella, un juvenil, hi ha foto, 18 d'octubre de 2023 (Silvio Paul).

(Est d'Europa, Àsia). Dels registres homologats fins ara, 30 corresponen a Mallorca, nou a Menorca, dos a Cabrera, dos a Formentera, i un altre a sa Dragonera. Dates extremes d'aquest hivernat i migrant, amb 3 registres hivernals, el 13 de gener i el 27 de febrer. Pas prenupcial, amb 29 registres del 14 de març fins el 30 d'abril. Pas postnupcial amb onze cites del 24 de setembre fins al 18 d'octubre.

Zapornia pusilla. Rasclet petit, Rasclet gris (ME), Polluela chica, Baillon's Crake

(CRB, 2024: 5/5, 2/2)

Mallorca: talaia d'Albercutx, Pollença, un exemplar és gravat un únic reclam durant la nit a les 21:57 h (NFC1), el 4 d'abril de 2024 (Maties Rebassa).

Jardí Botànic de Sóller, un exemplar es fotografiat el 13 d'abril de 2024, hi ha fotos (Elisa García). Vegeu foto 3.



Foto 1. Flamenc nan, Lesser flamingo, *Phoeniconaias minor*, Parc Natural es Trenc-Salobrar, Mallorca, 2 de maig de 2024. Autor: Antoni Soler



Foto 2. Arpella pàl·lida russa, Pallid Harrier, *Circus macrourus*, mascle de segon any, Pla de Lanzell, Mallorca, 24 de setembre de 2024. Autor: Maties Rebassa

(Palèartic, Afrotropical, Oriental i Austroasiàtic. *Z. p. intermedia*: Europa central, oest i sud, nord d'Àfrica, est de Romania i possiblement Turquia). Les dades de fenologia d'aquest migrant al pas prenupcial amb 6 cites: del 4 fins el 20 d'abril. Al pas postnupcial un registre a 3 d'octubre.

Calidris melanotos. Corriol pectoral, Correlinos pectoral, Pectoral Sandpiper

(CRB, 2023: 7/9, 2/2) (CR-SEO, 2014: Balears 11/13)

Mallorca: Salobrar de Campos, un exemplar, present des del 30 d'abril fins el 6 de maig de 2024, hi ha fotos (Jason Moss) (vegeu foto 4).

S'Albufera, un jove, hi ha fotos, el 15 i 16 de setembre de 2024 (Mihail Montier; Maties Rebassa).

(Nord Amèrica i Sibèria). Desena cita per al Parc Natural es Trenc-Salobrar i sisena per el Parc Natural de s'Albufera. Les dates extremes d'aquest divagant a Balears són: pas prenupcial amb 4 registres (1/III, 0/IV, 3/V), del 8 de març al 16 de maig; Pas postnupcial amb 16 cites (1/VIII, 11/IX, 4/X), del 23 d'agost fins el 15 d'octubre. Raresa en l'àmbit europeu.

Larus canus. Gavina cendrosa, Gaviota cana, Common Gull

(CRB, 2024: 22/23, 2/2)

Mallorca: bassa de Can Guidet, Palma, un jove, hi ha fotos, el 29 de gener de 2024 (Josep Manchado).

Prat de Sant Jordi, Palma, exemplar de primer estiu, hi ha foto, el 6 de març de 2024 (Daniel Zamora). Vegeu foto 5.

(Holàrtic). Distribuïda per gran part de l'extrem septentrional del Paleàrtic, des del nord d'Europa fins al sector oriental de Rússia, així com a Alaska i Canadà. A l'hivern està present a Europa, golf Pèrsic, sud-est d'Àsia i sector occidental d'Amèrica del Nord. Alguns aucells hivernants arriben fins al Mediterrani i nord d'Àfrica (PATERSON, 1997). Dates extremes a Balears: hivernada, del 7 de desembre al 21 de febrer; Pas prenupcial, del 4 de març fins el 20 de maig; Pas postnupcial, primer registre el 8 d'agost, i darrer el 15 de novembre.

Caprimulgus ruficollis. Siboc, Chotacabras pardo, Red-necked Nightjar (CRB, 2024: 15/17, 1/1)

Mallorca: un jove és trobat al carrer Joan Maragall de Palma amb un cop, el 14 de maig de 2024. Després de l'avís, va ingressar al centre amb un pes de 67 gr. i es va alliberar amb un pes de 75 gr. Hi ha fotos (COFIB). Vegeu foto 6.

(Paleàrtic: exclusiu de la península Ibèrica i Barbaria). Dates extremes d'aquest migrant, son totes del pas prenupcial (11/IV, 5/V), del 21 d'abril al 14 de maig. Raresa en l'àmbit europeu.



Foto 3. Rasclet petit, Baillon's Crane, *Zapornia pusilla*, Jardí Botànic de Sóller, Mallorca, 13 d'abril de 2024. Autor: Elisa García



Foto 4. Corriol pectoral, Pectoral Sandpiper, *Calidris melanotos*, Parc Natural es Trenc-Salobrar de Campos, Mallorca, 30 d'abril de 2024. Autor: Jason Moss



Foto 5. Gavina cendrosa, Common Gull, *Larus canus*, jove, Prat de Sant Jordi, Mallorca, 6 de març de 2024. Autor: Daniel Zamora



Foto 6. Siboc, Red-necked, *Caprimulgus ruficollis*, jove, Palma de Mallorca, 14 de maig de 2024. Autor: COFIB

Falco biarmicus. Falcó llaner, Halcón borní, Lanner Falcon
(CR-SEO, 2024: Balears 0/0, 1/1)

Mallorca: Blanquer de Maria de la Salut. Un jove, hi ha fotos, el 14 d’abril de 2024 (Josep Manchado, Biel Bernat, Pablo García, Pau Castell). Vegeu foto 7.

(PARDO DE SANTAYANA, *et al.*, 2024a). (Sud d’Europa, Àfrica, sud-oest d’Àsia). Primera cita que s’homologa a les Balears. Anterior al CR-SEO (antes de 1984) y posteriors a Balears hi ha poques observacions: a Menorca (6 citas), Mallorca (2) i Formentera (1) encara que potser es presenta amb més freqüència del que hom pensa, en poder passar desapercebut, de fet, les localitats de cria més pròximes es troben a Itàlia (subespecie *feldeggii*) i al nord d’Àfrica (subespecie *erlangeri*).

La majoria de les cites homologades a la península Ibèrica es produeixen a l’entorn de Tarifa, principalment al setembre. En els darrers anys, tanmateix, s’estan incrementant el nombre de cites a l’interior peninsular, fonamentalment a l’estiu (GIL-VELASCO *et al.*, 2019). Raresa en l’àmbit europeu.

Phylloscopus inornatus. Ull de bou de dues retxes, Ull de bou billissat (ME), Mosquitero bilistado, Yellow-browed Warbler
(CRB, 2024: 27/35, 1/1) (CR-SEO, 2014: Balears 25/31)

Mallorca: Gotmar, Pollença, un exemplar el 2 de novembre de 2024, hi ha fotos (Pau Castell, Josep Manchado). Vegeu foto 8.

(Nord i est de Sibèria i Àsia central). Dotzena cita pel TM de Pollença d’aquest migrador de tardor i hivernant rar procedent de Sibèria. Dates extremes a Balears, del pas prenupcial del 27 d’abril i 18 de maig: Pas postnupcial, de l’1 d’octubre fins el 29 de desembre.

<i>Phylloscopus inornatus</i>	Mallorca	Cabrera	Menorca	Dragonera	Aire
Nº cites/Ex.	27 / 33	12 / 20	11 / 11	3 / 3	1 / 1

Phylloscopus fuscatus. Ull de bou fosc, Mosquitero sombrío, Dusky Warbler
(CR-SEO, 2024: Balears 1/1, 1/1)

Mallorca: Formentor (Pollença), un exemplar a la depuradora el 19 d’octubre de 2024 (Maties Rebassa).

(PARDO DE SANTAYANA, *et al.*, 2024c). (Àsia central i oriental). Segona cita per les Balears, l’interior és de maig de 1997 a l’illa de l’Aire. Sorprenen que no tinguem més que aquests dades a Balears, ja que a Espanya és divagant amb 14 registres homologats. Raresa en l’àmbit europeu.



Foto 7. Falcó llaner, Lanner Falcon, *Falco biarmicus*, jove, Blanquer de Maria de la Salut, Mallorca, 13 gener de 2024. Autor: Pau Castell



Foto 8. Ull de bou de dues retxes, Yellow-browed Warbler, *Phylloscopus inornatus*, Gotmar, Mallorca, 2 de novembre de 2024. Autor: Pau Castell

Phylloscopus collybita tristis. Ull de bou subespècie de Sibèria. Mosquitero común siberiano. Common Chiffchaff

(CR-SEO, 2024, Balears: Tipu I, 6/6, 1/1; Tipu II, 1/1, 1/1)

Tipu I, Aus acceptades com a *P. collybita tristis*:

Aire: (Sant Lluís, Menorca). Un adult és capturat per a anellament el 21 d'abril de 2024 (Marc Illa/SOM, Ricard Poch, Richard Barnes, Rober Bustamante). Vegeu foto 9.

Tipu II, Aus acceptades com *P. collybita* "tipo *tristis*" (s'inclouen en aquesta categoria les aus que, amb el material aportat, semblen pertànyer a aquesta subespècie, encara que no es pot descartar que siguin varietats extremes o híbrids de la subespècie *abietinus*):

Aire: Sant Lluís, Menorca. Un adult es capturat per a anellament el 18 d'abril de 2024 (Marc Illa/SOM, Beth Mejan, Igor Irazusta, Juan Mari Sagredo).

(Rússia des del riu Pechora cap a l'est al llarg de Sibèria, nord de Mongòlia i Kazajistan fins al nordoest de Xina) (PARDO DE SANTAYANA, *et al.*, 2024a). El CR-SEO homologa registres de la subespècie *tristis*, seguint el criteri d'acceptar les dades en les quals es pogué confirmar la veu (cant o reclam) i que l'observació de l'auell permetés concloure que les característiques del plomatge no mostraven tons grocs a les parts inferiors, la cella, o tons verds evidents al dors i clatell. Aquest migrant presenta la següent fenologia a Balears. Dates extremes, la majoria de les cites són del pas prenupcial amb 7 registres (3/III, 4/IV), primer el 16 març i darrer el 22 d'abril. Tan sol hi ha dos registres al pas postnupcial (2/XI), del 3 al 7 de novembre. Raresa en l'àmbit europeu.

<i>Phylloscopus collybita tristis</i>	Mallorca	Aire	Cabrera	Menorca
Nº cites/exemplars	5/5	2/2	1/1	1/1

Curruca curruca. Busqueret xerraire, *Curruca zarcerilla*, Lesser Whitethroat.

(CR-SEO 2024: Balears 17/17, 1/1) (CR-Balears 2005: 22/24)

Aire: Sant Lluís, Menorca: una au de segon any calendari capturat per a anellament, el 20 d'abril de 2024 (Marc Illa/SOM, Beth Mejan, Igor Irazusta, Juan Mari Sagredo). Vegeu foto 10.

(Euràsia). (PARDO DE SANTAYANA *et al.*, 2024a). Dates extremes d'aquest migrant a Balears: pas prenupcial, primer registre 20 d'abril i darrer el 30 de maig; Pas postnupcial, primer l'11 de setembre i darrer el 1 de novembre. Raresa en l'àmbit europeu.

<i>Curruca curruca</i>	Cabrera	Aire	Formentera	Menorca	Mallorca	Colom	Dragonera
Exemplars	25	7	4	2	2	1	1



Foto 9. Ull de bou subespècie de Sibèria, Common Chiffchaff, *Phylloscopus collybita tristis*, adult, illa de l'Aire, 21 d'abril de 2024. Autor: Marc Illa



Foto 10. Busqueret xerraire, Lesser Whitethroat, *Curruca curruca*, au de segon any calendari, illa de l'Aire, 20 d'abril de 2024. Autor: Marc Illa

Curruca cantillans. Busqueret garriguer oriental, Curruca carrasqueña oriental, Eastern Subalpine Warbler

(CR-SEO 2024, Balears: Tipu I: 16/19, 1/1; Tipu II: 3/4 0/0; Tipu III: 1/1, 1/1).

Tipu I, Aus mostrant trets de la subespècie oriental *C. cantillans albistriata*:

Aire: (Sant Lluís, Menorca), un mascle de segon any calendari, capturat per a anellament el 14 d'abril de 2024 (Marc Illa/SOM, Beth Meján, Igor Irazusta, Juan Mari Sagredo). Vegeu foto 11.

Tipu II, Aus mostrant trets de la subespècie oriental *C. cantillans cantillans*:

Sense registres rebuts.

Tipu III, Aus acceptades com a *C. cantillans cantillans/albistriata*:

Aire: (Sant Lluís, Menorca), un exemplar de segon any calendari, capturat per a anellament el 15 d'abril de 2024 (Marc Illa/SOM, Beth Meján, Igor Irazusta, Juan Mari Sagredo).

(Nor-este de Itàlia a través de Sur-este d'Europa a l'Oeste de Turquia) (PARDO DE SANTAYANA *et al.*, 2024a). Aquest migrant presenta la següent fenologia a Balears. Dates extremes, totes les cites son del pas prenupcial amb 14 registres (2/III, 12/IV), primer el 27 de març i darrer el 25 d'abril. Raresa en l'àmbit europeu.

<i>Curruca cantillans</i>	Aire	Cabrera	Formentera
Nº cites/exemplars	14 / 17	8 / 9	1 / 1

Ficedula albicollis. Menjamosques de collar, Papamoscas acollarado, Collared Flycatcher

(CR-SEO, 2024, Balears: Tipu I: 51/54, 11/21)

Tipu I, Aus pures:

Dragonera: (Andratx), un mascle el 6 d'abril de 2024, hi ha fotos. Una femella el 4 de maig de 2024, hi ha fotos (Jason Moss). Vegeu foto 12.

Cabrera: un mascle, hi ha fotos, el 13 d'abril de 2024 (Martina Corgnati). Vegeu foto 13.

Aire: (Sant Lluís, Menorca), una femella adulta capturada per a anellament el 13 d'abril de 2024. Un mascle de segon any capturat per a anellament el 14 d'abril de 2024. Onze exemplars (7 femelles (5 adultes i 2 de segon any calendari) i 4 mascles (3 adults i 1 de segon any calendari) capturats per anellament el 15 d'abril de 2024, hi ha fotos (Marc Illa/SOM, Beth Meján, Igor Irazusta, Juan Mari Sagredo). Curiosament, tots els exemplars es capturen a la tarda (a partir de les 13 h), amb condicions físiques bàsiques, durant les darreres hores no hi va haver vents destacables de llevant, exemplars desplaçats cap a l'oest en temporals de llevant



Foto 11. Busqueret garriguer oriental, Eastern Subalpine Warbler, *Curruca cantillans albistriata*, mascle de segon any calendari, illa de l'Aire, 14 d'abril de 2024. Autor: Marc Illa



Foto 12. Menjamosques de collar, Collared Flycatcher, *Ficedula albicollis*, femella, Parc Natural de sa Dragonera, el 4 de maig de 2024. Autor: Jason Moss

durant la cruïlla del Sàhara, que després han creuat des de més a l'oest del que és habitual.

Menorca: a Maó, un mascle el 15 d'abril de 2024 (Adrià Verger). A es Castell, un mascle el 15 d'abril de 2024 (Richard Barnes, Karen Barnes).

Eivissa: a cap Falcó (Sant Josep de sa Talaia, un mascle de segon any, hi ha fotos, el 21 d'abril de 2024 (Michiel Schoonderwoerd). Al barranc d'Algendar (Ferrerries), un mascle adult, hi ha fotos, el 22 d'abril de 2024 (Keith Betton).

Mallorca: al coll des Vidriers (Capdepera), un mascle de segon any, hi ha fotos, el 23 d'abril de 2024 (Josep Manchado).

(Centre i est d'Europa, extrem occidental d'Àsia) (PARDO DE SANTAYANA, *et al.* 2024a-c). Dates extremes, tots els registres corresponen al pas prenupcial i són del 2 d'abril fins el 15 de maig.

<i>Ficedula albicollis</i>	Cabrera	Mallorca	Aire	Menorca	Formentera	Dragonera	Eivissa
Nº cites/Ex.	19 / 21	17 / 17	9 / 20	8 / 8	3 / 3	4 / 4	2 / 2

***Saxicola maurus hemprichii*.** Vitrac siberià de Hemprich, Tarabilla siberiana de Hemprich, Siberian Stonechat

(CR-SEO, 2024: Balears 0/0, 1/1)

Cabrera: un mascle de primer hivern, hi ha foto, el 20 d'octubre del 2024 (Juan José Bazán, Martin Schultz). Identificada per David Santamaria i Marcel Gil. Vegeu portada i nota breu.

(Sibèria occidental). (PARDO DE SANTAYANA, *et al.*, 2024c). Primera cita per a Balears d'aquest divagant de Sibèria occidental. Raresa en l'àmbit europeu.

***Anthus richardi*.** Titina de Richard (MA), Titeta grossa (ME), Bisbita de Richard, Richard's Pipit

(CRB, 2024: 6/9, 1/1) (CR-SEO, 2006: Balears 12/20)

Mallorca: Sa Barrala, Campos, un exemplar a un conreu, el 12 d'octubre de 2024, l'enregistrament sonor del reclam i el sonograma es pot escoltar i visualitzar: <https://ebird.org/checklist/S198429536t>

(Maties Rebassa).

(Centre i est d'Àsia). Ja són 13 cites homologadas per a Mallorca, la resta son de Menorca amb 6. A Balears els registres d'aquest migrant i hivernant rar, s'estenen del 3 d'octubre al 25 d'abril.

***Bucanetes githagineus*.** Pinsà trompeter, Camachuelo trompetero, Trumpeter Finch

(CRB, 2024: 20/20, 1/1)



Foto 13. Menjamosques de collar, Collared Flycatcher, *Ficedula albicollis*, mascle, Parc Nacional de Cabrera, el 13 d'abril de 2024. Autor: Martina Corgnati



Foto 14. Pinsà trompeter, Trumpeter Finch, *Bucanetes githagineus*, Parc Nacional de Cabrera, 17 de maig de 2024. Autor: Maties Rebassa

Cabrera: un exemplar fotografiat el 17 de maig de 2024 (Maties Rebassa). Vegue foto 14.

(Paleàrtic: sud d'Almeria, Canàries, nord d'Àfrica, Orient Pròxim, Pakistan i Índia). Amb aquesta cita ja són 12 registres per al Parc Nacional de Cabrera. Aquesta espècie presenta a Balears desplaçaments nòmades estacionals. Dates extremes: Prenupcial amb 16 registres (1/III, 6/IV, 9/V), vist del 26 de març fins al 22 de maig; Postnupcial, amb 5 cites, 4 i 13 de juliol, 9 de setembre i del 1 al 18 d'octubre.

Plectrophenax nivalis. Hortolà blanc, Escribano nival, Snow Bunting (CRB, 2024: 8/8, 1/1)

Mallorca: Es Blanquer de Maria de la Salut, un mascle adult a un conreu, hi ha fotos, des del 13-I (Maties Rebassa) fins el 24-I de 2024, (Josep Manchado, Biel Bernat, Miquel Vallespir, Sebastià Perelló, Maciana Cladera, David García, Gemma Carrasco i Dani Zamora).

(Holàrtic boreal). Tercera cita com a hivernant a Balears, i cinquena cita homologada per a Mallorca. Dades extremes: pas postnupcial, set cites (1/X, 6/XI) del 3 d'octubre al 29 de novembre. I tan sols un registre en el pas prenupcial, el 23 de maig. Hivernada, tres registres (2/XII, 1/I) des del 1-XII fins el 24-I.

LLISTA DELS REGISTRES NO HOMOLOGATS

Els registres d'aquesta llista no han pogut esser homologats per no quedar inequívocament identificats amb l'espècie proposada a partir de la informació facilitada al comitè, requisit essencial per formar part de l'arxiu de dades homologats. Les raons que motiven la no homologació de cada cita són indicades de forma resumida en parèntesis. En contra d'aquest veredictes es pot aportar documentació d'aquests registres, incloent l'ampliació de dates si n'hi hagués per part de tercers autors.

CR-SEO:

Phylloscopus borealis, Ull de bou boreal, Mosquitero boreal, Arctic Warbler. Sa vinya den Pere, Alaïor. Un exemplar el 2 de novembre de 2024 (En no comptar amb fotografies o enregistraments sonor que donin suport a l'observació i atesa la dificultat en la identificació d'aquest taxó, el Comitè considera que no és possible homologar la cita).

CRB:

Circus macrourus, arpella pàl·lida russa, Aguilucho papialbo, Pallid Harrier. Talaia d'Albercutx, Pollença, una femella o jove el 20 d'abril de 2024, hi ha foto (El material aportat, una única foto, encara que sembla mostrar un *macrourus*, no exclou amb total seguretat altres opcions).

Emberiza citrinella, Hortolà groc, Sit groc (ME), Escribano cerillo, Yellowhammer. Vall d'Orient, Bunyola, 1 exemplar el 13 de novembre de 2024, hi ha fotos (Amb les fotos aportades, no es pot descartar *Emberiza cirilus*).

BIBLIOGRAFIA

- FLOOD, R. & GUTIÉRREZ, R. 2021 Field separation of Cory's *Calonectris borealis* and Scopoli's *C. diomedea* Shearwaters by underwing pattern. *Marine Ornithology* 49: 311-320.
- GIL-VELASCO, M., ROUCO, M., GARCÍA-TARRASÓN, M., GRACÍA-VARGAS, F.J., HEVIA, R., ILLA, M., LÓPEZ, F., LÓPEZ-VELASCO, D., OLLÉ, A., RODRÍGUEZ, G., RODRÍGUEZ, M., Y SAGARDÍA, J. 2019. OBSERVACIONES DE AVES RARES EN ESPAÑA, 2017. *ARDEOLA* 66-1: 178.
- GUTIÉRREZ, R. 2024. Recent Cory's Shearwater *Calonectris borealis* claims from Balearic Islands and identification recommendations for the Mediterranean. *AOB* 38: 1-8.
- PARDO DE SANTAYANA, G., SÁNCHEZ, H., LÓPEZ, F., LÓPEZ-VELASCO, D., ILLA, M., MARCO-TRESSERAS, J., ROJAS, A. 2024a. Observaciones de Aves Raras en España desde enero hasta abril de 2024. Disponible en la web de SEO/BirdLife. <https://seo.org/rarezas/>
- PARDO DE SANTAYANA, G., SÁNCHEZ, H., LÓPEZ, F., LÓPEZ-VELASCO, D., ILLA, M., MARCO-TRESSERAS, J., ROJAS, A. 2024c. Observaciones de Aves Raras en España desde septiembre hasta octubre de 2024. Disponible en la web de SEO/BirdLife. <https://seo.org/rarezas/>
- PATERSON, A.M. 1997. *Las Aves Marinas de España y Portugal*. Lynx Edicions. Barcelona.

NOVETATS ORNITOLÒGIQUES DE 2024

Compilació: Daniel HINCKLEY ¹, Carles LÓPEZ-JURADO ², Jason MOSS ³,
Miguel VARA ², Oliver MARTÍNEZ ⁴, Sergi CAULES ⁵, Adrià VERGER ⁵,
i Rafel VILLALONGA ⁵

Les observacions d'auells de Balears que publicam corresponen a l'any 2024, encara que també s'hi inclouen registres d'anys anteriors si l'interès ho justifica. Tots ells són una selecció de les observacions que figuren als arxius del GOB Mallorca, GEN-GOB Eivissa, i de la Societat Ornitològica de Menorca (SOM). També s'han consultat els arxius del Parc Natural de s'Albufera de Mallorca, del Parc Natural de s'Albufera des Grau (Menorca), del Parc Natural de ses Salines (Eivissa i Formentera), de la Reserva Natural de l'Albufereta (Mallorca) i del Consorci per a la Recuperació de la Fauna de les Illes Balears (COFIB).

Amb l'objecte d'obtenir la màxima informació sobre les aus a les Balears, a més de les cites rebudes, també s'han tingut en compte els registres i la informació publicada, a llocs web com:

Aucells rars a les Balears (<http://rareresornibalears.blogspot.com.es/>)

Societat Ornitològica de Menorca (<http://www.menorcason.org/>)

GOB CitAu (<https://citau.gob-mallorca.com/index.php>)

eBird, Laboratorio de Ornitología de Cornell <http://www.ebird.org>

Observation.org, Fundació Observation International i socis locals <https://observation.org/tos/>.

ForumAus GOB Mallorca (<http://www.gobmallorca.com/forum/viewforum.php?id=2>)

S'han tengut en compte els punts següents:

— La present llista d'espècies segueix, a partir de 2018, l'ordre sistemàtic de la llista mundial d'aus, editada per *International Ornithological Congress* (IOC) (GILL & DONSKER, 2019). D'aquesta llista, presentam 403 espècies i 24 subespècies de les quals disposam de registres des de 1950 (Categories A i C). Les espècies sotmeses a homologació pels comitès de rareses de Espanya (CR-SEO/BirdLife) o de Balears (CR-GOBs) figuren també amb més detalls en el capítol que porta per títol Observació d'aus rares a les Balears al 2024.

— De cada espècie es proporciona la informació següent:

Nom científic. Nom popular recomanat en l'àmbit balear seguit d'altres noms de cada illa (MA/Mallorca-ME/Menorca-EI/Eivissa-FO/Formentera), també en espanyol i anglès.

¹ dnhvicom@yahoo.com

² GOB Mallorca. ornitologia@gobmallorca.com

³ mossjason85@gmail.com

⁴ GEN GOB Eivissa. gen-gob@teleline.es

⁵ SOM Societat Ornitològica de Menorca. informacio@menorcason.org

Estatus (MA-ME-EI-FO-CA/Cabrera, DR/Dragonera). Criteri de selecció:

Illa: localitat, nombre d'exemplars, data, comentaris dels observadors.

Comentaris dels editors

— Símbols utilitzats a les taules:

* Són les dates extremes,

() Registres aïllats,

+ Presència d'exemplars sense avaluar-ne quantitats,

0 Zero, recompte amb resultat negatiu,

♀ Femella i ♂ Mascle,

Ad. A, Adult

2n ac Au en el seu segon any calendari (= au nascuda l'any calendari anterior; Codi Euring 5).

3r ac Au en el seu tercer any calendari (Codi Euring 7),

1r H / 2n H Au en el seu primer hivern / segon hivern,

Im Immadur

P Fa referència al nombre de polls,

pp Parella/es

J, Jov. Fa referència al nombre de joves.

— Quadrícula sense dades

h/n Hores nocturnes.

PM Palma

PN Parc Natural

P.N. Parc Nacional

PNAM Parc Natural de s'Albufera de Mallorca

PNSS Parc Natural de ses Salines (Eivissa i Formentera)

RN Reserva Natural

RNSA Reserva Natural de l'Albufera

mn Milles nautiques

m s.n.m. metres sobre el nivell de la mar

(N. de l'ed.) Nota de l'editor

(N. del t.) Nota del traductor

Var. Variedad

— Els noms populars de cada illa són els que ens ha facilitat cada grup local del GOB. En el cas de les espècies noves per a les illes, se'ls ha hagut de donar un nom provisional.

— L'estatus a les Balears figura a l'annex II. S'empren els conceptes següents:

Reproductor: població que cria.

Sedentari: població present tot l'any.

Estival no reproductor: població present a la primavera i l'estiu però no cria.

Hivernant: població present sols a l'hivern.

Migrant: població present sols en migracions pre i/o postnupcials.

Accidental: espècie molt rara, allunyada de la seva àrea normal de distribució, migració o hivernada (Quant la espècie sí pertany al Paleàrtic occidental).

Divagant: espècie que apareix extralimitant el seu àmbit geogràfic de presència habitual (Quant l'espècie no pertany al Paleàrtic occidental).

Falta informació o ?: estatus dubtós.

— Les informacions sobre cada aucell s'agrupen per illes; a cadascuna, els diferents registres s'han ordenat cronològicament.

— El criteri de selecció dels registres apareix a continuació de l'estatus de cada espècie, i s'especifica breument el criteri seguit per a la publicació de les observacions rebudes. D'aquesta manera es pretén informar el lector sobre quins són els registres que s'han publicat de cada aucell.

— Es publiquen les dades se-
gues sobre reproducció, primers
i darrers registres d'aus migrants,
hivernants, concentracions d'una
mateixa espècie, aus rares i escas-
ses. En aquest darrer cas, no es
publiquen si no van acompanyades
d'una bona descripció de l'auell
i de les condicions en què va ser
vist. No es publiquen determinats
registres detallats de nidificació per
motius conservacionistes.

— Els registres són publicats
amb els seus respectius autors.

Quan el nombre d'observadors és
superior a tres, només se'n menci-
ona el primer. Les observacions pu-
blicades han de consignar-se com a
autor/autors, es recomana la ma-
nera següent per fer-ho: AUTOR/S.
2025. Novetats Ornitològiques de
2024. A: HINCKLEY, D. *et al.* AOB:
vol. 39.

— En el cas de les espècies pre-
sents a les Balears d'origen natural
desconegut, aquestes figuren a la
llista complementària. S'hi indica
de quina regió són originàries.

LLISTA SISTEMÀTICA D'OBSERVACIONS CORRESPONENTS A 2024 (Categories A i C)

Branta leucopsis. Oca galta blanca. Barnacla cariblanca. Barnacle Goose
Estatus: accidental (ME-EI). *Selecció:* tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Anser anser. Oca salvatge, oca comuna (ME). Ansar común. Greylag
Goose
Estatus: hivernant escàs (MA) i rar (ME-EI-FO-CA). Migrant rar (CA).
Selecció: fenologia.
Mallorca: s'Albufera. 2 ex. el 3-6-I (RES, VIC, PNAM).

Anser fabalis. Oca pradenca, oca de camp (ME). Ansar campestre. Taiga
Bean Goose
Estatus: accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Anser albifrons. Oca carablanca. Ansar careto. Greater White-fronted
Goose
Estatus: accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Anser erythropus. Oca carablanca petita. Ansar careto chico. Lesser
White-fronted Goose
Estatus: accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Cygnus olor. Cigne mut. Cisne común. Mute Swan*Estatus:* accidental.*Selecció:* tots els registres rebuts.*Mallorca:* Present 1 ex. des del 21-IX-2018 i compareix per les zones humides del nord, principalment a l'Albufereta, Prat de Maristany, Estany des Ponts, i s'Albufera, darrera cita el 26-VI (RES, VIC, PNAM).***Cygnus columbianus***. Cigne petit. Cisne chico. Tundra Swan*Estatus:* accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Cygnus cygnus. Cigne cantaire. Cisne cantor. Whooper Swan*Estatus:* accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Tadorna tadorna. Ànnera blanca , àneda blanca (ME). Tarro blanco.
Common Shelduck*Estatus:* reproductor escàs (MA) i rar (ME-EI-FO-CA). Hivernant moderat (MA-EI), escàs (ME) i rar (FO). Migrant escàs (ME-EI-FO).*Selecció:* reproducció, fenologia i màxims mensuals.*Balears:* la hivernada, segons el cens de gener, és de **635** ex. que impliquen una lleugera disminució del - 4,19 % respecte a la mitjana (2009-2023). Repartits per illes: Mallorca 436 ex. entre 8 localitats; Menorca amb 54 ex. entre 7 localitats; Eivissa amb 116 ex. entre 3 localitats; i Formentera amb 29 ex. entre 2 localitats (MOUSSA *et al.*, 2024).*Mallorca:* es Salobrar, Campos. S'estima hi han criat d'entre 71-**77** parelles (LOP). Màxims mensuals (BAU; BAC, GRD; MUN; BEN-MAC/eBird; TSL-PLG/Observation).S'Albufera. S'estima que hi han criat d'entre 60-**65** parelles. Observació de polls a partir del 9-V però el màxim de naixements ha estat fins la primera setmana de juny, i joves del 14-V. Màxims mensuals (RES, VIC, PNAM; BAU; BEN-MAC/eBird).Albufereta, Alcúdia. Enguany s'estima que hi han criat **3** parelles (LOP). Observació de polls a partir del 27-IV fins al 29-V. Màxims mensuals (RES, VIC, RNSA; BAU; KRR/eBird; DPR-HBK-GSR/Observation).Bassa de Can Guidet, Palma. Enguany s'estima que hi han criat **5** parelles (LOP). Observació de comportaments nupcials a partir del 11-IV. Màxims mensuals (MUN, MOU; MUT; MMA; BAU; ZMR-GAB/eBird; TSL/Observation).

Dates <i>T. tadorna</i>	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Salobrar	238	70	132	164	175	50, P	46	14	+	12	62	145
Albufera	152	42	127	100	P	60, P	J	42	14	21	81	92
Albufereta	8	12	12	11, P	11, P	9, P	7, J	1	2	+	12	6
Can Guidet	13	11	50	36	20, P	20, P	1, J	J	-	1	2	2

Estany de ses Gambes, Santanyí. Enguany no han criat. 22 ex. el 24-I (GUT, ART, MTM, MTA, MUÑ), i 76 ex. el 20-VI (MUN, SOL).

Estany dels Tamarells, ses Salines. 4 ex. el 24-I (GUT, ART, MTM, MTA, MUÑ).

Prat de Maristany, Alcúdia. 3 ex. el 28-I (MUN, SLM).

Estany de na Borges, Santa Margalida. 2 ex. l'1-IV (JMO/Observation).

Basses de Son Navata, Felanitx. Enguany hi ha criat **1** parella amb 4 polls el 23-IV (MTA/eBird)

Estanys de sa Sal, Colònia de Sant Jordi. 38 ex. el 27-XII (MUN, PAM).

Menorca: Albufera des Grau, Maó. Observació de polls a partir del 13-VI. Màxims mensuals (PNAG).

Salines d'Addaia-Mongofre, Es Mercadal-Maó. Observació de joves a partir del 12-VI amb 18 ex. Màxims mensuals (PNAG; PIR*).

<i>T. tadorna</i>	13-I	15-II	14-III	10-IV	10-V	13-VI	11-VII	14-VIII	12-IX	9-X	14-XI	17-XII
Dates	6	6	8	7	12	13 A, 6 P, 3 J	2 J	1 J	0	0	0	1
Albufera												
Addaia-Mongo.	21	24	29	37	33	23 A, 9 P, 9 J	5 A, 16 J	0	3 J	0	0	23*/29
Dates	13-I	14-II	13-III	11-IV	10-V	12-VI	10-VII	13-VIII	11-IX	10-X	13-XI	11*XII

Son Bou, Alaior. 12 ex. el 20-III (PIR). 13 joves el 18-V (OVV/Observation).

Salines de Fornells, es Mercadal. Una parella amb 11 polls el 21-IV (ARL). 32 ex. el 21-V (BAZ/eBird).

Eivissa: ses Salines, Sant Josep. S'estima que hi han criat un mínim de **3** parelles. Observació de polls a partir del 5-VI (GAB/eBird). Màxims mensuals (CST-SEP/eBird; MSN/Observation).

Dates	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Ex.	116	+	+	20	P, J	109, P, J	48, J	J	+	30	+	+

Formentera: Estany Pudent. 30 ex. el 26-V. Observació de polls a partir del 26-V, i un màxim de 20 joves el 6-VII (SEP/eBird).

Tadorna ferruginea. Ànnera canyella, àneda canyella (ME). Tarro canelo. Ruddy Shelduck

Estatus: hivernant rar (MA). Migrant rar. **Selecció:** tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Spatula querquedula (abans *Anas querquedula*). Cetla blanca, sel·la blanca (MA-FO), anedó blanc (ME), sorçó (EI). Cerceta carretona. Garganey

Estatus: hivernant rar (MA). Migrant moderat (MA) i escàs (ME-EI-FO). Crija esporàdica 2007 i 2008 (MA).

Selecció: reproducció, fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: s'Albufera. Màxims mensuals, i dates extremes (RES, VIC, PNAM; CLF).

Albufereta, Alcúdia. Màxims mensuals i dates extremes (RES, VIC, RNSA).

Bassa de Can Guidet, Palma. Màxims mensuals (ZMR-MAC/eBird; TSL/Observation).

Dates <i>S. querquedula</i>	I	11*II	21*III	18*28**IV	V	VI	VII	28*30**VIII	IX	1*X	XI	XII
Albufera	3	4	3	4*	0	0	0	2*	4	2	2	1♂, 1♀
Albufereta	0	(1♂)*	0	0		0	0	0	0	0	0	0
Can Guidet	0	0	4*	3**	0	0	0	1**	-	3*	0	0

Pas prenupcial, primeres cites el 20-III amb un grup de 63 ex. (juntament amb 7 *Spatula clypeata*) a la badia de Palma (BAZ-ZMR/eBird), el 21-III amb 68 ex. a es Salobrar (Campos) (MAC/eBird), i el 24-III amb 25 ex. a cap de ses Salines (BEN-MAC/eBird). Darrera cita el 28-IV (3 ex.) a la bassa de Can Guidet (TSL/Observation).

Pas postnupcial, primera cita el 23-VIII (1 ex.) a la bassa de Can Guidet (MAC/eBird), i darrera el 30-VIII (2 ex.) a s'Albufera (RES/eBird).

Hivernada. 1 mascle l'11-XII a s'Albufera (GAB/eBird).

Menorca: Prat de Son Bou, Alaior. 20 ex. el 20-III (PIR), 1 parella el 25-IV (BNN/eBird), i 1 femella l'11-VIII (PIR).

Basses de Lluriac, es Mercadal. 1 mascle adult el 24-IV (BML/eBird).

Spatula discors (abans *Anas discors*). Cetla alablava, sel·la alablava (MA-EI-FO), anedó alablau (ME). Cerceta alizazul. Blue-winged Teal

Estatus: divagant. **Selecció:** tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Spatula clypeata (abans *Anas clypeata*). Cullerot. Pato cuchara. Northen Shoveler

Estatus: reproductor rar (MA). Hivernant abundant (MA), moderat (ME), escàs (EI) i rar (FO). Migrant moderat (MA-ME) i escàs (EI-FO). Cria esporàdica 2018 (ME-FO).

Selecció: reproducció, fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: s'Albufera. Durant tot el mes de maig s'anota una colla a la zona de sa Roca i es Ras, amb la bona notícia de la detecció d'1 femella amb 5 polls el 4-V a sa Roca. No criava des del 2018. Un màxim de 653 ex. el 12-I. Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (RES, VIC, PNAM; BAU; BEN-HIN-LOP-CST-MAC/eBird).

Albufereta, Alcúdia. Un màxim de 67 ex. el 13-XI. Màxims mensuals (RES, VIC, RNSA; BAU; MUN, BRD; KRG/Observation).

Prat de Maristany, Alcúdia. Un registre aïllat l'11-VII amb 3 ex. Màxims mensuals (PNAM; BAU; MUN; TSL/Observation).

Es Salobrar, Campos. Màxims mensuals (GOBM; MUN, MNT; JMO/Observation).

Bassa de Can Guidet, Palma. Màxims mensuals (MUN, MOU, PAM, GIA, MAN; MCM; MMA; ZMR/eBird).

Dates <i>S. clypeata</i>	I	II	21*III	14*30**IV	9*14**V	VI	VII	26*27**VIII	7*11**IX	X	6*XI	XII
Albufera	653	25	600	210	3♂*, P	J	2	6/19**	145	176	600	412
Albufereta	40	42	30	2*	0	0	0	0	5**/17	11	85	90
Maristany	81	45	40	2♂	2**	0	(3)	0	1*	-	6	30
Salobrar	0	0	7*	0	0	0	0	0	0	0	15*	5
Can Guidet	307	34	24	2♂/1**	0	0	0	34*	23	102	113	253

Bassa de Capdepera. 19 ex. el 18-I, 11 ex. el 18-IX (MAN), 39 ex. el 14-XI (MAN, TRN).

Bassa d'Artà. 6 ex. el 18-I, 7 ex. el 18-IX (MAN).

Bassa de Son Jordi, Son Servera. 1 ex. el 18-I (MAN).

Estany des Tamarells, ses Salines. 60 ex. el 24-I (GUT, ART, MTM, MTA, MUÑ),

Bassa de Son Navata, Felanitx. 3 ex. el 7-IX (JMO/Observation).

Golf de Santa Ponça, Calvià. 10 ex. el 15-XI (MAN, TRN).

Menorca: Albufera des Grau, Maó. Màxims mensuals (PNAG).

Salines d'Addaia-Mongofre, Es Mercadal-Maó. Màxims mensuals (PNAG).

<i>S. clypeata</i>	13-I	15-II	14-III	10-IV	10-V	13-VI	11-VII	14-VIII	12-IX	9-X	14-XI	17-XII
Dates	139	86	58	2	5	4	0	0	1	0	22	93
Albufera												
Addaia-Mongo.	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
Dates	13-I	14-II	13-III	11-IV	10-V	12-VI	10-VII	13-VIII	11-IX	10-X	13-XI	16-XII

Son Bou, Alaior. 1 ex. l'1-V (CAU, VLN).

Basses de Lluriac, es Mercadal. 7 ex. el 4-IX (COL).

Bassa de Morella, Maó. 5 ex. el 13-XI (PNAG).

Eivissa: Pas prenupcial, el 29-IV (1 ex.) a ses Feixes, al prat de ses Monges (SEP).

Pas postnupcial, el 9-XI amb 6 ex. a Santa Eulària (SDW/Observation).

Mareca strepera (abans *Anas strepera*). Griseta, grisa (MA), àneda griseta (ME), ànnera griseta (EI-FO). Ànade friso. Gadwall

Estatus: reproductor i sedentari moderat (MA) i escàs (ME). Hivernant escàs (MA-ME-EI) i rar (FO). Migrant escàs (MA-ME) i rar (EI-FO).

Selecció: reproducció i màxims mensuals.

Balears: la hivernada segons el cens de gener, amb **638** ex. que impliquen un lleuger descens del -1,72 % respecte a la mitjana (2009-2023). Repartits per illes: per Mallorca 296 ex. entre 6 localitats; Menorca amb 340 ex. entre 5 localitats; i Formentera amb 2 ex. a una localitat (Mussa *et al.*, 2024).

Mallorca: s'Albufera. Enguany s'estima que hi han criat unes 20-**30** parelles, el que representa una disminució del 57,1 % respecte a l'any anterior. Observació de polls a partir del 28-IV fins al 13-VI. Màxims mensuals (RES, VIC, PNAM; MUN; BAU; BEN-SOL-CST-MAC/eBird).

Albufereta, Alcúdia. Un màxim de 60 ex. el 18-I. Màxims mensuals (RES, VIC, RNSA; MUN).

Prat de Maristany, Alcúdia. Màxims mensuals (BAU; MUN, BRD; MAC-CST/eBird).

Dates <i>M. strepera</i>	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	4*X	XI	XII
Albufera	237	+	30	110, P	P	14, P	J	+	10	55	9	18
Albufereta	60	12	12	21	12	5, P	1, J	2	6	2	35	41
Prat Maristany	22	14	+	8	+	+	3	24	7	+	+	44

Pas prenupcial, el 25-III amb 2 ex. (♂,♀) a ses basses de Son Navata (Felanitx) (JMO/Observation),

Golf Son Muntaner. Amb 7 ex. el 7-IV (MUN, VIA), 8 ex. (5♂, 3♀) el 25-IV (MUN), i 11 ex. el 26-V (MUN, VIA).

Bassa d'Artà. 2 ex. el 16-IV (MMA, MAN).

Pas postnupcial. el 18-IX amb 4 ex. a la bassa d'Artà i 3 ex. a la bassa de Son Servera (MAN),
Bassa de Can Guidet. Primera cita l'1-X amb 2 ex. (ZMR/eBird).

Es Salobrar, Campos. 2 ex. el 14-XI (BAU).

Hivernada. Bassa d'Artà. 3 ex. el 18-I (MAN).

Menorca: Albufera des Grau, Maó. Màxims mensuals (PNAG).

Salines d'Addaia-Mongofre, Es Mercadal-Maó. Màxims mensuals (PNAG).

<i>M. strepera</i>	13-I	15-II	14-III	10-IV	10-V	13-VI	11-VII	14-VIII	12-IX	9-X	14-XI	17-XII
Dates	127	26	30	37	46	33	25	21	21	97	65	49
Albufera												
Addaia-Mongo.	4	1	0	0	4	0	2	0	0	0	0	0
Dates	13-I	14-II	13-III	11-IV	10-V	12-VI	10-VII	13-VIII	11-IX	10-X	13-XI	16-XII

Prat de son Bou, Alaïor. Un màxim de 59 ex. el 23-IV (BNN/eBird).

Basses de Lluriac, es Mercadal. 22 ex. el 16-IX (MAC/eBird).

Eivissa: Pas postnupcial. 1 ex. el 30-VIII a ses Salines (SEP).

Mareca penelope (abans *Anas penelope*). Siulador, xiulaire (ME). Ánade silbón. Eurasian Wigeon

Estatus: hivernant moderat (MA-ME), escàs (EI) i rar (FO). Migrant moderat (MA-ME) i escàs (EI-FO).

Selecció: fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: s'Albufera. Un màxim de 32 ex. el 12-I. Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (RES, VIC, PNAM; BAU).

Albufereta, Alcúdia. Un màxim de 32 ex. el 12-I. Màxims mensuals (RES, VIC, RNSA).

Bassa de Can Guidet, Palma. Màxims mensuals (MUN, MOU; BAZ; MCM; MAC-CST-ZMR/eBird).

Dates	I	5*12**II	III	IV	14*V	VI	VII	VIII	30*IX	20*X	XI	15*XII
<i>M. penelope</i>												
Albufera	32	28	10	4	1*	0	0	0	0	1*/5	12	6
Albufereta	2	2*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1*
Can Guidet	5	5/3**	0	0	0	0	0	0	1*	1	-	3

Pas postnupcial, darreres cites el 18-XI (1 ♀) a Sóller (RAB), i el 6-XI (4 ex.) al Salobrar de Campos (MUN).

Menorca: Albufera des Grau, Maó. Màxims mensuals (PNAG).

Salines d'Addaia-Mongofre, Es Mercadal-Maó. Màxims mensuals (PNAG).

<i>M. penelope</i>	13-I	15-II	14-III	10-IV	10-V	13-VI	11-VII	14-VIII	12-IX	9-X	14-XI	17-XII
Dates	6	0	2	0	4	0	0	0	0	0	17	46
Albufera												
Addaia-Mongo.	4	1	0	0	4	0	2	0	0	0	0	0
Dates	13-I	14-II	13-III	11-IV	10-V	12-VI	10-VII	13-VIII	11-IX	10-X	13-XI	16-XII

Son Bou, Alaior. 3 femelles i 1 mascle el 26-X (PIR).

Bassa de Morella, Maó. 1 ex. el 13-XI (PNAG).

Formentera: estany Pudent. 1 ex. el 29-I (SEP).

Anas platyrhynchos. Collverd, capblau (MA-FO), collblau (ME). Ànade azulón. Mallard

Estatus: reproductor i sedentari moderat (MA-ME) i rar (EI-FO-CA).
Hivernant abundant (MA-ME), escàs (EI) i rar (FO). Mi-grant abundant (ME) i escàs (EI-FO). Accidental (DR).

Selecció: reproducció i màxims mensuals.

Mallorca: s'Albufera. Enguany una baixada molt notable de la població reproductora, s'estima que hi han criat unes 50-**60** parelles, això és una disminució del 40 % respecte a l'any passat. Observació de polls a partir del 14-IV fins al 24-VII, i joves del 4-VII. Un màxim de 1.153 ex. el 12-I. Màxims mensuals (RES, VIC, PNAM; MUN; TSL/Observation; MAC-CST/eBird).

Albufereta, Alcúdia. Un màxim de 173 ex. el 12-I. Màxims mensuals (RES, VIC, RNSA; MUN; ZMR/eBird).

Prat de Maristany, Alcúdia. Enguany hi han criat almenys **4** parelles (LOP). Observació de polls a partir del 27-V fins al 12-VI. Màxims mensuals (MUN, SLM; CLF; SOL; MAC-GAB/eBird).

Es Salobrar, Campos. Màxims mensuals (GOBM; BAC, GRD; MUN; BAU; PHP-LNS-TSL/Observation).

Bassa de Can Guidet, Palma. Observació de polls a partir del 30-IV. Màxims mensuals (MUN, MOU, PAM; GIA; MMA; MCM; BEN-MAC-ZMR/eBird; TSL/Observation).

Dates	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
<i>A. platyrhynchos</i>												
Albufera	1153	+	+	48, P	P	25+P	P, J	+	80	+	32	+
Albufereta	179	42	36	20+P	37+P	18+J	17+J	12	25	76	46	36
Maristany	20	11	7	33	16+P	22+P	J	+	75	-	+	+
Salobrar	71	+	11	+	11	+	+	5	+	57	75	12
Can Guidet	46	20	31	40+P	40+P	33+J	33, J	49	+	120	57	70

Prat de Sant Jordi, Palma. 16 ex. el 13-I, 5 polls el 9-III (LOP-MAC/eBird).

Basses de Binissalem. 15 ex. el 13-I, 12 ex. (♀+7 polls) el 18-III (RES/eBird).

Bassa d'Artà. 7 ex. el 18-I (MAN), 47 ex. el 16-IV, 10 ex. el 12-VI (MMA, MAN), i 3 ex. el 18-IX (MAN).

Estany de ses Gambes, Santanyí. 47 ex. el 24-I (GUT, ART, MTM, MTA, MUÑ), i 3 ad. amb 4 polls el 20-VI (MUN, SOL).

Estany des Tamarells, ses Salines. 106 ex. el 24-I (GUT, ART, MTM, MTA, MUÑ), 31 ad. amb 2 polls petits el 20-VI (MUN, SOL).

Bassa Depuradora de Palma II. 26 ex. (presència joves) el 29-III (BAZ/eBird), 12 ex. l'1-V (TSL/Observation).

Golf de Santa Ponça, Calvià. 41 ex. el 15-IV (MMA, MAN), 52 ex. el 13-VI, 89 ex. el 17-IX, i 98 ex. el 15-XI (MAN).

Bassa de Capdepera. 3 ex. el 16-IV (MMA, MAN).

Bassa de Son Servera. 8 ex. el 16-IV, i 9 ex. el 12-VI (MMA, MAN).

Basses de Son Navata, Felanitx. 8 ex. el 16-IV (MMA, MAN).

Golf Son Muntaner. 22 ex. el 25-IV (MUN), 27 ex. el 26-V (presència polls) (MUN, VIA).

Embassament del Gorg Blau (Escorca). 5 mascles el 3-V (HKS/Observation).

La Gola, Port de Pollença. 8 ex. el 15-V (KRR/eBird).

Basses de Magaluf, Calvià. 2 ex. el 25-IX (GLT).

Menorca: Albufera des Grau, Maó. Màxims mensuals (PNAG).

Salines d'Addaia-Mongofre, Es Mercadal-Maó. Màxims mensuals (PNAG).

Bassa de Morella, Maó. Màxims mensuals (PNAG).

<i>A.platyrhynchos</i> Dates	13-I	15-II	14-III	10-IV	10-V	13-VI	11-VII	14-VIII	12-IX	9-X	14-XI	17-XII
Albufera	76	163	117	123	143 A, 7 P	134	41	245	127	215	131	139
Addaia-Mong. Morella	41	25	35	24	18	21	0	0	2	94	44	18
Dates	13-I	14-II	13-III	11-IV	10-V	12-VI	10-VII	13-VIII	11-IX	10-X	13-XI	16-XII

Basses de Lluriac, es Mercadal. 60 ex. el 21-III (COL).

Prat de Son Bou, Alaior. Un màxim de 133 ex. el 25-VII (GWR/eBird).

Eivissa: Ses Feixes, Eivissa. Enguany hi han criat un mínim de **2** parelles al Prat de ses Monges. Observació de polls a partir del 26-III fins a l'11-V (SEP, ESR).

Anas acuta. Coer, àneda coallarga (EI). Ánade rabudo. Northern Pintail
Estatus: hivernant escàs (MA-ME-EI) i rar (FO). Migrant escàs (EI-FO).
Selecció: fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: s'Albufera. Un màxim de 9 ex. el 18-XI. Màxims mensuals, i dates extremes (RES, VIC, PNAM).

Albufereta, Alcúdia. Un màxim de 12 ex. el 12-I. Màxims mensuals i dates extremes (RES, VIC, RNSA; ZMR-BEN-HIN-LOP-MAC-GRP/eBird; PHP/Observation).

<i>A. acuta</i> Dates	18*I	II	23*III	IV	V	VI	VII	VIII	1*IX	X	24*X	XI	XII
Albufera	7/2*	0	0	0	0	0	0	0	1*/2	2	9	4	
Albufereta	12	11	6/1*	0	0	0	0	0	0	0	2*	10	

Hivernada, 1 ex. el 24-I a l'estany des Tamarells (ses Salines) (GUT, ART, MTM, MTA, MUÑ), i 2 ex. del 26-XI fins al 7-XII a la bassa de Can Guidet (ZMR).

Pas prenupcial, darrera cita el 16-IV (2 ex.) a es Salobrar (Campos) (SUA).

Pas postnupcial, el 16-X i 14-XI amb 1 ex. a la bassa de Can Guidet (MUN, PAM, GIA; MMA).

Es Salobrar, Campos. 3 ex. el 31-X (BAC, GRD), i 13 ex. el 6-XI (GAB/eBird).

Menorca: Albufera des Grau, Maó. Màxims mensuals (PNAG).
Salines d'Addaia-Mongofre, es Mercadal-Maó. Màxims mensuals (PNAG).

<i>A. acuta</i> Dates	13-I	15-II	14-III	10-IV	10-V	13-VI	11-VII	14-VIII	12-IX	9-X	14-XI	17-XII
Albufera	2	8	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Addaia-Mongo.	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Dates	13-I	14-II	13-III	11-IV	10-V	12-VI	10-VII	13-VIII	11-IX	10-X	13-XI	16-XII

Salines de Mongofre, Maó. 2 ex. el 25-I (PIR).

Albufera d'es Grau, Maó. 6 ex. el 5-III (PIR).

Son Bou, Alaior. 1 femella el 26-X (PIR).

Eivissa: Pas postnupcial, 2 ex. el 15-XI a ses Salines (Sant Josep) (SDW/Observation).

Formentera: 2 ex. el 29-I (SEP).

Anas crecca. Cetla rossa, sel·la rossa (MA-FO), anedó (ME), sorgó d'hivern (EI). Cerceta común. Eurasian Teal

Estatus: hivernant abundant (MA), moderat (ME) i escàs (EI-FO). Migrant moderat (MA-ME), escàs (EI-FO), i rar (CA-DR).

Selecció: fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: s'Albufera. Un màxim de 788 ex. el 12-I. Màxims mensuals, i dates extremes amb (RES, VIC, PNAM; BAZ; BAU; CST-RDW-GAB/eBird)

Albufereta, Alcúdia. Un màxim de 89 ex. el 28-XII. Màxims mensuals (RES, VIC, RNSA)

Bassa de Can Guidet, Palma. Màxims mensuals (MUN, MOU, PAM, GIA; MCM; ZMR/eBird)

A. crecca Dates	I	12*II	III	14*23**IV	30*V	VI	VII	26*VIII	12*IX	X	XI	XII
Albufera	788	190	121	112/7**	3*	1♂, 1♀	1♂, 2♀	43	310	250	418	600
Albufereta	50	38	10	4*	0	0	0	0	6*	9	26	89
Can Guidet	12	4*	0	0	0	0	0	30*	1	24	3	5

Es Salobrar, Campos. 4 ex. el 14-I (GOBM), 3 ex. el 31-X (BAC, GRD).

Prat de Maristany, Alcúdia. 6 ex. el 15-I, 2 ex. (♂, ♀) el 24-IV (CLF), 6 ex. el 7-IX (MUN).

Bassa d'Artà. 44 ex. el 18-I (MAN).

Basses de Magaluf, Calvià. 5 ex. el 20-I (BAZ, PAM, MOU), 1 ex. el 25-III (SCH/Observation).

Estany des Tamarells, ses Salines. 9 ex. el 24-I (GUT, ART, MTM, MTA, MUÑ),

Bassa de Son Navata, Felanitx. 14 ex. el 7-IX (JMO/Observation).

Menorca: Albufera des Grau, Maó. Màxims mensuals (PNAG).

Bassa de Morella, Maó. Màxims mensuals (PNAG).

A. crecca Dates	13-I	15-II	14-III	10-IV	10-V	13-VI	11-VII	14-VIII	12-IX	9-X	14-XI	17-XII
Albufera	46	62	132	8	0	0	0	0	0	0	7	30
Morella	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	10
Dates	13-I	14-II	13-III	14-IV	10-V	12-VI	10-VII	13-VIII	11-IX	10-X	13-XI	16-XII

Eivissa: Hivernada, uns màxims de 4 ex. el 12-I a ses Salines (YAR).
Pas postnupcial, primer registre el 30-VIII (2 ex.) a ses Salines (SEP).

Santa Eulària des Riu. Un màxim de 4 ex. el 9-XI (SDW/Observation).

Formentera: 14 ex. el 29-I (SEP).

Marmaronetta angustirostris. Rosseta, sel·la marbrenca (MA-ME-EI-FO). Cerceta pardilla. Marbled Duck

Estatus: reproductor rar (MA). Migrant rar. Reforçaments poblacionals des del 2009 s'Albufera MA i 2014 a ses Salines (EI).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: s'Albufera. Enguany s'estima que hi han criat **4-5** parelles, amb una supervivència de polls-joves molt baixa. Observació de comportaments territorials a partir del 5-III, i polls de l'11-VI. Màxims mensuals (RES, VIC, PNAM; BAU).
Prat de Maristany, Alcúdia. Màxims mensuals (BAZ; MUN).

Dates	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Albufera	31	17	20	37	11	14, P	18, J	2	18	25	21	11
Maristany	0	4	0	0	0	0	5	1	2	-	-	-

Albufereta, Alcúdia. 2 ex. el 27-III (RES, VIC, RNSA).

Bassa de Can Guidet, Palma. 2 ex. El 28-III (ZMR/eBird).

Menorca: Son Bou, Alaior. 2 ex. el 4-VI, 6 ex. el 19-VIII, 4 ex. el 22-VIII i 2 ex. el 15-X (PIR).

Netta rufina. Becvermell, ànec de bec vermell (ME), japonès (EI). Pato colorado. Red-crested Pochard

Estatus: reproductor i sedentari escàs (MA-ME). Reintroduït el 1991 (MA). Hivernant rar (EI-FO). Migrant rar (EI). Accidental (CA)

Selecció: reproducció i màxims mensuals a MA; tots els registres a ME-EI-FO.

Mallorca: s'Albufera. Observació de polls a partir del 24-IV. Un màxim de 57 ex. el 12-I. Màxims mensuals (RES, VIC, PNAM).

Albufereta, Alcúdia. Màxims mensuals (RES, VIC, RNSA).

Prat de Maristany, Alcúdia. Enguany s'estima que hi han criat **2** parelles (LOP). Observació de polls a partir del 16-IV.

Màxims mensuals (MUN, SLM; BAU; CLF; NLS/eBird; HBK-DPR-GSR/Observation). Al setembre pràcticament sec, amb només un parrell de bassiots d'aigua (MUN).

Bassa de Can Guidet, Palma. Màxims mensuals (ZMR).

<i>N. rufina</i> Dates	I	II	27*28**III	10*IV	V	VI	VII	VIII	IX	1*16*X	XI	XII
Albufera	57	16	32	12, P	6+P	1	2	1♀	1	1	0	7
Albufereta	6	-	1**	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maristany	4	4	7	12, P	3, P	+	1	-	1	-	-	2
Can Guidet	0	0	5*/6	2*	0	0	0	0	0	3*	0	0

Es Salobrar, Campos. 2 ex. el 24-VII (JMO/Observation).

Bassa d'Artà. 14 ex. el 18-IX (MAN).

Menorca: Albufera des Grau, Maó. Màxims mensuals (PNAG; CRTA; OVV[®]/Observation).

<i>N. rufina</i> Dates	13-I	15-II	14-III	10-IV	20-V	13-VI	11-VII	14-VIII	18-IX	9-X	14-XI	17-XII
Albufera	0	0	11	4	7 ^B	5 A, 3 J	0	0	3 ^A	6	0	0

Basses de Lluriac, es Mercadal. 1 ex. el 7-XI (PIR).

Aythya ferina. Moretó capvermell, moretó (MA-FO), rabassot (ME). Por-rón común. Common Pochard

Estatus: reproductor escàs (MA). Hivernant moderat (MA-ME), escàs (EI) i rar (FO). Migrant moderat (ME), escàs (EI-FO), i rar

(CA). Cria esporàdica 2008, 2013 (ME).

Selecció: reproducció, màxims mensuals i dades d'interès.

Mallorca: s'Albufera. Una temporada de cria dolenta ha donat una estima de 20-**25** parelles reproductores. Observació de polls a partir del 14-V, i joves el 18-VI. Un màxim de 182 ex. el 12-III. Màxims mensuals (RES, VIC, PNAM; MAC-CST-GRP/eBird).

Albufereta, Alcúdia. Un màxim de 55 ex. el 21-I. Màxims mensuals (RES, VIC, RNSA).

Prat de Maristany, Alcúdia. Enguany s'estima que hi han criat **3** parelles (LOP). Observació de polls a partir del 26-IV (MUN). Màxims mensuals (MUN, SLM, SOL, BRD; CLF; BAU; TOM/eBird).

Bassa Can Guidet, Palma. Un màxim de 211 ex. el 3-XI (MUN). Màxims mensuals (MUN, MOU, PAM, GIA; BAU; TSL/Observation; CST-MAC-MCM-ZMR/eBird). Al setembre pràcticament sec, amb només un parell de bassiots d'aigua (MUN).

Dates <i>A. ferina</i>	30*I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	17*IX	X	9*XI	XII
Albufera	88	11	182	50	38, P	68, J	36, J	36	35	36	11	3
Albufereta	55/9*	0	0	0	0	0	0	0	1*	2	27*	0
Maristany	65	87	2	10 ♂, 8 ♀, P	15, P	J	5	-	4	+	8	102
Can Guidet	102	69	14	24	15 ♂, 3 ♀	38	13	60	80	174	211	140

Bassa d'Artà. 3 ex. el 18-I, 1 ex. el 18-IX, i 9 ex. el 14-XI (MAN).

Bassa de Son Navata, Felanitx. 1 mascle el 25-III (JMO/Observation).

Bassa de Capdepera. 11 ex. el 16-IV (MMA, MAN), i 39 ex. el 18-IX (MAN).

Menorca: Albufera des Grau, Maó. Màxims mensuals (PNAG; CRS^A-GWR^B/eBird).

<i>A. ferina</i> Dates	17-I	15-II	14-III	10-IV	10-V	13-VI	11*VII	14-VIII	12-IX	9-X	14-XI	17-XII
Albufera	300 ^A	312	65	3	6	0	13*/15 ^B	15	31	55	141	124

Eivissa: Pas postnupcial, 1 femella el 9-XI a Santa Eulària des Riu (SDW/Observation).

***Aythya ferina* x *nyroca*.** Híbrid de moretó x parda. Híbrido de Porrón comú x Porrón pardo (ES)

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: bassa de Can Guidet, Palma. 1 ex. des del 3-I al 12-II, 11-14-VI, i 1-XI al 7-XII (ZMR-MAC-BEN-HIN-CST-LOP/eBird).

Basses de Magaluf, Calvià. 1 ex. des del 22 al 25-XI (GRP/eBird).

Aythya nyroca. Parda, rabassot menut (ME). Porrón pardo. Ferruginous Duck
Estatus: reproductor rar i sedentari escàs (ME). Hivernant rar (MA-ME). Migrant rar (MA-EI-FO).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: s'Albufera. Màxims mensuals (RES, VIC, PNAM; MMA; BAU; MAC-GRP/eBird).

Bassa de Can Guidet, Palma. Present 1 ex. des del 7-XII-2023. Un màxim de 5 ex. el 16-X (ZMR/eBird). Màxims mensuals (MAC-ZMR-BAZ-GRC-LUQ-SOL-SST-BEN-HIN-CST-RES-DVJ/eBird; SCH/Observation; MUN).

Dates <i>A. nyroca</i>	I	II	III	5*30**IV	V	VI	VII	VIII	14*IX	X	12-14*X	XI	XII
Albufera	1♂	-	1♂/2	1♂, 1♀**	0	0	0	0	0	0	1*	0	
Can Guidet	1	1	1♂	1*	0	0	0	0	2*/3	5	2	1	

Prat de Maristany, Alcúdia. 1 ex. l'11 i 17-II (BEN-LOP-MAC-HIN-MLL/eBird).

Bassa de Son Servera. 1 mascle el 12-VI (MMA, MAN).

Basses de Magaluf, Calvià. 1 mascle i 1 femella el 6-IX (GRP/eBird).

Bassa d'Artà. 2 mascles el 18-IX, i 1 femella el 14-XI (MAN).

Menorca: Albufera des Grau, Maó. Màxims mensuals (PNAG; MJJA-BCNB-/eBird).

<i>A. nyroca</i> Dates	13-I	4-II	14-III	10-IV	7-V	13-VI	11-VII	14-VIII	11-IX	9-X	14-XI	17-XII
Albufera	0	2 ^A	0	0	1♂ ^B	1♂, 2♀	1♀	0	1 ^C	1	0	0

Golf de Son Parc, es Mercadal. 11 ex. el 24-III (CAU, VEG, VLN) i fins a 3 ex. entre el 13-X i 29-XII (PIR).

Sa Muntanyeta, Maó. Un màxim de 3 ex. el 22-XII (PIR).

Aythya collaris. Moretó de collar. Porrón de collar. Ring-necked Duck
Estatus: accidental (MA). *Selecció:* tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Aythya fuligula. Moretó de plomall, moretó de puput (MA-FO), rabassot de cresta (ME), ànec de plomall (EI). Porrón moñudo. Tufted Duck

Estatus: hivernant moderat (MA), escàs (ME), i rar (EI).

Selecció: fenologia, màxims mensuals i tots els registres a EI.

Mallorca: s'Albufera. Màxims mensuals (RES, VIC, PNAM; BAU; GAB/eBird).

Prat de Maristany, Alcúdia. Un màxim de 6 ex. el 6-II (BAU).
Màxims mensuals (MUN, SLM; BAU).

Dates	I	II	7*12**III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	13*27**XI	XII
Albufera	5	4	5/2*	0	0	0	0	0	0	0	2*/1**	0
Maristany	1	6	2**	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Bassa d'Artà. 2 ex. el 12-VI (MMA, MAN).

Aythya marila. Moretó buixot, moretó cabussó (MA), rabassot cabussó (ME). Porrón bastardo. Greater Scaup

Estatus: accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Aythya affinis. Moretó menut. Porrón bola. Lesser Scaup

Estatus: accidental.

Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Somateria mollissima. Eider. Eider. Common Eider

Estatus: accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Melanitta fusca. Ànnera fosca, àneda fosca (ME). Negrón especulado. Velvet Scoter

Estatus: accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Melanitta nigra. Ànnera negra, negreta (MA-EI-FO), àneda negreta (ME). Negrón común. Common Scoter

Estatus: Hivernant rar. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Clangula hyemalis. Ànnera glacial. Havelda. Long-tailed Duck

Estatus: accidental. *Selecció:* Tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Bucephala clangula. Ànnera d'ulls grocs, rabassot d'ulls grocs (ME). Porrón osculado. Common Goldeneye

Estatus: accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Mergus serrator. Ànnera peixatera, ànnera peixatera (MA-EI-FO), àneda peixatera (ME). Serreta mediana. Red-breasted Merganser

Estatus: hivernant escàs (MA-ME) i rar (EI-FO-CA).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: badia d'Alcúdia. Present, 1 ex. el 13-XI (RES, VIC, PNAM).
Eivissa: Platja des Codolar, Sant Josep. 2 ex. sobre la mar el 15-XI (SDW/Observation).

***Oxyura leucocephala*.** Ànnera capblanca. Malvasía cabeciblanca. White-headed Duck

Estatus: introduïda a s'Albufera de Mallorca el 1993, 95 i 04, hi crià el 1996, 98, 99, 00 i 2001. Extingit des de 2008. Accidental (EI). **Selecció:** tots els registres rebuts.

Cap registre rebut.

***Phasianus colchicus*.** Faisà. Faisán. Common Pheasant

Estatus: reproductor i sedentari (ME), escàs (EI) i rar (MA). Sotmesa a gestió cinegètica.

Selecció: reproducció i noves localitats.

Mallorca: Esporles. 1 ex. el 3-XI (GRD/Observation).
 Basses de Magaluf, Calvià. Un grup de 6 ex. el 30-I (GAB/eBird).

Bassa de Can Guidet, Palma. Un màxim de 10 ex. el 14-II (HIN-MOU-PAM/eBird).

S'Albufera, 1 femella l'11-VII, i 1 ex. des del 24-X fins al 30-XI (RES, VIC, PNAM).

Menorca: es Mercadal. 1 ex. a la carretera de Fornells el 23-IV (PIR).

Eivissa: Santa Eulària. Un màxim de 2 adults el 15-VI (SDW/Observation).

Formentera: Pla des Pou, 1 ex. devora la carretera de la Savina a Sant Francesc el 21-VI (MUN).

La Mola, 1 ex. el 23-VI (MUN).

***Coturnix coturnix*.** Guàtlera. Codorniz. Common Quail

Estatus: reproductor i sedentari moderat (ME-EI). Reproductor moderat (MA) i escàs (FO). Migrant moderat (MA-ME-EI), escàs (FO), i rar (CA-DR). Sotmesa a gestió cinegètica.

Selecció: reproducció i fenologia.

Mallorca: Pas prenupcial, primeres cites: el 26-III amb 3 mascles cantant a es Blanquer de Maria (RES/eBird), i el 28-III (1 ex.) a l'Albufereta (RES, VIC, RNSA).

Pas postnupcial, darrer ex. el 14-VIII (4 ex.) a Capdepera (VWG/Observation).

Menorca: Santa Marianna, Maó. 1 ex. el 19-II (PIR).

Llucmaçanes, Maó. 1 ex. el 29-X (GRI).

Basses de Lluriac, es Mercadal. Sentit 1 ex. el 4-III, 6 ex. el 21-V, i reclamant 2 ex. el 30-X (MJJ/eBird), 1 ex. el 7-XI (PIR).

Alectoris rufa. Perdiu. Perdiz roja. Red-legged Partridge

Estatus: reproductor i sedentari abundant (MA-EI), moderat (ME-FO), i rar (DR). Sotmesa a gestió cinegètica.

Selecció: reproducció.

Mallorca: primers cants a partir del 25-II (varis ex.) a Lluçmajor (GRD).

Formentera: La Mola, 4 adults amb 3 polls el 23-VI (MUN).

Caprimulgus ruficollis. Siboc. Chotacabras pardo. Red-necked Nightjar

Estatus: migrant rar.

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: Ingressa al Centre de Recuperació de Fauna Silvestre, **1** jove amb trauma desconegut el 14-V, procedent de Palma, posteriorment es alliberat.

Per a més informació d'aquest registre homologat, vegeu l'informe del Comitè de Rareses de Balears.

Caprimulgus europaeus. Enganapastors, cap d'olla (EI). Chotacabras gris. European Nightjar

Estatus: reproductor moderat (MA-ME) i escàs (EI). Migrant moderat (MA-ME-EI) i escàs (FO-CA-DR). Falta informació.

Selecció: reproducció, fenologia.

Mallorca: Pre-nupcial. S'Albufera, 2 ex. el 3-V, i 1 ex. el 21-VI (RES, VIC, PNAM).

Post-nupcial, darrers registres, el 15-IX (1 ex.) a Felanitx (JMO/Observation), el 4-IX (2 ex.) al cap de ses Salines (MON), el 6-VIII (3 ex.) al pla de Vilafranca (JMO/Observation), i el 31-VII (2 ex.) a Alcúdia (CLF).

Cabrera: Pas pre-nupcial, 3 mascles cantant el 17-V (RES/eBird).

Menorca: Alaïor. Sentit 1 mascle el 23-V (OVV/Observation).

Golf de Son Parc, es Mercadal. 2 ex. alimentant-se de tallanassos que capturen al vol però que ingereixen al terra el 17-VII i les setmanes posteriors (PIR).

Eivissa: Pre-nupcial, primera cita el 7-V amb 1 ex. a l'illot des Vedranell (Sant Josep) (MAR, SEP) i a Sant Joan de Labritja (SDW/Observation), i el 8-V (1 ex.) al camí de cala d'Aubarca (YAR).

Sant Joan. Primers cants el 13-V amb 1 ex. sentit a les 21:46 h a Xarraca, i el 14-V amb 1 ex. sentit a les 5:31 h (SDW/Observation).

Torrent de Buscatell. Un màxim de 4 mascles cantant l'11-VII (DVR/eBird).

Pas post-nupcial, darrera cita el 6-IX (sentit 1 ex.) a Can Joan Lluqui (Sant Joan) (RTR/Observation).

Tachymarptis melba (abans *Apus melba*). Falzia reial, vinjola reial (ME).

Vencejo real. Alpine Swift

Estatus: reproductor escàs (MA-ME), i rar (EI?-CA). Migrant moderat (MA) i escàs (ME-EI-CA), i rar (DR).**Selecció:** reproducció i fenologia.**Mallorca:** Pas prenupcial, primeres cites el 10-III amb 2 ex. a s'Albufera i 2 ex. a l'Albufereta (RES, VIC, PNAM, RNSA), l'11-III amb 5 ex. a Can Cullerassa (Pollença) (RYL/eBird), el 23-III (1 ex.) a la talaia d'Albercutx (Pollença) (BAZ, BEN, MAC, HIN, DVE, AKK), i el 26-III amb 1 ex. al port de Pollença (KRG/Observation) i 1 ex. a la bassa de Can Guidet (ZMR/eBird). Castell de Santueri, Felanitx. Nidificant. Primera cita el 2-IV amb 2 ex. (MTA/eBird). Un màxim de 13 ex. el 2-V (JMO/Observation).Pas postnupcial, darreres cites el 2-X amb 3 ex. a Felanitx (JMO/Observation), i un grup de 15 ex. al Castell d'Alaró (LUQ/eBird).**Cabrera:** 4 ex. el 17-IV (VIC).**Menorca:** Prenupcial, primera cita el 3-IV amb 1 ex. a Son Bou (Alaior) (PIR).Postnupcial, darrer registre el 9-X amb 6 ex. a cala Galdana (THR/eBird). Un màxim de 50 ex. el 23-IX al barranc de Cala'n Porter (Alaior) (MRF/eBird).**Eivissa:** Pas prenupcial, primeres cites el 26-IV (2 ex.) al cap Llentrisca (Sant Josep) (SDW/Observation), i el 29-IV (2 ex.) al puig des Savinar (SEP). Darrera el 17-V (2 ex.) al cap Llentrisca (SDW/Observation).***Apus apus***. Falzia, vinjola (ME). Vencejo comú. Common Swift**Estatus:** reproductor abundant, i escàs (CA-DR). Migrant abundant, moderat (CA).**Selecció:** fenologia i reproducció.**Mallorca:** Pas prenupcial, primeres cites, el 10-III amb 1 ex. a l'Albufereta (RES, VIC, RNSA), el 12-III (1 ex.) a la bassa de Can Guidet (ZMR), el 13-III amb 20 ex. forta entrada a s'Albufera (RES, VIC, PNAM), el 19-III (1 ex.) a Santa Maria (MMA), i el 22-III (21 ex.) al Salobrar de Campos (PHP/Observation). Un màxim de 2.000 ex. el 27-IV a es Blanquer de Maria (BEN-MAC/eBird), i 1.800 ex. (27-III) i 200 ex. (11-IV) alimentant-se sobre la làmina d'aigua amb elevada presència de mosquits quironòmids a la bassa de Can Guidet (ZMR-MAC/eBird; MMA).Dades de reproducció: Primers polls encara amb plomissol el 16-V i darrer el 9-VIII, $n = 485_{\text{polls}}$ (COFIB, Conselleria d'Agricultura, Pesca i Medi Natural). Però molt per sota de la mitjana $X = 535,1_{\text{polls}}$, $n = 10_{\text{anys}}$. Les elevades entra-

des de polls estan relacionades amb temperatures altes al juny-juliol, sobretot quan superen els 35 °C (PARPAL, 2021) (LOP).

Pas postnupcial, darrers registres, l'1-XI (1 ex.) a es Capdellà (Calvià) (TIM/eBird), i el 4-X (2 ex.) a s'Albufera (RES, VIC, PNAM).

Cabrera: Un màxim de 65 ex. el 26-IV (TSL/Observation).

Menorca: Un màxim de 61 ex. el 18-VI a La Vall (VDR/Observation).

Eivissa: Prenupcial, primeres cites el 29-III amb un grup de 20 ex. a Sant Josep (PRG), i el 3-IV (10 ex.) a Sant Joan (SDW/Observation).

Formentera: Prenupcial, primera cita el 19-III amb 10 ex. a Sant Francesc (SEP).

Apus pallidus. Falzia pàl·lida, vinjola pàl·lida (ME). Vencejo pálido. Pallid Swift

Estatus: reproductor moderat (MA-ME-EI), i rar (CA). Migrant moderat (MA-ME-EI), escàs (CA), i rar (DR). Falta informació.

Selecció: reproducció, fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: Pas prenupcial, primeres cites el 12-III amb 11 ex. a la bassa de Can Guidet (ZMR/eBird), i el 13-III (4 ex.) a s'Albufera (RES, VIC, PNAM). Un màxim de 150 ex. el 24-IV a la bassa de Can Guidet (TSL/Observation).

Reproducció. Primers polls encara amb plomissol el 3-VII i darrer el 9-IX, $n = 6$ ^{polls}, procedents de Palma (1 ex.) i Inca (4 ex.). Per sota la mitjana $X = 10$ ^{polls}, $n = 10$ ^{anys} (COFIB, Conselleria d'Agricultura, Pesca i Medi Natural).

Pas postnupcial, darrers registres el 18-X (3 ex.) al cap de ses Salines (GORA), i el 16-IX amb 7 ex. a s'Albufera i 2 ex. a l'Albufereta (RES, VIC, PNAM, RNSA).

Centre de Recuperació de Fauna Silvestre. Ingressats 1 adult el 18-VI (procedent de Pollença) i 3 polls volants per trauma desconegut entre el 16-VII i el 5-VIII (Alcúdia, Inca), i 1 poll volander per desnutrició l'11-X (Alcúdia) (COFIB, Conselleria d'Agricultura, Pesca i Medi Natural).

Menorca: Alaïor. 2 ex. el 18-V (OVV/Observation).

Eivissa: Pas prenupcial, primera cita el 3-IV amb 10 ex. a Sant Joan, i el 6-IV (1 ex.) a Sant Josep (SDW/Observation).

Port d'Eivissa. Uns 20 ex. de la colònia nidificant el 8-IV (PRG).

Pas postnupcial, darrer registre el 22-IX amb 15 ex. a Sant Josep (VDM/Observation).

Formentera: Pas prenupcial, l'1-IV amb 8 ex. al cap de Barbaria (MTF/Observation), i el 16-VI amb 1 ex. a ses Salines (SDW/Observation). Primeres cites per a l'illa (N. de l'ed.).

Clamator glandarius. Cucui reial. Críalo. Great Spotted Cuckoo*Estatus:* migrant rar (MA-ME-EI-FO-CA-DR).*Selecció:* tots els registres rebuts.*Mallorca:* Pas prenupcial, 1 ex. gravat reclamant a l'inici de la nit a es Comú de s'Albufera el 3-IV (RES/NFC).***Coccyzus americanus***. Cucui becroc. Cucillo piquigualdo. Yellow-billed Cuckoo*Estatus:* divagant (MA). *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Cuculus canorus. Cucui, cuc (FO). Cuco. Common Cuckoo*Estatus:* reproductor (FO?), moderat (MA) i escàs (ME-EI). Migrant moderat, i rar (CA-DR).*Selecció:* reproducció i fenologia.*Mallorca:* prenupcial, primeres cites el 31-III amb 1 ex. entrava a terra des del mar a Capdepera (QUN), el 3-IV (1 ex.) a s'Albufera (RES, VIC, PNAM), i el 14-IV (1 ex.) al pla de s'Amarador a s'Albufera (MUT).Pas postnupcial, darrera cita el 13-XI amb 1 ex. al barranc de s'Amarador al PN de Mondragó (MUT), cita molt tardana (N. de l'ed.).*Dragonera:* Pas prenupcial, el 19-IV amb 1 ex. (JMO/Observation).*Menorca:* prenupcial, primers registres el 17-IV amb 1 ex. al Talatí de Baix (Maó)(PIR), l'1-V amb 1 femella rotja a Son Bou (Alaior) (CAU, VLN), i el 21-V amb 1 ex. al camí de Tramuntana (es Mercadal) (PIR).Postnupcial, 1 ex. l'1-VII a Subaida (Alaior) (VLN).*Formentera:* Prenupcial, 1 ex. cantant el 6-IV a l'Era des Pla (MAR).***Columba livia***. Colom salvatge. Paloma bravía. Rock Dove*Estatus:* reproductor i sedentari abundant (MA-ME) i escàs (EI-DR). Hivernant rar (FO). Accidental (CA).*Selecció:* reproducció i màxims.*Mallorca:* Punta de n'Amer, Sant Llorenç. Un esbart de 5 ex. per la costa el 12-I (GON).

S'Algar, Portocolom. 8 ex. i se senten polls als nius dels penya-segats el 16-III (RES/eBird).

Ariant, Pollença. Un màxim de 200 ex. l'1-VIII (GON).

Vall d'Orient, Bunyola. Un grup de 120 ex. l'1-XII (GRP/eBird).

Dragonera: 1 ex. el 19-V (CST/eBird).*Menorca:* La Mola, Maó. 6 ex. el 25-IV (BML/eBird).

Punta Grossa. 4 ex. als penya-segats el 16-IX (MAC/eBird).

Eivissa: Platja d'en Bossa. Petit grup en vol sobre la mar, devora l'illot de ses Rates el 28-I (SEP/eBird).

***Columba oenas*.** Xixell. Paloma zurita. Stock Dove

Estatus: migrant rar (MA-ME-CA).

Selecció: tots els registres rebuts.

Cabrera: 1 ex. el 25-X.

Registre pendent d'homologació pel Comitè de Rareses de Balears.

***Columba palumbus*.** Tudó. Paloma torcaz. Common Wood Pigeon

Estatus: reproductor i sedentari abundant (MA), moderat (ME-EI-FO), i escàs (CA-DR). Hivernant moderat (ME-EI) i escàs (MA). Migrant escàs (MA).

Selecció: reproducció, màxims mensuals i dades d'interès.

Mallorca: S'Albufera. Primers festejos a partir del 12-II, joves del 4-VI (RES, VIC, PNAM). Un màxim de 300 ex. el 12-I i 20-IV (TOM/eBird).

Basses de Magaluf, Calvià. 450 ex. el 17-IV (SOL/eBird).

Son Pillo, Calvià. Un màxim de 375 ex. el 16-V (BEN/eBird).

Es Salobrar, Campos. Un màxim d'un grup volant de 400 ex. el 30-XII (MAC-CST/eBird).

Menorca: Ses Casetes Noves, es Mercadal. Un màxim de 120 ex. el 23-VIII (COL).

Eivissa: Ses Feixes, Eivissa. Un màxim de 300 ex. l'11-V (SEP/eBird).

Formentera: Un màxim de 14 ex. a la Mola el 23-VI (MUN).

***Streptopelia turtur*.** Tórtora, tórtera (MA-EI), torta (FO). Tórtola europea. European Turtle Dove

Estatus: reproductor moderat, i rar (CA). Migrant abundant (ME), moderat (MA-EI), i escàs (CA-DR).

Selecció: reproducció i fenologia.

Mallorca: Prenupcial, primeres cites, el 5-III amb 45 ex. a la depuradora de s'Albufera (MUN, SOL), el 28-III (1 ex.) a Can Culle-rassa (Pollença) (BEN-MAC/eBird), l'11-IV (1 ex.) a la bassa de Can Guidet (ZMR/eBird), i el 13-IV (2 ex.) a Portopetro (Santanyí) (MON).

Es Salobrar, Campos. Concentració de 17 ex. migrants just al sud de la Salinera l'1-V (RES/eBird).

Postnupcial, darrers registres, el 14-IX amb 3 ex. al pla de Vilafranca (BAZ) i l'Albufereta (RES, VIC, RNSA), i el 13-IX (2 ex.) a Felanitx (JMO/Observation).

Cabrera: primera cita el 22-IV amb 1 ex. (JMO/Observation).

Dragonera: primera cita el 22-IV (1 ex.), i darrer el 18-IX (2 ex.) (JMO/Observation).

Menorca: Prenupcial, primeres cites, el 13-III amb 1 ex. vist i escoltat al camí de s'Ablegai (Alaior) (CAU), i el 3-IV amb 1 ex. a Son Bou (Alaior) (PIR).

Postnupcial, darrer registre amb 1 ex. el 22-X a Biniarroi (Alaior) (PIR).

Aire: (Sant Lluís). Pas prenupcial, **47** ex. capturats per a anellament entre l'1-IV fins al 15-V. Una tendència positiva del **6,9 %** per al període 1995-2024 (mitjana= 44 ex.; n= 1.275). Un màxim de 14 captures durant la pentada del 6-V fins al 10-V (AIRE).

Eivissa: Hivernada, **1** ex. en un grup amb 10 turques i 1 colom salvatge el 22-I a Sant Josep (PRG). Primera vegada que se cita al gener a les Balears (N. de l'ed.).

Prenupcial, primeres cites el 24-IV amb 13 ex. a Sant Josep de sa Talaia (SDW/Observation), i el 10-VI amb 29 ex. al camí des Fornàs (Eivissa) (GAB/eBird).

Reproducció, primeres còpules el 10-VI al camí des Fornàs (GAB/eBird).

Postnupcial, darrers registres el 21-IX amb 14 ex. a ses Salines (Sant Josep) (SEP/eBird), i el 13-IX (5 ex.) a Buscas-tell (YAR).

Formentera: prenupcial, un màxim de 15 ex. a la Mola el 23-VI (MUN).

Streptopelia decaocto. Tórtera turca. Tórtola turca. Eurasian Collared Dove

Estatus: reproductor i sedentari abundant (MA-ME-EI), i rar (FO). Accidental (CA-DR). Colonització recent: dècada dels 90 a MA, 1997 a ME, 1999 a EI i 2004 a FO.

Selecció: reproducció i noves localitats.

Mallorca: Campus de la UIB, Palma. Observació de joves a partir del 17-IV (MRP/eBird).

Bassa de can Guidet, Palma. Un màxim de 34 ex. el 3-XII (BAU).

Palma. 1 ex. al niu covant el 31-XII (SAS).

S'Albufera. Observació de joves a partir del 23-VII (RES, VIC, PNAM).

Spilopelia senegalensis (abans *Streptopelia senegalensis*). Tórtera del Senegal. Tórtola senegalesa. Laughing Dove

Estatus: accidental (MA-EI-CA).

Selecció: tots els registres rebuts.

Eivissa: Can Guerxo, Sant Josep. Present tot l'any amb un màxim de **3** ex. el 30-IV. A la mateixa zona on es venen observant almenys des de 2016.

Registres pendents d'homologació pel Comitè de Rareses de la SEO/BirdLife.

Tetrax tetrax. Sisó. Sisón. Little Bustard

Estatus: accidental (MA-ME). **Selecció:** tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Rallus aquaticus. Rascló, polla de ropit (MA-FO), riscló (EI). Rascón.
Water Rail

Estatus: reproductor i sedentari moderat (MA) i escàs (ME-EI). Hivernant rar (FO). Migrant rar (EI-FO).

Selecció: reproducció i presència estival i hivernal.

Mallorca: s'Albufera. Per detecció de cants territorials, s'estima que hi han criat 250-**300** parelles. Observació de polls fins a l'1-VII, i joves a partir del 23-VI fins al 6-VIII (RES, VIC, PNAM). Albufereta, Alcúdia. Nidificant. Un màxim de 75 ex. el 12-I (RES, VIC, RNSA).

Es Salobrar, Campos. Nidificant. Un màxim de 2 ex. el 14-I (GOBM).

Basses de Magaluf, Calvià. 1 ex. el 25-III (SCH/Observation), 1 ex. el 13-XII (GLT).

Prat de Maristany, Alcúdia. 1 ex. el 2-IV (BAU).

Menorca: Salines de Mongofre, Maó. 1 ex. l'1-I (PIR).

Albufera des Grau, Maó. 2 ex. reclamant el 20-V (OVV/Observation).

Crex crex. Guàtlera maresa, rei de guàtleres (ME). Guíon de codornices.
Corn Crane

Estatus: migrant rar (MA-EI-FO-CA). **Selecció:** tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Porzana porzana. Rascllet pintat, rascllet (MA-EI-FO). Polluela pintoja.
Spotted Crake

Estatus: hivernant escàs (ME) i rar (MA-EI). Migrant escàs, i rar (CA).
Falta informació.

Selecció: fenologia i dades d'interès.

Mallorca: hivernada, 1 ex. el 6-II s'Albufera (RES, VIC, PNAM).

Pas prenupcial, s'Albufera, present 1 ex. el 2 i 20-III (RES, VIC, PNAM; WTS/eBird).

Postnupcial, 1 ex. el 15-VII, i 1 ex. el 24-X s'Albufera (RES, VIC, PNAM).

Menorca: Golf de Son Parc, es Mercadal. 1 ex. detectat el 12-VI i observat de manera intermitent fins a final d'any. Un màxim de 2 ex. el 14-XII (PIR).

Gallinula chloropus. Polla d'aigua. Polla de agua. Common Moorhen

Estatus: reproductor i sedentari abundant (MA), moderat (ME), escàs (EI) i rar (FO). Hivernant escàs (MA-EI). Migrant moderat (ME), escàs (MA-FO), i rar (CA).

Selecció: reproducció i fenologia.

- Mallorca:** s'Albufera. S'estima que hi han criat entre 200 i **250** parelles, una mica inferior respecte de l'any passat. Observació de polls del 7-IV, i joves fins al 24-VIII (RES, VIC, PNAM; HIN-LOP/eBird).
 Albufereta, Alcúdia. Observació de polls a partir del 23-IV, i joves del 24-VII (RES, VIC, RNSA).
 Depuradora de Binissalem. 2 parelles amb polls el 29-IV (RES/eBird).
 Prat de Maristany, Alcúdia. S'estima que hi han criat entre 5 i **10** parelles (LOP). Observació de joves a partir del 21-VII (TOM/eBird). Un màxim de 26 ex. (adults i juvenils) el 7-IX (MUN).
 Golf de Santa Ponça, Calvià. 7 ex. dels quals 1 és poll el 13-VI (MAN).
 Golf de Son Quint, Palma. Observació de joves a partir del 30-VI (MAC/eBird).
 La Gola, Port de Pollença. 1 jove i 2 adults el 14-VIII (CTOG/eBird, TOM/eBird).
 Basses de Magaluf, Calvià. Observació de joves a partir del 18-VIII (GRP/eBird).
- Menorca:** Albufera des Grau, Maó. Màxims mensuals (PNAG).

<i>G. chloropus</i> Dates	13-I	15-II	14-III	10-IV	10-V	13-VI	11-VII	14-VIII	12-IX	9-X	14-XI	17-XII
Albufera	1	1	0	1	0	4	1	6	12	0	0	4

- Eivissa:** Reproducció, Observació de 4 adults i 1 poll el 2-VI a ses Feixes (Vila) (GAB/eBird).
- Formentera:** estany Pudent. Parella amb 5 polls el 6-VII (SEP/eBird).

***Fulica atra*.** Fotja. Focha. Eurasian Coot

Estatus: reproductor i sedentari abundant (MA) i moderat (ME). Hivernant abundant (MA-ME), escàs (EI) i rar (FO). Migrant abundant (ME), escàs (MA-EI-FO), i rar (CA).

Selecció: reproducció i màxims mensuals.

- Mallorca:** s'Albufera. Enguany nidificació tardana i amb una minva molt notable, hi han criat entre 20-**30** parelles. Primers ous a partir de l'11-V, polls el 30-V i segona posta amb polls del 6-VII fins al 24-VII, i joves del 4-VI (sol fer dues o tres postes). Un màxim de 415 ex. el 12-I. Màxims mensuals (RES, VIC, PNAM; BAU; MUT; TSL/Observation; MAC-CST/eBird).
 Albufereta, Alcúdia. Observació de polls a partir del 9-V. Un màxim de 191 ex. el 7-XI. Màxims mensuals (RES, VIC, RNSA; BAU).

Prat de Maristany, Alcúdia. Observació de polls a partir del 26-IV (MUN). Màxims mensuals (CLF; MUN, SOL; BAU; BRD; HIN-LOP-MAC/eBird)

Estany des Ponts, Alcúdia. Màxims mensuals (PNAM; PHP-LOP/eBird).

Bassa de Can Guidet, Palma. Un registre aïllat l'11-VI. Màxims mensuals (MUN, MOU, PAM, GIA, MMA; ZMR/eBird).

Dates <i>Fulica atra</i>	I	II	23*III	23*IV	V	VI	VII	5*VIII	IX	X	16*XI	XII
Albufera	415	34	90	30	30, P	30, J	P	+	15	65	140	45
Albufereta	76	17	14	11	6, P	6, J	2, J	19	60	180	191	65
Prat Maristany	177	127	54	76, P	, P	, J	119, J	120	36	+	6	42
Estany Ponts	164	180	165/8*	-	-	-	-	-	-	-	9*	127
Can Guidet	8	3	4	3/1*	0	(2)	0	1*/3	13	80	12	9

Golf de Son Quint, Palma. 2 ex. el 15-I (MAC, LOP, VDE, PAM).

Observació de polls a partir del 25-IV (MAC/eBird).

Golf Son Muntaner, Palma. 22 ex. el 15-I (MAC, LOP, VDE, PAM).

Observació de 3 adults amb polls el 26-V (MUN, VIA).

Basses de Magaluf, Calvià. S'estima que hi han criat 2 parelles (LOP). Observació de polls a partir del 15-III fins al 9-IV (BEN/eBird; JMO/Observation).

Basses de Son Navata, Felanitx. S'estima que hi han criat 2 parelles. Observació de nius a partir de l'1-IV, polls del 23-IV (MTA/eBird).

Bassa depuradora de Binissalem. 2 parelles amb polls el 29-IV (RES/eBird).

Basses del pla de Vilafranca. Parella amb polls l'1-V (RES/eBird).

Golf de Santa Ponça, Calvià. 25 ex. dels quals 2 son polls el 13-VI (MAN).

Menorca: Albufera des Grau, Maó. Màxims mensuals (PNAG).

Salines d'Addaia-Mongofre, es Mercadal-Maó. Màxims mensuals (PNAG).

<i>Fulica atra</i> Dates Albufera	13-I	15-II	14-III	10-IV	10-V	13-VI	11-VII	14-VIII	12-IX	9-X	14-XI	17-XII
	1.339	760	678	414	381	522	801	991	972	1.170	1.447	1.091
Addaia-Mongo.	20	22	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dates	13-I	14-II	13-III	11-IV	10-V	12-VI	10-VII	13-VIII	11-IX	10-X	13-XI	16-XII

Prat de Son Bou. Un màxim de 12 ex. el 18-V (OVV/Observation).

Eivissa: Santa Eulària des Riu. Un màxim de 16 ex. el 9-XI (SDW/Observation).

Bassa de sa Rota. Un màxim de 16 ex. el 9-XI (SDW/eBird).

Fulica cristata. Fotja banyuda. Focha cornuda. Crested Coot

Estatus: reproductor i sedentari rar (MA). Accidental (ME).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: s'Albufera. Enguany hi ha criat **1** parella han surat 2 joves, però solament un d'ells ha arribat a adult, a causa dels moixos. Observació de nius a partir del 25-III, ous del 31-III, i polls del 27-IV. Màxims mensuals (RES, VIC, PNAM; WNS/eBird).

Dates	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Albufera	6	5	6	6, P	6, J	5	2	2	3	6	3	3

Porphyrio alleni. Gall faveret, gallet faver africà (MA-EI). Calamoncillo africano. Allen's Gallinule

Estatus: divagant (MA-EI). *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Porphyrio porphyrio. Gall faver. Calamón. Western Swamphen

Estatus: reproductor i sedentari moderat (MA) i escàs (ME). Reintro-
duït el 1991 (MA). Accidental (EI-FO).

Selecció: reproducció i dades d'interès.

Mallorca: s'Albufera. S'estima que hi han criat un mínim de **150** parelles. Observació de polls a partir del 13-IV fins al 21-V, i joves del 22-V fins al 21-VIII (RES, VIC, PNAM).

Albufereta, Pollença. Observació de joves a partir del 16-V (RES, VIC, RNSA).

Basses de Son Navata, Felanitx. 2 ex. amb niu el 3-IV (MTA/eBird).

Basses de Magaluf, Calvià. 3 adults amb 2 polls el 6-V (TIM/eBird).

Golf de Santa Ponça, Calvià. 5 adults i 2 polls el 13-VI (MAN, TRN).

Bassa de la depuradora de Binissalem. Niu amb 2 joves el 14-VI (RES/eBird).

Prat de Maristany, Alcúdia. 2 joves el 17-VIII (MAC/eBird).

Menorca: Albufera des Grau, Maó. Màxims mensuals (PNAG; OVV^A/Observation).

Salines d'Addaia-Mongofre, es Mercadal-Maó. Màxims mensuals (PNAG).

<i>P. porphyrio</i> Dates	13-I	15-II	14-III	10-IV	10-V	13-VI	11-VII	14-VIII	12-IX	9-X	14-XI	17-XII
Albufera	1	0	3	2	8^A	1	0	0	0	0	0	0

Prat de son Bou, Alaior. 10 ex. pel canyissar el 28-VIII (ETP/eBird).

Zapornia pusilla (abans *Porzana pusilla*). Rascllet menut, rascllet petit (MA-EI-FO), rascllet gris (ME). Polluela chica. Baillon's Crane

Estatus: accidental (MA-ME-CA). Falta informació.

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: Talaia d'Albercutx, Pollença. Gravat durant la nit **1** ex. el 4-IV. Jardí Botànic de Sóller. **1** ex. el 13-IV.

Per a més informació d'aquests registres homologats, vegeu l'informe del Comitè de Rareses de Balears.

Zapornia parva (abans *Porzana parva*). Rasclató. Polluela bastarda. Little Crane

Estatus: hivernant rar (ME). Migrant rar (MA-ME). Falta informació.

Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Grus grus. Grua, grulla (FO). Grulla. Common Crane

Estatus: hivernant escàs (MA-ME-EI). Migrant escàs (MA-ME-FO-DR), i rar (EI-CA).

Selecció: tots els registre rebuts.

Mallorca: Pas prenupcial, la tornada del gruix de la població hivernant des d'Espanya a les zones de reproducció al nord d'Europa, va començar al 12-II fins al 10-III. Present a s'Albufera 1 ex. del 6 al 15-II (BAU; RES, VIC, PNAM).

Talaia d'Albercutx, Pollença. Un grup de 9 ex. en vol cap al N el 16-III (BEN-HIN-LOP/eBird).

Pas postnupcial, primera cita el 2-XI amb un grup de 6 ex. a un conreu de Lluçmajor (ANG/eBird).

S'Albufera. 2 ex. del 9-XI fins al 29-XII (RES, VIC, PNAM).

Salobrar de Campos. Present diferents grups des del 6-XI (6 ex.) fins al 30-XII (5 ex.) (MUN; RSE-GAB-MAC-CST/eBird), amb un màxim de 23 ex., a la posta de sol s'han tirat dins un sementer de sa Barrala el 28-XII (MAS).

Menorca: Hivernada, 6 ex. pasturant a una tanca el 30-X a Son Catlar (Ciutadella) (VLN).

Entre l'illa de l'Aire (Sant Lluís), les Salines de Mongofre (Maó) i el camí de Tramuntana (es Mercadal), s'observen grups de 6 a 22 ex. entre el 5-XI i el 30-XII (COL; PIR; FRX/eBird).

Basses de Lluriac, es Mercadal. 2 ex. en vol el 27-XII (CAU, VLN).

Eivissa: Puig d'en Valls. 2 ex. el 25-XI (PAL).

Turnix sylvaticus. Guàtlera andalusa. Torillo. Common Buttonquail

Estatus: accidental (FO). *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Otis tarda. Pioc salvatge. Avutarda comú. Great Bustard

Estatus: accidental (FO). *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Tachybaptus ruficollis. Setmesó, soterí petit (ME). Zampullín chico.
Little Grebe

Estatus: reproductor i sedentari moderat (MA), escàs (ME) i rar (EI).
Hivernant escàs (MA-EI), moderat (ME), i rar (FO). Mi-
grant moderat (ME), escàs (EI) i rar (FO). Falta informació.

Selecció: reproducció i dades d'interès.

Mallorca: s'Albufera. Enguany s'estima que hi han criat entre 20-25
parelles. Màxims mensuals (RES, VIC, PNAM; BAU; TSL-BXT/
Observation).

Albufereta, Alcúdia. Màxims mensuals (RES, VIC, RNSA; MUT).

Prat de Maristany, Alcúdia. S'estima que hi han criat entre 4 i
6 parelles (LOP). Observació de polls a partir del 27-V fins
al 17-VI (GAB/eBird), i joves del 17-VI (MAC/eBird). Màxims
mensuals (MUN, SLM, BRD; CLF; SOL; BAU; GAB/eBird).

Bassa de Can Guidet, Palma. Màxims mensuals (MUN, PAM,
MOUM; MCM; TOM-RED-SBT-DLG/eBird; TSL/Observation; MAC-
ZMR/eBird).

Dates <i>T. ruficollis</i>	I	II	III	IV	V	29*VI	VII	VIII	5*IX	X	XI	XII
Albufera	100	18	15	9	20	26, P	P, J	+	+	+	+	+
Albufereta	10	2	2	1	1	1*	0	0	2*	4	8	2
Maristany	30	29	37	42	17, P	26, P, J	33, J	+	30			28
Can Guidet	46	12	32	33	32, P	36	19	145	14	120	71	56

Son Real, Santa Margalida. 4 ex. a la desembocadura del
torrent des Ravellar el 16-I (GON).

Torrent de Son Bauló, Santa Margalida. 1 ex. a la desembo-
cadura el 16-I (GON).

Bassa de Capdepera. 23 ex. el 18-I (MAN), 4 ex. el 16-IV, 5
ex. el 12-VI (MMA, MAN), 22 ex. el 18-IX, 7 ex. el 14-XI
(MAN).

Bassa d'Artà. 3 ex. el 18-I (MAN), 14 ex. el 16-IV (MMA, MAN),
29 ex. el 12-VI, 66 ex. el 18-IX, 46 ex. el 14-XI (MAN).

Bassa de Son Servera. 25 ex. el 18-I (MAN), 16 ex. el 12-VI
(MMA, MAN), 18 ex. el 18-IX (MAN).

Estany des Ponts, Alcúdia. 1 ex. el 28-I (MUN, SLM).

Golf de Santa Ponça, Calvià. 7 ex. el 15-IV (MMA, MAN), 9 ex. el 13-VI, 19 ex. el 17-IX, 32 ex. el 15-XI (MAN).

Bassa de Son Servera. 17 ex. el 16-IV, 33 ex. el 14-XI (MMA).

Bassa de Son Navata, Felanitx. 1 ex. el 25-IV (TSL/Observation).

Estany des Tamarells, ses Salines. 1 ex. el 24-I (GUT, ART, MTM, MTA, MUÑ), 2 ex. el 20-VI (MUN, SOL).

Basses de Magaluf, Calvià. 2 ex. alimentant polls el 3-VIII (GRP/eBird).

Es Salobrar, Campos. 2 ex. el 28-XII (MAS).

Menorca: Albufera des Grau, Maó. Màxims mensuals (PNAG).

<i>T. ruficollis</i> Dates	13-I	15-II	14-III	10-IV	10-V	13-VI	11-VII	14-VIII	12-IX	9-X	14-XI	17-XII
Albufera	262	193	172	121	80	204	233	261	179	132	175	330

Prat de Son Bou, Alaior. 1 ex. el 16-18-V (OVV/Observation).

Eivissa: Santa Eulària des Riu. Un màxim de 24 ex. el 3-V (SDW/Observation).

***Podiceps grisegena*.** Soterí gris. Somormujo cuellirrojo. Red-necked Grebe

Estatus: accidental. **Selecció:** tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

***Podiceps cristatus*.** Soterí gros. Somormujo lavanco. Great Crested Grebe

Estatus: reproductor i sedentari rar (MA) i escàs (ME). Hivernant rar (MA) i escàs (ME). Migrant rar (MA-EI-FO-CA).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: s'Albufera. Enguany s'estima que hi han criat **4** parelles.

Observació de joves a partir del 21-VI fins a l'1-VIII. Màxims mensuals (RES, VIC, PNAM; BAU; HKS/Observation; BAZ/eBird).

Albufereta, Alcúdia. Un màxim de 9 ex. el 26-XI. Màxims mensuals (RES, VIC, RNSA; BRC, BAZ; MUN; LOP-MAC-HIN/eBird).

Prat de Maristany, Alcúdia. Enguany hi han criat com a mínim **2** parelles (LOP). Observació de polls a partir del 29-VI (MAC/eBird). Màxims mensuals (BAU; MUN; BAZ, FRO; MAC-LOP-RBR/eBird).

Dates <i>P. cristatus</i>	I	II	III	IV	V	29*VI	VII	VIII	15*IX	X	XI	XII
Albufera	5	1	2	2	+	+	J	J	7	+	+	4
Albufereta	8	7	2	2	2	1*	0	0	1*/2	4	9	5
Maristany	0	3	4	3	+	3, P	6, P	4, J	-	-	-	-

Estany des Ponts, Alcúdia. Un grup de 8 ex. el 5-III (VIA/eBird).

Bassa de Can Guidet, Palma. 1 ex. l'11-IV (MMA).

Embassament de Cúber, Escorca. 1 ex. el 24-IV (TSL/Observation).

Menorca: Albufera des Grau, Maó. Màxims mensuals (PNAG).

Salines d'Addaia-Mongofre, Es Mercadal-Maó. Màxims mensuals (PNAG; PIR^A; CRS^B-MJJ^C-SLN^D-BNN^E-SRL^F-THR^G/eBird).

<i>P. cristatus</i>	13-I	4-II	27-III	20-IV	10-V	13-VI	11-VII	31-VIII	12-IX	10-X	14-XI	17-XII
Dates	20 ^B	14 ^C	22 ^D	30 ^E	29	22	13	8 ^F	26	15 ^G	32	20
Albufera												
Addaia-Mong.	0	1	9	3	3	6	4	2	2	2	5	15 ^A
Dates	13-I	14-II	13-III	11-IV	10-V	12-VI	10-VII	13-VIII	11-IX	10-X	13-XI	11-XII

***Podiceps auritus*.** Soterí orellut, soterí de coll blanc (MA-EI-FO). Zampullín cuellirrojo. Horned Grebe

Estatus: accidental. **Selecció:** tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

***Podiceps nigricollis*.** Cabussonera, soterí (MA-EI), soterí collnegre (ME). Zampullín cuellinegro. Black-necked Grebe

Estatus: estival no reproductor rar (FO). Hivernant abundant (FO), moderat (ME) i escàs (MA-EI). Migrant moderat (ME), escàs (MA-EI), i rar (CA).

Selecció: màxims mensuals i fenologia.

Mallorca: bassa de Can Guidet, Palma. Un màxim de 85 ex. el 5-XII (MAC/eBird). Un registre aïllat el 13-VI (MMA). Màxims mensuals (ZMR; MUN, PAM, GIA, MOU; BAZ-MAC-CST/eBird; HKS/Observation).

S'Albufera. Màxims mensuals (RES, VIC, PNAM).

Dates	I	II	III	5*IV	4*V	VI	4*VII	5*VIII	IX	4*X	XI	XII
<i>P. nigricollis</i>												
Can Guidet	34	6	6	1	1*	(5)	0	1*/7	32	53	80	85
Albufera	-	-	-	1*	0	0	0	0	0	1*	1	2

Bassa de Capdepera. 1 ex. el 18-I (MMA, MAN).

Bassa d'Artà. 1 ex. el 18-I, 1 ex. el 14-XI (MAN).

Es Salobrar, Campos. 1 ex. l'11-IX (MON).

Bassa d'Artà. 1 ex. el 18-IX (MAN).

Golf de Santa Ponça, Calvià. 1 ex. el 15-XI (MAN).

Prat de Maristany, Alcúdia. Un màxim de 2 ex. el 5-XII (MUN, BRD).

Menorca: Albufera des Grau, Maó. Un màxim de 25 ex. el 2-III (CAU, VEG, VLN). Màxims mensuals (PNAG; CLX^A/Observation).

<i>P. nigricollis</i> Dates	13-I	15-II	2-III	10-IV	3-V	13-VI	11-VII	14-VIII	12-IX	9-X	14-XI	17-XII
Albufera	4	2	25	2	1 ^A	0	0	0	0	3	0	24

Basses de Lluriac, es Mercadal. 1 ex. el 26-VIII (PIR).

Salines d'Addaia-Mongofre, es Mercadal-Maó. 2 ex. el 10-X (PNAG).

Eivissa: ses Salines, Sant Josep. Un màxim de 300 ex. el 17-X (SDW/eBird). Màxims mensuals (CZM-VDM-ODS/Observation).

Dates	I	II	III	IV	V	VI	29*VII	VIII	IX	X	XI	XII
Ses Salines	0	0	-	-	0	0	40*	+	150	300	+	10

Bassa de sa Rota, Santa Eulària. 4 ex. el 9-XI (SDW/Observation).

Formentera: estany Pudent i salines, màxims mensuals: **180** ex. el 13-I (MAR, CAR, RMS, COS), 4 ex. el 16-VI (SDW/Observation), i 140 ex. el 14-IX (SEP/eBird).

Phoenicopiterus roseus. Flamenc. Flamenco común. Greater Flamingo
Estatus: estival no reproductor moderat (EI). Hivernant moderat (MA), i escàs (ME-EI). Migrant moderat (MA-EI), escàs (ME-FO), i rar (CA). Cria esporàdica 2022 i 23 a MA.

Selecció: fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: S'Albufera. Per tercer any consecutiu crien al parc. Enguany han estat 133 parelles, amb 133 polls nascuts. Observació de còpules a partir del 13-III, les postes començaren el 25-III, i polls el 8-V. Un màxim de 367 ex. el 3-VIII. Màxims mensuals (RES, VIC, PNAM; BAU).

Es Salobrar, Campos. Un màxim de 294 ex. el 27-VIII (BAU). Màxims mensuals (GOBM; BAU; MUN, MNT; BAC, GRD; TSL-PLG-JMO/Observation).

Lectura d'anelles. El 8-II-2024: [1/JBS] nascut a la llacuna de Fuente de Piedra (Málaga) el 2004.

[A8/4F] nascut a Garaa Ezzemoul (Algèria) el 2011.

[N/?R] tot i la lectura incompleta, aquest codi correspon a individus nascuts al PN Marismas del Odiel (Huelva) a 2011 o 2013 (BAC, GRD).

Albufereta, Alcúdia. Un màxim de 157 ex. el 17-X. Màxims mensuals (RES, VIC, RNSA).

Dates <i>Ph. roseus</i>	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Albufera	313	136	336	212	321, P	167, P	280, J	367 , J	294	211	191	97
Salobrar	49	108	71	55	63	35	152	294	+	17	75	94
Albufereta	86	98	46	76	63	41	42	11	47	157	81	82

Estany de ses Gambes, Santanyí. 127 ex. el 24-I (GUT, ART, MTM, MTA, MUÑ), 141 ex. el 20-VI (MUN, SOL).

Prat de Maristany, Alcúdia. Uns màxims de: 14 ex. el 5-III (MUN, SOL), 28 ex. el 27-IV (GSR-HBK-DPR/Observation), 32 ex. el 14-V, 11 ex. el 25-VI, 32 ex. el 23-VII, 6 ex. el 20-VIII (BAU), i 9 ex. el 7-IX (MUN).

Menorca: Albufera des Grau, Maó. Màxims mensuals (PNAG; CLX^A/eBird). Salines d'Addaia-Mongofre, es Mercadal-Maó. Màxims mensuals (PNAG).

<i>Ph. roseus</i>	13-I	15-II	14-III	10-IV	3-V	13-VI	11-VII	14-VIII	12-IX	9-X	14-XI	17-XII
Dates												
Albufera	101	59	3 J	3 J	34 ^A	0	0	0	0	3	0	0
Addaia-Mongo.	0	26	14	16	23	26	5	3	34	50 A, 4 J	39	76
Dates	13-I	14-II	13-III	11-IV	10-V	12-VI	10-VII	13-VIII	11-IX	10-X	13-XI	16-XII

Eivissa: ses Salines, Sant Josep. Un màxim de 692 ex. el 28-VI (GAB). Màxims mensuals (CST-SEP/eBird; RTR-MSN/Observation).

Dates	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Ex.	477	+	+	+	+	692	600	500	30	25	+	456

Formentera: estanys Pudent i salines. Màxims mensuals (MAR, CAR, RMS, COS; MTF-BBL-SDW-BKX-PLD/Observation).

Dates	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Ex.	35	-	-	15	1	1	-	1	-	-	-	1

***Phoeniconaias minor*.** Flamenc nan. Flamenco enano. Lesser flamingo

Estatus: Divagant (MA).

Selecció: tots els registres.

Mallorca: es Salobrar, Campos. Present **1** ex. des del 29-IV fins al 7-V. Per a més informació d'aquests registres homologats, vegeu l'informe del Comitè de Rareses de Balears.

***Burhinus oedicnemus*.** Sebel·lí, xebel·lí (EI). Alcaraván. Eurasian Stone-curlew

Estatus: reproductor i sedentari abundant (MA-EI), moderat (ME-FO), i rar (CA). Hivernant i migrant escàs (MA-ME-FO). Accidental (DR).

Selecció: reproducció, màxims mensuals i dades d'interès.

Mallorca: s'Albufera. Observació de nius a partir del 25-IV (GSR-HBK-DPR/Observation), i primers polls del 22-VI. Un màxim de 75 ex. el 27-II. Màxims mensuals (RES, VIC, PNAM).

Albufereta, Alcúdia. Màxims mensuals (RES, VIC, RNSA; KRG/
Observation; MAC-CST-DVJ/eBird).

Dates	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Albufera	63	75	21	+	+	J	+	+	+	+	61	+
Albufereta	17	+	14	+	+	+	54	21	+	+	+	45

Estanys de sa Sal, Colònia de Sant Jordi. 51 ex. el 16-XII (RES/eBird).

Dades de reproducció, primers polls encara amb plomissol el 30-IV i darrer el 31-VIII, $n = 56_{\text{polls}}$, el augment d'entrades és perquè es va realitzar una campanya preventiva de retirada de polls a l'aeroport de Palma i sobretot a l'aeròdrom de Son Bonet, per evitar impactes amb els avions (COFIB, Conselleria d'Agricultura, Pesca i Medi Natural). És l'any amb més polls ingressats quan la mitjana és de $X_{\text{polls}} = 20,6$ ($n = 10_{\text{anys}}$) (LOP).

Cabrera: 1 ex. el 3-XII (JMO/Observation).

Haematopus ostralegus. Garsa de mar. Ostrero. Eurasian Oystercatcher

Estatus: migrant escàs (MA) i rar (ME-EI-FO-CA-DR).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: Pas prenupcial, primera cita el 8-IV amb 4 ex. al cap de ses Salines (MON; ERB/eBird). Darrera cita el 15-IV amb 25 ex. en vol al cap de ses Salines (TOM/eBird).

Pas postnupcial, primeres cites el 3-VIII amb 43 ex. a s'Albufera (RES, VIC, PNAM), el 4-VIII (1 ad.) al faralló d'en Fred (Felanitx) (JMO/Observation), i el 17-VIII amb 1 ex. a l'illot de na Moltona (BAZ). Darreres cites el 21-X (3 ex.) a la badia d'Alcúdia (TOM/eBird), i l'11-IX (1 ex.) al Salobrar de Campos (MON).

Menorca: illots d'Addaia, es Mercadal. Grup de 14 ex. descansant, molt sorollosos i interactuant entre ells el 26-VII (MJJ).

Eivissa: Pas prenupcial, 1 ex. des del 13 al 28-IV (1 ex.) a ses Salines (Sant Josep) (SDW/Observation).

Pas postnupcial, 1 ex. des del 18 al 21-X a ses Salines (YAR, GAB).

Himantopus himantopus. Avisador, cames de jonc (ME), xerri (EI). Cigüeñuela. Black-winged Stilt

Estatus: reproductor moderat (MA-EI), escàs (ME-FO). Hivernant escàs (MA), rar (ME-EI-FO). Migrant moderat (MA-ME-EI), escàs (CA), i rar (DR).

Selecció: reproducció, màxims mensuals i fenologia.

Mallorca: s'Albufera. Enguany hi han criat **187** parelles amb un elevat èxit de cria. Observació de nius a partir del 13-III, ous del 14-IV, polls del 27-IV (naixement massiu de polls l'11-V), i joves de l'11-VI. Moltes colles han fet dues postes; així, observació d'ous a partir del 9-VII, i polls petits fins ben entrat el juliol. Un màxim de 739 ex. el 25-VIII. Màxims mensuals (RES, VIC, PNAM; TOM/eBird).

Albufereta, Alcúdia. Observació d'ous a partir del 23-IV, polls del 9-V fins al 3-VI. Màxims mensuals (RES, VIC, RNSA; MUN; PHP/Observation; BAU).

Es Salobrar, Campos. S'estima que hi han criat un mínim de **14** parelles (LOP). Màxims mensuals (BAU; BAC, GRD; TSL-PLG/Observation; MAC-CST/eBird).

Bassa de Can Guidet, Palma. Un registre aïllat l'11-VI (ZMR/eBird). Màxims mensuals (MUT; MUN, PAM; TSL/Observation).

Dates <i>H. himantopus</i>	I	II	10*III	IV	3*V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Albufera	67	92	149	55, P	85, P	J	412, J, P	739 , J	281	92	146	119
Albufereta	10	17	12	18	18, P	15, P, J	49, J	12	2	7	14	25
Salobrar	1	12	28	14	30	10	64	34	+	34	183	12
Can Guidet	0	0	2*/22	13	6/1*	(6)	0	0	0	0	0	0

Estany dels Tamarells, ses Salines. 1 ex. el 24-I (GUT, ART, MTM, MTA, MUÑ).

Bassa d'Artà. 26 ex. (2 parelles amb niu) el 16-IV (MMA, MAN).

Estany de ses Gambes, Santanyí. 27 ex. el 20-VI (MUN, SOL).

Estanys de sa Sal, Colònia de Sant Jordi. 4 ex. el 20-VI (MUN, SOL), 6 ex. el 27-XII (MUN, PAM).

Pas prenupcial, primeres cites el 10-III amb 2 ex. a la bassa de Can Guidet (MUT). Darrer registre el 18-IV (1 ex.) al PN de Mondragó (Santanyí) (AMG).

Pas postnucial. Prat de Maristany (Alcúdia), 15 ex. el 20-VIII (BAU), 12 ex. el 7-IX (MUN), 8 ex. el 21-X (SCH/Observation).

Hivernada, 12 ex. el 3-XII al prat de Sant Jordi (Palma) (BAU).

Menorca: Albufera des Grau, Maó. Observació de 2 adults covant i 4 polls el 13-VI. Màxims mensuals (PNAG).

Salines d'Addaia-Mongofre, es Mercadal-Maó. Observació de joves a partir del 13-VIII (2 ex.). Màxims mensuals (PNAG; COL*).

<i>H. himantopus</i>	13-I	15-II	14-III	10-IV	10-V	13-VI	11-VII	14-VIII	12-IX	9-X	14-XI	17-XII
Dates												
Albufera	0	0	1	26	20	29 A, 4 P	17	20 A, 3 J	0	0	0	0
Addaia-Mongo.	5	5	6	23	15	10	29	6 A, 2 J	6	4	4*	3
Dates	13-I	14-II	13-III	11-IV	10-V	12-VI	10-VII	13-VIII	11-IX	10-X	17-XI	16-XII

Son Bou, Alaior. 6 ex. el 18-V (OVV/Observation), i 1 ex. el 22-XI (CAU).

Eivissa: ses Salines, Sant Josep. Observació de còpules a partir del 29-IV, i polls del 5-VI. Un màxim de 23 ex. el 5-VI (GAB/eBird).

Formentera: estany Pudent i salines. Màxims mensuals: 8 ex. el 3-IV (MTF/Observation), 14 ex. i 3 polls el 26-V, i 21 ex. (adults i polls) el 6-VII (SEP/eBird).

***Recurvirostra avosetta*.** Bec d'alena, alena (MA-EI-FO). Avoceta. Pied Avocet

Estatus: reproductor escàs (MA) i rar (EI-FO). Hivernant escàs (ME) i rar (MA-EI-FO). Migrant escàs i rar (CA-DR). Cria esporàdica 2018 a ME.

Selecció: reproducció, fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: es Salobrar, Campos. S'estima que hi han criat un mínim de 72 parelles (LOP). Un màxim de 350 ex. el 9-VII (SOL/eBird). Màxims mensuals (GOBM; BAU; MUN, MNT; SHN-SOL-MAC-CST/eBird; TSL/Observation).

S'Albufera. Continua augmentant el nombre de colles reproductores, enguany hi han criat 194 parelles (172 pp/2023). Observació de còpules a partir del 13-II, nius del 16-III, ous del 26-III, polls del 27-IV, i joves de l'11-VI. Moltes de les colles han fet dues i tres postes, havent-hi ous a partir del 9-VII, i polls del 12-VII. Un màxim de 316 ex. el 17-VII. Màxims mensuals (RES, VIC, PNAM; CST-BAZ/eBird; SCH/Observation).

Albufereta, Alcúdia. Observació d'ous a partir del 23-IV, i polls del 16-V al 13-VI. Un ex. aïllat el 13-XI. Màxims mensuals (RES, VIC, RNSA; MAC-CST-BAZ-GAB/eBird).

Dates <i>R. avosetta</i>	I	II	3*III	IV	V	VI	VII	6*VIII	IX	X	XI	XII
Salobrar	47	85	116	137	273	200	350	254	160	270	200	57
Albufera	64	194	312	291, P	220, P	108, J	316, J, P	210, J	41	8	16	43
Albufereta	0	0	3*/4	9	9, P	8, P, J	8, P	1*	0	0	0	(1)

- Estany de ses Gambes, Santanyí. Enguany no han criat. 1 ex. el 24-I (GUT, ART, MTM, MTA, MUÑ), i 158 ex. el 20-VI (MUN, SOL).
- Menorca:** Salines de Fornells, es Mercadal. 1 ex. el 12-IV (PIR).
Salines de la Concepció, es Mercadal. 2 adults i 2 juvenils de 3-4 setmanes l'11-VII (COL).
Albufera des Grau, Maó. 1 ex. el 9-X i el 14-XI (PNAG).
Salines de Mongofre, Maó. 1 ex. el 31-XII (PIR).
- Eivissa:** ses Salines, Sant Josep. Un màxim de 20 ex. el 5-IV (SDW/Observation).
- Formentera:** estany Pudent. Enguany hi han criat **5** parelles. Observació de 6 pollets de dues parelles i 3 parelles covant el 26-V (SEP/eBird). És el primer hivern que 1 ex. hiverna a l'illa, observat des de 17-X-2024 fins a I-2025 (KLA).

- Pluvialis squatarola*.** Fuell gris, xirlot gris (ME). Chorlito gris. Grey Plover
- Estatus:** hivernant escàs (MA-ME-EI), i rar (FO-CA). Migrant escàs.
- Selecció:** fenologia i màxims mensuals.
- Mallorca:** es Salobrar, Campos. Màxims mensuals, i dates extremes amb asterisc (MUN; BEN-SOL-MAC/eBird).
S'Albufera. Màxims mensuals (RES, VIC, PNAM).

Dates <i>P. squatarola</i>	I	II	24*III	IV	V	13*VI	VII	8*VIII	IX	X	6*XI	XII
Salobrar	6	6	5*	-	0	0	0	0	0	0	1*	+
Albufera	6	5	5	3	1	1*	0	1*	1	-	4	2

Pas prenupcial, darrers registres el 13-VI (1 ex.) a s'Albufera (PNAM), el 20-IV (1 ex.) a la badia d'Alcúdia (Santa Margalida) (BNG/Observation), i el 26-III amb 8 ex. a l'illot des Porros (Santa Margalida) (SOL/eBird).

Pas postnupcial. Albufereta (Alcúdia), present des de 6-IX (2 ex.) fins al 19-IX (1 ex.) (RES, VIC, RNSA).

Hivernada. 1 ex. el 18-XII a la punta des Patró (Santa Margalida) (GON).

- Menorca:** Son Bou, Alaior. 1 ex. el 31-VII (PIR).
Salines de Fornells, es Mercadal. 1 ex. el 3-XII (PIR).
- Eivissa:** ses Salines, Sant Josep. Pas prenupcial, darrera cita el 18-V amb 1 ex. Pas postnupcial, 1 ex. el 3-XI (SDW/Observation).

- Pluvialis apricaria*.** Fuell, xirlot (ME). Chorlito dorado. European Golden Plover
- Estatus:** hivernant moderat. Migrant moderat (MA-ME), escàs (EI), i rar (CA).
- Selecció:** fenologia i màxims mensuals.
- Mallorca:** Illot de na Llarga, ses Salines. Màxims mensuals (BEN-SOL/eBird).

Illot de na Cabot, ses Salines. Màxims mensuals (BEN-SOL/eBird).

Es Salobrar, Campos. Un màxim de 1.000 ex. el 18-XII (CST/eBird). Màxims mensuals i dates extremes (BAZ, PAM; MUN; BEN-SOL-CST/eBird).

S'Albufera. Màxims mensuals (RES, VIC, PNAM).

Dates <i>P.apricaria</i>	I	II	III	IV	V	VI	VII-VIII	IX	6*X	29*X	XII
Na Llarga	455	-	0	0	0	0	0	0	0	-	-
Na Cabot	440	-	0	0	0	0	0	0	0	-	-
Salobrar	700	-	0	0	0	0	0	0	1*	8	1.000
Albufera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3*	1

Albufereta, Alcúdia. 2 ex. el 6-I (BAZ).

Son Matamoros, Felanitx. 90 ex. el 24-I (JMO/Observation).

Pas prenupcial, darrer registre el 27-II amb 2 ex. a l'Albufereta (RES, VIC, RNSA).

Hivernada. 94 ex. al prat de Sant Jordi (Palma) el 27-XII (BAZ), i 25 ex. a l'Albufereta el 31-XII (BAU).

Menorca: Pas postnupcial, el 26-X amb 2 ex. a la costa nord de Ciutadella (JMO/Observation).

Eivissa: Pas postnupcial, el 19-XI amb 1 ex. a Santa Eulària des Riu (SDW/Observation).

Pluvialis fulva. Fuell siberià. Chorlito dorado siberiano. Pacific Golden Plover

Estatus: accidental (MA). *Selecció*: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Pluvialis dominica. Fuell daurat americà. Chorlito dorado americano. American Golden Plover

Estatus: accidental (MA). *Selecció*: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Eudromias morinellus. (abans *Charadrius morinellus*) Fuell de collar, passa-rius pit-roig (ME). Chorlito carambolo. Eurasian Dotterel

Estatus: hivernant rar (MA). Migrant rar (MA-ME-EI-FO-CA).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: Pas prenupcial, el 6-IV amb 1 ex. a es Blanquer de Maria (SOL/eBird). Primera cita a Balears del pas primaveral (N. de l'ed.).

Pas postnupcial, primeres cites el 28-IX (1 ex.) al pla de Vilafranca (JMO/Observation), i el 29-IX passa reclamant a baixa altura cap al mar 1 ex. al cap de ses Salines (camps interiors). Darrer registre el 8-X se sent sobrevolant la re-

serva 1 ex. a l'Albufereta (Pollença) (RES/eBird),
Menorca: Punta Nati, Ciutadella. 2 ex. volant el 17-IX (CRT).
Eivissa: ses Salines, Sant Josep. Pas postnupcial, present entre el 30-VIII amb 2 ex. i el 24-IX (2 ex.). Un màxim de 3 ex. (2 joves) el 7-IX (SEP; DMZ/eBird).

Charadrius hiaticula. Picaplatges gros, tiruril·lo gros (MA), passa-rius gros (ME). Chorlitejo grande. Common Ringed Plover
Estatus: hivernant escàs (EI) i rar (MA-ME-FO). Migrant moderat (MA-ME), escàs (EI), i rar (FO-CA-DR). Cria esporàdica 1989 (MA).
Selecció: fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: es Salobrar, Campos. Màxims mensuals i dates extremes (SOL/eBird; TSL-LNG/Observation).
 S'Albufera. Un màxim d'un grup de 95 ex. el 14-V (RES/eBird).
 Màxims mensuals (RES, VIC, PNAM; GSR-DPR-HBK/Observation).
 Albufereta, Alcúdia. Màxims mensuals (RES, VIC, RNSA; KRR/eBird; KRG-HKS/Observation).

Dates <i>Ch. hiaticula</i>	I	II	5*7**III	25*IV	15*16** 20***V	VI	VII	28*VIII	5*IX	15*X	30*X	XII
Salobrar	0	0	-	15*/22	35/13*	0	0	0	48*	90/1*	-	-
Albufera	0	0	4*	5	95/80**	2	1	8*	34	10	8	7
Albufereta	0	0	1**/2	28	8/6***	0	0	0	-	-	3*	0

Pas prenupcial. Darrer registre el 30-IV amb 4 ex. a la bassa de Can Guidet (Palma) (ZMR/eBird).

Hivernada, el 27-XII (1 ex.) als Estanys de sa Sal (Colònia de Sant Jordi) (MUN, PAM).

Menorca: Pas prenupcial, present entre el 24-IV (1 ex.) a els Alocs a Fornells (BLB/Observation), fins al 22-V (1 ex.) a les Salines de Fornells (BAZ), i un màxim de 7 ex. el 21-V al Prat de Son Bou (OVV/Observation).

Pas postnupcial, el 31-VII (1 ex.) a els Alocs a Fornells (VDP/Observation), i el 23-VIII amb 10 ex. a les Salines de Mongofre (Maó) (PIR).

Eivissa: Pas prenupcial, ses Salines (Sant Josep), present entre el 15-II amb 5 ex. fins al 14-V (1 ex.). Un màxim d'11 ex. el 10-V (SDW/Observation).

Ses Feixes, Vila. 1 ex. el 10-V al prat de ses Monges (SEP).

Pas postnupcial, el 7-IX (5 ex.) a ses Salines (RTR/Observation), i el 7-X (1 ex.) a ses Salines (MSN/Observation).

Charadrius dubius. Picaplatges petit, tiruril·lo menut (MA), passa-rius petit (ME). Chorlitejo chico. Little Ringed Plover

Estatus: reproductor i sedentari escàs (MA). Reproductor escàs (ME) i rar (EI). Hivernant escàs (MA) i rar (EI). Migrant moderat (MA-ME), escàs (EI-FO), i rar (CA).

Selecció: reproducció, fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: s'Albufera. Enguany hi han criat **89** parelles, quatre més que l'any passat i també un altre màxim històric. Prou reparatides, enguany han ocupat els Colombars durant l'efecte de les pluges primaverals, però a partir de les darreries de maig han deixat les àrees més salades, preferint les aigües més dolces o lleugerament salobroses. Primers ous a partir del 5-V fins al 5-VI, i polls del 20-V. Un màxim de 82 ex. el 6-VIII. Màxims mensuals (RES, VIC, PNAM; NIC-NCL-SOL/eBird).

Albufereta, Alcúdia. Observació d'ous a partir del 23-IV. Màxims mensuals (RES, VIC, RNSA; LOP-MAC-SOL/eBird; KRG-VDT-GGL/Observation).

Es Salobrar, Campos. Nidificant. Un màxim de 70 ex. l'11-X (MAC-CST/eBird). Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (BAC, GRD; MAC-CST/eBird; TSL/Observation).

Prat de Sant Jordi, Palma. Màxims mensuals (BAZ-MAC-LOP-CST-HIN-MOU-ZMR-TIM/eBird).

Bassa de Can Guidet, Palma. Màxims mensuals (MUN, PAM; TIM-ZMR/eBird; KRG/Observation).

Dates <i>Ch. dubius</i>	I	22*II	15*III	IV	3*V	VI	9*VII	5*VIII	*IX	X	XI	XII
Albufera	2	16	46	+	P	P	85, P, J	82 , J	40, J	4	2	9
Albufereta	2	4	6	4	3, P	9, P	4, J	7, J	1	18	4	4
Salobrar	0	-	-	2	-	-	-	7	+	70	+	3
Sant Jordi	27	13	18/13*	0	0	0	0	0	0	-	-	14
Can Guidet	0	1*	3	3	3*	0	1*	2*	0	0	0	0

Basses de Binissalem. 1 ex. el 13-II (HIN-MOU-PAM/eBird).

Basses de Magaluf, Calvià. 1 ex. el 21-II (BEN-GRP/eBird), 4 ex. i un niu ocupat el 29-VI, 1 adult amb **2** polls l'1-VII (GRP/eBird), primera vegada que es confirma la nidificació (N. de l'ed.).

PN de Mondragó, Santanyí. 1 ex. el 19-III, 2 ex. el 3-V, 1 ex. el 24-VII, 2 ex. el 8-VIII (AMG).

Embassament de Cúber, Escorca. 1 parella territorial el 29-IV (PTK/Observation), 1 ex. el 5-V (VDC/Observation), 1 ex. el 6-VII (GGL/Observation).

Prat de Maristany, Alcúdia. 1 ex. el 21-X (SCH/Observation).

Menorca: Salines d'Addaia-Mongofre, es Mercadal-Maó. Màxims mensuals (PNAG).

<i>Ch. dubius</i> Dates	13-I	14-II	13-III	11-IV	10-V	12-VI	10-VII	13-VIII	11-IX	10-X	17-XI	16-XII
Addaia-Mongo	0	0	3	5	11	1	4	3	5	1	0	0

Bassa de Morella, Maó. 4 ex. el 13-III (PNAG).

Pont de Son Reixat, Ferreries. 1 ex. el 22-V (BAZ).

Albufera des Grau, Maó. 1 ex. el 9-X (PNAG).

Eivissa: ses Feixes, Vila. Enguany hi han criat **2** parelles. Observació incubant a partir del 29-IV, i polls del 10-V. Segones postes, hi han criat **2** parelles, observació incubant a partir del 13-VI, polls el 26-VII (SEP/eBird).

Formentera: Pas prenupcial, 2 ex. el 3-IV a ses Salines (MTF/Observation).

***Vanellus vanellus*.** Juia. Avefría. Northern Lapwing

Estatus: hivernant abundant (MA), moderat (ME), escàs (EI-FO), i rar (CA). Migrant moderat (MA), escàs (EI-FO), i rar (CA).

Selecció: màxims mensuals i fenologia.

Mallorca: s'Albufera. Un màxim de 327 el 12-I. Màxims mensuals, i dates extremes (RES, VIC, PNAM; BAU; TOM/eBird).

Albufereta, Alcúdia. Màxims mensuals (RES, VIC, RNSA; VVN/Observation).

Es Salobrar, Campos. Màxims mensuals (GOBM; BAU; BAC, GRD; JMO/Observation).

Dates <i>V. vanellus</i>	I	22*II	2*8**III	IV	V	VI	VII	VIII	13*29**IX	31*X	XI	XII
Albufera	327	36	16/2**	0	0	0	0	0	1**	80	110	45
Albufereta	100	17	1*	0	0	0	0	0	2*	5	31	18
Salobrar	47	65/50*	0	0	0	0	0	0	0	49*	+	3

Son Ferriol, Palma. 140 ex. el 4-I (BAU).

Estany dels Tamarells, ses Salines. 1 ex. el 24-I (GUT, ART, MTM, MTA, MUÑ).

Pas postnupcial. Ariant (Pollença), 1 ex. el 7-XI (GON).

Son Navata, Felanitx. 17 ex. el 16-XI (GON).

Hivernada, 95 ex. el 3-XII al prat de Sant Jordi (Palma) (BAU).

Menorca: Basses de Lluriac, es Mercadal. 83 ex. el 28-I (VLN).

Son Bou, Alaior. 5 ex. el 12-XI (PIR).

Albufera des Grau, Maó. 28 ex. el 17-XII (PNAG).

Eivissa: Prenupcial, un màxim de 13 ex. el 13-I a ses Salines (YAR).

Postnupcial, primer registre el 3-XI amb 6 ex. a ses Salines (SDW/Observation).

***Vanellus gregarius*.** Juia gregària. Chorlito sociable. Sociable Lapwing

Estatus: divagant (MA). **Selecció:** tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Anarhynchus alexandrinus. (abans *Charadrius alexandrinus*). Picaplatges camanegra, tiruril·lo camanegra (MA), passa-rius camanegra (ME). Chorlitojo patinegro. Kentish Plover

Estatus: reproductor i sedentari moderat (MA) i escàs (ME-EI-FO). Hivernant moderat (MA-EI), escàs (ME), i rar (FO). Migrant abundant (MA), moderat (EI), escàs (ME), i rar (CA).

Selecció: reproducció i màxims mensuals.

Mallorca: es Salobrar, Campos. Nidificant. Concentració de joves i adults amb 212 ex. el 14-IX (MAC-CST/eBird), 350 ex. el 28-XI, 280 ex. el 16-XII (RES/eBird). Màxims mensuals (BAU, SVL; BAC, GRD; RES/eBird; TSL-VDW/Observation).

S'Albufera. Enguany hi han criat **126** parelles, sent el màxim històric, i moltes han fet dues i tres postes. Observació dels primers ous del 20-IV fins al 23-VI, i polls del 20-V fins al 3-VII, i joves del 9-VII. Concentració de joves i adults amb 376 ex. el 17-VII. Màxims mensuals (RES, VIC, PNAM; BAU).

Albufereta, Alcúdia. Observació de polls a partir del 21-IV fins al 13-VI. Màxims mensuals (RES, VIC, RNSA; BAU; MUN, BRD; GON; TOM-BEN-MAC/eBird).

Estanys de se Sal, Colònia de Sant Jordi. Màxims mensuals (GOBM; MUN, SOL, PAM).

Badia d'Alcúdia. Zones: Illot des Porros, punta des Patró, costa de Son Real, i torrent de Son Bauló. Màxims mensuals (GON; CLF; HBK-GSR-DPR-HKS-GVR-BTT/Observation).

Dates <i>A. alexandrinus</i>	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Salobrar	360	15	15	30	70, P	P	53, J	54	212	11	350	280
Albufera	172	141	71	65	P	P	376 , P, J	136, J	110	19	11	85
Albufereta	81	45	15	22, P	12, P	12, P	53, J	80	35	30	24	36
Estanys sa Sal	92	+	-	0	0	3	+	+	+	+	+	19
Badia Alcúdia	54	+	+	22	4	4	+	+	30	-	-	200

Estany de ses Gambes. 1 ex. el 20-VI (MUN, SOL).

Prat de Maristany, Alcúdia. 2 ex. el 7-IX (MUN), 4 ex. el 21-X (SCH/Observation).

Badia de Palma. 1 ex. el 16-IX es Carnatge (BOC).

Badia de Pollença. 12 ex. el 9-X (GON).

Menorca: Salines d'Addaia-Mongofre, es Mercadal-Maó. Un màxim de 23 ex. el 23-VIII a Mongofre (PIR). Màxims mensuals (PNAG).

<i>A. alexandrinus</i> Dates	13-I	14-II	13-III	11-IV	10-V	12-VI	10-VII	13*VIII	11-IX	10-X	17-XI	16-XII
Addaia-Mongo.	0	0	0	0	0	2	0	2*/23	4	1	0	0

Salines de Fornells, es Mercadal. 23 ex. el 6-XII (PIR).

Eivissa: Ses Salines, Sant Josep. Observació de joves el 17-V. Segones postes, còpules a partir del 5-VI, i polls de l'1-VIII (SEP-GAB-VRL/eBird).

Formentera: Estanyets. Parella amb polls el 6-IV (MAR).

Estany Pudent. 12 ex. (adults i joves) el 6-VII (SEP/eBird).

Numenius phaeopus. Curlera cantaire, curlera (MA-EI-FO). Zarapito trinador. Eurasian Whimbrel

Estatus: hivernant rar (MA-EI). Migrant escàs, i rar (CA).

Selecció: fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: Hivernada, present 1 ex. del 14 al 23-I a la badia de Palma (BAZ; QUN; MUN; BOC).

Sa Punteta, Sant Llorenç. 1 ex. el 18-II (JMO/Observation).

Pas prenupcial, primeres cites, el 13-III (1 ex.) a es Carnatge (Palma) (BAZ), el 26-III (1 ex.) al Salobrar de Campos (BAU). Un màxim de 5 ex. el 3-IV al Salobrar de Campos (WTT/eBird).

Darrers registres el 29-IV (2 ex.) al Salobrar de Campos (TSL/Observation), el 23-IV amb 1 ex. a l'Albufereta (RES, VIC, RNSA), el 16-IV a s'Albufera (1 ex.) (RES, VIC, PNAM) i a la bassa de Can Guidet (2 ex.) (BAU).

Pas postnupcial, present del 6-VII a l'Albufereta (1 ex.) fins al 3-VIII a s'Albufera (3 ex.) (RES, VIC, RNSA, PNAM), i el 24-VII (1 ex.) al Salobrar de Campos (JMO/Observation).

Darrer el 2-X (1 ex.) a s'Albufera (RES, VIC, PNAM), el 24-IX (1 ex.) al caló de Son Caios (badia de Palma) (WSN/Observation), i el 17-VIII (2 ex.) a l'illot de na Guardis (ses Salines) (BAZ).

Hivernada, el 3-XII amb 1 ex. a es Carnatge (Palma) (BAU).

Menorca: Salines de Mongofre, Maó. 1 ex. el 21-IV (ARL).

Salines de Fornells, es Mercadal. 1 ex. el 23-IV (PIR), i el 22-V amb 1 ex. (BAZ).

Aire: (Sant Lluís). Pas prenupcial, un grup molt gran amb 47 ex. passen volant i reclamant el 7-IV, i un grup de 4 ex. el 12-IV (CRV/eBird).

Eivissa: Pas prenupcial, el 7-IV amb 1 ex. a la platja des Codolar (Sant Josep) (SDW/Observation), i el 29-VI (1 ex.) a l'illot de sa Sal Rossa (Sant Josep) (SEP).

Pas postnupcial, l'11-VIII (1 ex.) a Punta d'en Rovira (RSL).

Numenius arquata. Curlera reial. Zarapito real. Curlew

Estatus: hivernant escàs (MA) i rar (ME-EI). Migrant escàs (MA) i rar (ME-EI-FO-CA).

Selecció: fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: es Salobrar, Campos. Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (GOBM; BAZ; BAU; BAC, GRD; MON; MUN; JMO-VDW/Observation).
Albufera. Màxims mensuals (RES, VIC, PNAM).

Dates	I	22*II	III	27*IV	V	24*VI	VII	VIII	12*IX	X	6*X	XII
Salobrar	10	10*	-	0	0	2*	1	1	9	-	9*	-
Albufera	0	0	0	1*	0	0	0	0	1*	0	0	0

Pas prenupcial, el 25-III (1 ex.) a Son Navata (Felanitx) (JMO/Observation).

Pas postnupcial, el 2-VII (1 ex.) a Can Picafort (Santa Margalida) (VDN/Observation), i el 19-VIII (2 ex.) a la costa de Son Real (Santa Margalida) (SER).

Limnodromus scolopaceus. Cegall becllarg, cegall de bec llarg (MA).
Agujeta escolopácea. Long-billed Dowitcher

Estatus: divagant (MA). **Selecció:** tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Limosa lapponica. Cegall de mosson coabarrat, cegall de mosson coa-roja (MA-EI-FO), cegall coabarrat (ME). Aguja colipinta. Bar-tailed Godwit

Estatus: hivernant rar (EI). Migrant escàs (MA-EI-FO) i rar (ME-DR).

Selecció: fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: Hivernada, el 20-I amb 2 ex. al Salobrar de Campos (BEN-MAC/eBird).

Pas prenupcial, el 21-III (2 ex.) al Salobrar de Campos (MAC/eBird).

Pas postnupcial. Salobrar de Campos, primera cita el 2-VIII amb 1 ex. (BAC, GRD), i darrera el 13-X (2 ex.) (JVN/eBird). S'Albufera, present del 25-IX amb 5 ex. fins a l'11-XI (1 ex.) (RES, VIC, PNAM).

Albufereta, Alcúdia. 1 ex. el 27-IX (WLL/eBird).

Limosa limosa. Cegall de mosson, cegall de mosson coanegre (MA-EI-FO), cegall coanegre (ME). Aguja colinegra. Black-tailed Godwit

Estatus: hivernant escàs (ME) i rar (MA). Migrant escàs (MA-ME-FO) i rar (EI).

Selecció: fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: s'Albufera. Màxims mensuals (RES, VIC, PNAM; MCB-MCT/eBird). Es Salobrar, Campos. Màxims mensuals (MON; GRP/eBird).

Dates <i>L. limosa</i>	I	13*II	III	1*IV	V	12*18**VI	VII	3*VIII	11*-28*IX	23*X	XI	XII
Albufera	0	4*	12	1*	0	4*/1**	-	2*/3	5	2*	0	0
Salobrar	0	0	0	0	0	0	0	0	3*	0	0	

Menorca: Son Bou, Alaior. 3 ex. el 12-II (CAU, VLN).

Eivissa: Pas prenupcial, 1 ex. el 18-V a ses Salines (Sant Josep) (SDW/eBird).

***Lymnocryptes minimus*.** Cegall menut, becassineta (ME), becassí petit (EI). Agachadiza chica. Jack Snipe

Estatus: hivernant rar (MA-ME-EI). Migrant escàs (MA-ME-EI-FO), i rar (CA).

Selecció: tots els registres i màxims mensuals.

Mallorca: s'Albufera. Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (RES, VIC, PNAM).

Prat de Sant Jordi, Palma. Màxims mensuals (RES-ZMR/eBird).

Dates <i>L. minimus</i>	I	15*II	III	IV	V-VI	VII	VIII	IX	X	XI	19*XII	31*XII
Albufera	1	1*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sant Jordi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1*	2*

Prat des Saluet, Andratx. 1 ex. el 6-I (BOC).

Menorca: Salines de Fornells, es Mercadal. 1 ex. el 28-I (VLN) i 1 ex. el 6-XII (PIR).

Eivissa: Pas postnupcial, 1 ex. el 9-XI a ses Salines (Sant Josep) (SEP, SET).

***Scolopax rusticola*.** Cega. Chocha perdiz. Eurasian Woodcock

Estatus: hivernant abundant (MA-ME), moderat (EI-FO), i rar (CA-DR). Migrant abundant (ME), moderat (MA-EI), i rar (DR).

Selecció: fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: prenupcial, darreres cites el 6-III amb 1 ex. a Mortitx (Escorca) (MMA), i el 12-II (1 ex.) a s'Albufera (RES, VIC, PNAM).

Postnupcial, primeres cites l'1-XI (1 ex.) a s'Albufera (RES, VIC, PNAM), el 10-XI (1 ex.) a Esporles (BAU), i el 17-XI amb 1 ex. alçada de la cuneta de la carretera, a les 06:20 hores (nit tancada) al cap de Formentor (Pollença) (RES/eBird).

Menorca: Son Tema, Alaior. 1 ex. el 26-X (PIR).

Eivissa: postnupcial, primeres cites l'1-XII amb 1 ex. en vol a Can Clavos (Santa Eulària) (SEP/eBird), i el 9-XII (1 ex.) a la ctra. Sant Joan-Sant Vicent (ESR).

Gallinago media. Cegall reial, becassina reial (ME). Agachadiza real.
Great Snipe

Estatus: migrant rar (MA-ME). *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Gallinago gallinago. Cegall, becassina (ME), becassí (EI). Agachadiza
común. Common Snipe

Estatus: hivernant abundant (MA), moderat (ME-EI) i escàs (FO). Mi-
grant moderat (MA-ME), escàs (EI-FO), i rar (CA-DR).

Selecció: fenologia i dades d'interès.

Mallorca: s'Albufera. S'estima un màxim de 350 ex. el 13-I. Màxims
mensuals, dates extremes amb asterisc (RES, VIC, PNAM;
KRG/Observation).

Albufereta, Pollença. Màxims mensuals (RES, VIC, RNSA; BAU).
Prat de Sant Jordi, Palma. Màxims mensuals (GOBM).

Dates <i>G. gallinago</i>	I	II	III	6*IV	16*V	VI	VII	27*VIII	12*IX	X	XI	XII
Albufera	350	+	15	3	1*	0	0	6*	+	+	+	+
Albufereta	100	+	1	1*	0	0	0	0	1*	+	3	2
Prat S. Jordi	5	-	-	0	0	0	0	0	0	0	-	-

Basses de Magaluf, Calvià. 4 ex. el 20-I (BAZ).

Bassa de Can Guidet, Palma. 1 ex. el 20-III (JMO/Observation).

Bassa de Son Navata, Felanitx. 1 ex. el 25-III (JMO/Observation).

Pas prenupcial, darrers registres el 16-V (1 ex) a s'Albufera
(PNAM), i el 4-V (1 ex.) al vall de Bóquer (Pollença) (VSV/
Observation).

Pas postnupcial, primera cita el 27-VIII amb 6 ex. a s'Albufera
(PNAM).

Es Salobrar, Campos. 1 ex. el 31-X (BAC, GRD), 1 ex. el 6-XI
(MUN).

Basses de Magaluf, Calvià. 2 ex. l'11-XI (GLT).

Menorca: Basses de Lluriac, es Mercadal. 12 ex. l'1-IX (CAU, VLN).

Son Bou, Alaior. 1 ex. el 7-IX (PIR).

Golf de Son Parc, es Mercadal. 10 ex. el 29-XII (PIR).

Eivissa: Pas postnupcial, primer registre l'1-XI amb 1 ex. a ses Salines
(Sant Josep) (SDW/Observation).

Xenus cinereus. Xivitona cendrosa. Andarríos de Terek. Terek Sandpiper

Estatus: accidental (MA). *Selecció:* tots els registres rebuts

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Phalaropus tricolor. Escuraflascons de Wilson. Falaropo tricolor. Wilson's Phalarope

Estatus: divagant (MA). *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Phalaropus fulicarius. Escuraflascons becgròs. Faloropo picogrueso. Red Phalarope

Estatus: accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Phalaropus lobatus. Escuraflascons. Falaropo picofino. Red-necked Phalarope

Estatus: accidental (MA-EI). *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Actitis hypoleucos. Xivitona, polleta d'aigua (EI). Andarríos chico. Common Sandpiper

Estatus: estival no reproductor rar (ME-EI). Hivernant moderat (MA-ME), escàs (EI-FO), i rar (CA-DR). Migrant moderat, i escàs (CA-DR).

Selecció: fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: s'Albufera. Un ex. aïllat al mes de juny. Un màxim de 9 ex. el 3-VIII. Màxims mensuals (RES, VIC, PNAM; HKS-BXT/Observation).

Albufereta, Alcúdia. Màxims mensuals (RES, VIC, RNSA; BAU; MUN, SOL; BAZ-PAM).

Prat de Maristany, Alcúdia. Màxims mensuals (PNAM, MUN, SLM, BRD; BAU; SCH/Observation).

Es Salobrar, Campos. Màxims mensuals (GOBM; BAC, GRD; TSL-JMO/Observation).

Bassa Can Guidet, Palma. Un màxim de 54 ex. el 28-IV (ZMR/eBird). Màxims mensuals (MUN, MOU, PAM, GIA; MCM; ZMR/eBird; HKS/Observation).

Dates <i>A. hypoleucos</i>	I	II	III	26*29**IV	4*16**V	VI	2*9**VII	1*2**VIII	7*IX	X	XI	XII
Albufera	3	2	4	40	8/1**	(1)	6*	9	4	4	3	4
Albufereta	3	2	2	13	1	1	1	3*/4	1	1	5	1
Maristany	1	+	1	7*	0	0	0	0	5*	3	+	+
Salobrar	4	+	+	15/2**	0	0	0	3**	+	2	1	1
Can Guidet	9	4	14	54	34/12*	0	1**	13	2	16	1	6

Badia de Palma, 5 ex. el 14-I (MUN).

Golf de Son Muntaner, Palma. 2 ex. el 15-I (MAC, LOP, VDE, PAM), i el 25-IV (MUN).

Badia d'Alcúdia, 1 ex. el 16-I a Son Serra de Marina (GON).

Bassa de Capdepera. 1 ex. el 18-I, i 1 ex. aïllat el 12-VI (MAN).
 Bassa de Son Servera. 1 ex. el 18-I (MAN), 1 ex. el 16-IV (MMA, MAN).
 Golf de Santa Ponça, Calvià. 1 ex. el 20-I (BAZ, PAM, MOU), 2 ex. el 15-IV (MMA, MAN).
 Estany de ses Gambes, Santanyí. 1 ex. el 24-I (GUT, ART, MTM, MTA, MUÑ).
 Estany des Ponts. 1 ex. el 28-I (MUN, SLM).
 PN de Mondragó. 1 ex. l'1-II i 27-III, 2 ex. el 18-IV (AMG).
 Parc Bit, Palma. 1 ex. l'11-II (BAC, GRD).
 Torrent Gros (Ciutat Jardí), Palma. 2 ex. el 23-III (MUN, PAM), 3 ex. el 7-IV (MUN, MCH).
 Bassa d'Artà. 4 ex. el 16-IV (MMA, MAN).
 Embassament de Cúber, Escorca. 1 ex. el 24-IV (HBK-GSR-DPR/Observation).
 Cala de Deià. 3 ex. el 27-IV (DPT/Observation).
Pas prenupcial, darreres cites el 16-V (1 ex.) a s'Albufera, el 4-V (12 ex.) a la bassa de Can Guidet (BXT-HKS/Observation), i el 3-V al Port des Canonge (1 ex.) (BAC, GRD), al PN de Mondragó. (2 ex.) (AMG), i a l'embassament de Cúber (3 ex.) (HKS/Observation).
Pas postnupcial, primers registres el 2-VII amb 2 ex. a s'Albufera (PNAM), el 24-VII (2 ex.) al PN de Mondragó (AMG), Bassa de Capdepera. 2 ex. el 18-IX, i 1 ex. el 14-XI (MAN).
 Bassa de Son Servera. 2 ex. el 14-XI (MAN).
Menorca: Albufera des Grau, Maó. Màxims mensuals (PNAG).
 Salines d'Addaia-Mongofre, es Mercadal-Maó. Màxims mensuals (PNAG).

<i>A. hypoleucos</i>	13-I	15-II	14-III	10-IV	10-V	13-VI	11-VII	14-VIII	12-IX	9-X	14-XI	17-XII
Dates	0	2	1	3	0	0	0	1	0	0	0	1
Albufera												
Addaia-Mongo.	9	6	1	2	1	1	0	4	1	7	1	4
Dates	13-I	14-II	13-III	11-IV	10-V	12-VI	10-VII	13-VIII	11-IX	10-X	17-XI	16-XII

Prat de Son Bou, Alaior. 1 ex. el 18-V (OVV/Observation).
Eivissa: Prenupcial, darrera cita el 14-V amb 1 ex. ses Salines (Sant Josep) (SDW/Observation).
Postnupcial, primers registres el 25-VII amb 1 ex. a la punta den Ribes (Sant Josep) (FPM/Observation), i el 29-VII (1 ex.) a ses Salines (CZM/Observation). Un màxim de 5 ex. el 7-X a ses Salines (MSN/Observation).

Tringa ochropus. Becassineta, xivita (ME). Andarríos grande. Green Sandpiper

Estatus: hivernant escàs (ME-EI) i rar (MA). Migrant moderat (MA-ME), escàs (EI-FO), i rar (CA-DR).

Selecció: fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: s'Albufera. Màxims mensuals (RES, VIC, PNAM; BAU). Albufereta, Alcúdia. Màxims mensuals (BAU; PHP-HKS-GGL/Observation).

Es Salobrar, Campos. Màxims mensuals (BAU; BAC, GRD; PHP-LNS-TSL-JMO/Observation).

Bassa de Can Guidet, Palma. Màxims mensuals (MUN, MOU; ZMR/eBird).

Prat de Maristany, Alcúdia. Màxims mensuals (MUN; SCH/Observation).

Dates <i>T. ochropus</i>	I	II	15*22**2 3***III	19*29 **IV	2*14 **V	12*25 **VI	2*VII	VIII	7*IX	21*	14*XII	XII
Albufera	8	5	8	6	2/1**	1*/3	6	7	6	4	3	3
Albufereta	0	0	1***	1	1*	1**	1	+	+	+	+	1
Salobrar	0	0	1**	1**	0	0	1*/3	+	+	1	3*	0
Can Guidet	1	0	3*	1*	0	0	0	0	0	0	0	0
Maristany	0	0	0	0	0	0	0	0	1*	1*	0	0

Golf de Santa Ponça, Calvià. 1 ex. el 20-I (BAZ, PAM, MOU).

Estany des Tamarell, ses Salines. 1 ex. el 24-I (GUT, ART, MTM, MTA, MUÑ).

Pas prenupcial, darrer registre el 14-V (1 ex.) a l'Albufereta (BAU).

Pas postnupcial, darreres cites l'11-XI (1 ex.) a ses basses de Magaluf (Calvià) (GLT), i el 17-IX (1 ex.) al PN de Mondragó (AMG).

Menorca: Albufera des Grau, Maó. Màxims mensuals (PNAG).

Salines d'Addaia-Mongofre, es Mercadal-Maó. Màxims mensuals (PNAG).

Bassa de Morella, Maó. Màxims mensuals (PNAG).

<i>T. ochropus</i> Dates Albufera	13-I	15-II	14-III	10-IV	10-V	13-VI	11-VII	14-VIII	12-IX	9-X	14-XI	17-XII
	0	3	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2
Addaia-Mongo. Morella	0	1	3	1	1	0	2	0	1	0	3	2
	1	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dates	13-I	14-II	13-III	11-IV	10-V	12-VI	10-VII	13-VIII	11-IX	10-X	17-XI	16-XII

Eivissa: Pas prenupcial, el 26-IV amb 1 ex. a ses Salines (Sant Josep) (SDW/Observation).

Pas postnupcial, el 24-IX amb 1 ex. al camí de s'Oliviera (Sant Antoni) (YAR).

Formentera: Pas prenupcial, 4 ex. el 16-VI a ses salines (SDW/Observation).

Tringa stagnatilis. Camaverda menuda. Archibebe fino. Marsh Sandpiper

Estatus: migrant rar MA-ME-EI-FO).

Selecció: tots els registres.

Mallorca: Pas prenupcial, 1 ex. el 20-IV a l'Albufereta (RES, VIC, RNSA; BEN, MAC/eBird).

Pas postnupcial, el 3-VIII amb 1 ex. a s'Albufera (RES, VIC, PNAM).

Menorca: Son Bou, Alaior. 2 ex. el 15 i 16-IV i 1 ex. el 31-VII (PIR).
Salines de Mongofre, Maó. 1 ex. el 17 i 19-IV (BCH/eBird; PIR).
Ses Salines de Fornells. 1 ex. el 25-IV (BNN/eBird).

Tringa glareola. Valona. Andarríos bastardo. Wood Sandpiper

Estatus: hivernant rar (MA). Migrant moderat, escàs (EI), i rar (CA).

Selecció: fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: s'Albufera. Un màxim de 16 ex. el 5-IX. Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (RES, VIC, PNAMÇ).

Albufereta, Pollença. Màxims mensuals (RES, VIC, RNSA).

Es Salobrar, Campos. Màxims mensuals (SUA; BAZ; BAC, GRD; TSL-JMO/Observation; MAC-CST/eBird).

Dates <i>T. glareola</i>	I	4*29 **II	III	14*16** 23***IV	1*4**16 ***V	VI	23*24 **VII	4*VIII	5*IX	23*X	3*X	XII
Albufera	0	2**	1	7*/11	11/1***	1	1	5*	16	9*	0	0
Albufereta	0	7*	-	4***	1**	0	1*	1	4*	0	0	0
Salobrar	0	-	-	9**	6/1*	0	2**	2	-	-	3*	0

Pas prenupcial, primer registre el 8-IV (1 ex.), i darrera cita el 28-IV (1 ex.) ambdós a la bassa de Can Guidet (Palma) (ZMR/eBird; TSL/Observation).

Golf de Santa Ponça, Calvià. 3 ex. el 15-IV (MMA, MAN).

Pas postnupcial, darrer registre el 3-XI al Salobrar de Campos (MAC-CST/eBird).

Menorca: Pas prenupcial, primeres cites el 23-III amb 1 ex. a Son Bou (Alaior) (CAU), i l'11-IV amb 5 ex. a l'Albufera d'es Grau (Maó) (PNAG). Uns màxims de **70** ex. al Prat de Son Bou el 17-IV (BNN/eBird), i 35 ex. a ses Salines de Fornells (es Mercadal) el 23-IV (PIR).

Darrer registre el 24-IV amb 18 ex. al Prat de Son Bou (BNN/eBird).

Pas postnupcial, primera cita el 17-VII amb 1 ex. a Son Bou (DVS/eBird). Darrer registre el 4-IX amb 1 ex. a ses basses de Lluriac (es Mercadal) (MJJ/eBird). Un màxim de 3 ex. a Son Bou l'11-VIII (PIR).

Eivissa: Pas prenupcial, present entre el 5-IV amb 2 ex. i el 17-V amb

1 ex. Un màxim de 4 ex. el 7-IV, ambdós a ses Salines (Sant Josep) (SDW/Observation).

Pas postnupcial, el 29-VII amb 2 ex. a ses Salines (CZM/Observation).

Tringa totanus. Cama-roja, cama-roja roja (ME). Archibebe común. Common Redshank

Estatus: reproductor escàs (MA), i rar (EI). Hivernant moderat (MA), escàs (EI) i rar (ME-FO). Migrant moderat, i rar (CA-DR).

Selecció: reproducció, màxims mensuals i fenologia.

Mallorca: es Salobrar, Campos. Enguany s'estima que hi han criat entre 15 i **20** colles (GAR). Màxims mensuals (GOBM; BAU; BAC, GRD; MON; PHP-LNS-DPR-GSR-HBK-MLR/Observation). S'Albufera. Nidificant. Un màxim de 51 ex. l'1-V. Màxims mensuals (RES, VIC, PNAM; MUN; KRG-GGL/Observation; CRG/eBird).

Albufereta, Alcúdia. Un màxim de 9 ex. El 2-V. Màxims mensuals (RES, VIC, RNSA; BAU; KRG/Observation).

Bassa de Can Guidet, Palma. Màxims mensuals (ZMR/eBird).

Dates <i>T. totanus</i>	I	II	27*28 *III	IV	3*17 **V	13*VI	8*VII	18*VIII	IX	X	18*XII	XII
Salobrar	9	+	2	5	4, P	P, J	5, J	4	+	23	-	-
Albufera	4	4	25	27	51/2**	1	1/7*	3	5	3	1*	0
Albufereta	0	0	1**	7	9	1*	0	1*	0	0	0	0
Can Guidet	0	0	1*	7	1*	0	0	0	0	0	0	0

Pas prenupcial, primera cita el 27-III amb 1 ex. a Can Guidet (ZMR/eBird), i darrera el 13-VI (1 ex.) a l'Albufereta (RNSA).

Pas postnupcial, primera cita el 2-VII (1 ex.) al torrent des Revellar (Santa Margalida) (VDN/Observation).

Menorca: Son Bou, Alaïor. 1 ex. el 21-V (OVV/Observation).

Salines de Mongofre, Maó. 7 ex. el 6-V (PIR). 1 ex. el 17-XII (PNAG).

Eivissa: Pas prenupcial, darrera cita el 29-IV amb **30** ex. a ses Salines (SDW/Observation).

Pas postnupcial, primera cita el 7-IX (1 ex.) i darrera l'1-XI (1 ex.), ambdós a ses Salines (SDW/Observation).

Formentera: pas prenupcial, 1 ex. el 3-IV a ses Salines (MTF/Observation).

Tringa flavipes. Camagroga. Archibebe patigualdo chico. Lesser Yellowlegs

Estatus: divagant (MA). *Selecció*: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Tringa erythropus. Cama-roja pintada. Archibebe oscuro. Spotted Redshank

Estatus: estival no reproductor rar (MA). Hivernant escàs (MA) i rar (ME-EI). Migrant moderat (MA), escàs (ME-EI-FO), i rar (CA).

Selecció: fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: s'Albufera. Un màxim de 49 ex. el 17-IX (RES/eBird). Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (RES, VIC, PNAM; CHT/eBird).

Albufereta, Pollença. Màxims mensuals (RES, VIC, RNSA).

Es Salobrar, Campos. Un màxim de 74 ex. el 6-XI (MUN).

Màxims mensuals (BAU, SVL; DGZ/Observation).

Dates <i>T. erythropus</i>	12*I	II	III	23*IV	12*20** 21***V	VI	2*VII	19*VIII	IX	X	XI	XII
Albufera	46	32	21	34	7/6**	0	8*/18	14	49	9	7	43
Albufereta	1*	-	-	6*	1*	0	0	0	0	0	0	0
Salobrar	6	3	-	-	1***	0	0	1*/4	+	56	74	14

Pas prenupcial. Bassa de Can Guidet, Palma. 1 ex. el 16-IV i 2 ex. el 19-IV (ZMR/eBird).

Menorca: Salines d'Addaia-Mongofre, es Mercadal-Maó. Màxims mensuals (PNAG; PIR*).

<i>T. erythropus</i> Dates	13-I	14-II	13-19*III	11-IV	10-V	12-VI	10-VII	13-VIII	11-IX	10-X	17-XI	16-XII
Addaia-Mongo	0	0	2	0	3	0	0	0	0	0	1	0

Eivissa: Pas postnupcial, el 7-X (1 ex.) a ses Salines (Sant Josep) (MSN/Observation).

Tringa nebularia. Camaverda. Archibebe claro. Common Greenshank

Estatus: hivernant escàs (MA-EI) i rar (ME-FO). Migrant moderat (MA), escàs (ME-EI-FO), i rar (CA).

Selecció: fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: s'Albufera. Un màxim de 29 ex. el 25-VIII. Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (RES, VIC, PNAM; BNG/Observation).

Albufereta, Pollença. Un màxim de 31 ex. el 12-I. Màxims mensuals (RES, VIC, RNSA; TSL-HKS-LKN/Observation).

Es Salobrar, Campos. Un màxim de 21 ex. el 6-XI (MUN). Màxims mensuals (GOBM; MUN, MNT; BAC, GRD; TSL-JMO/Observation).

Dates <i>T. nebularia</i>	I	II	III	IV	2*11** 26***V	VI	8*24 **VII	VIII	IX	X	XI	XII
Albufera	17	11	11	6	9/2***	1	2*/4	29	26	10	8	6
Albufereta	31	3	4	3	3*	1	2	6	2	7	8	3
Salobrar	6	+	7	2	2**	0	2**	8	+	4	21	1

Estany dels Tamarells, ses Salines. 5 ex. el 24-I (GUT, ART, MTM, MTA, MUÑ).

Pas prenupcial, l'1-V (1 ex.) a la bassa de Can Guidet (Palma) (TSL/Observation).

Pas postnupcial, el 24-VII (1 ex.) al PN de Mondragó (AMG), el 26-VII (2 ex.) a Felanitx, el 7-IX a les basses de Son Navata (1 ex.) (JMO/Observation) i al prat de Maristany (1 ex.) (MUN).

Menorca: Albufera des Grau, Maó. Màxims mensuals (PNAG).
Salines d'Addaia-Mongofre, es Mercadal-Maó. Màxims mensuals (PNAG).

<i>T. nebularia</i>	13-I	15-II	14-III	10-IV	10-V	13-VI	11-VII	14-VIII	12-IX	9-X	14-XI	17-XII
Dates												
Albufera	1	0	0	0	2	3	2	10	7	2	4	6
Addaia-Mongo.	2	0	1	7	1	0	0	0	1	4	5	0
Dates	13-I	14-II	13-III	11-IV	10-V	12-VI	10-VII	13-VIII	11-IX	10-X	17-XI	16-XII

Basses de Lluriac, es Mercadal, 1 ex. el 24-IV (BLB/Observation).
Salines de Fornells, es Mercadal. 1 ex. el 12-VI (PIR).

Eivissa: Pas prenupcial, primera cita el 15-II amb 1 ex., i darrera el 6-IV (1 ex.) ambdós a ses Salines (Sant Josep) (SDW/Observation).

Pas postnupcial, primer registre el 29-VII amb 1 ex., i darrera el 3-XI (1 ex.), ambdós a ses Salines (CZM-SDW/Observation).

Hivernada, 1 adult el 28-XII a ses Salines (ODS/Observation).

Formentera: Pas prenupcial, primera cita el 4-II amb 4 ex. a els Estanyets (MAR), i darrera el 3-IV amb 1 ex. a l'estany Pudent (MTF/Observation).

***Tringa melanoleuca*.** Camagroga grossa. Archibebe patigualdo grande.
Greater Yellowlegs

Estatus: divagant (MA). **Selecció:** tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses

***Arenaria interpres*.** Girapedres, picaplatges (MA-ME-EI-FO). Vuelvepie-dras. Ruddy Turnstone

Estatus: hivernant escàs (MA) i rar (EI-FO). Migrant escàs (MA-ME) i rar (EI-FO-CA).

Selecció: fenologia, màxims mensuals, i tots els registres a ME-EI.

Mallorca: Badia de Palma. Màxims mensuals a: costa (GON; GIA, HMR, VIA)^A, BAZ^C/eBird, cala Gamba (CST^F/eBird), es Carnatge (BAZ^B;BAU^C), cala Estància (BOC^D), caló Son Caios (WSN^E/Observation).

Badia de Pollença. Màxims mensuals a: port de Pollença (MIM^B).

Badia d'Alcúdia. Màxims mensuals a: Son Real (SER^F), Son Serra de Marina (GON)^E, platja de Can Picafort (CLF; PSM^B-BSF^C-BTT^G/Observation), PN s'Albufera (RES, VIC, PNAM)^E.

Punta de Capdepera - Cap de ses Salines (Santanyí). Màxims mensuals per zones: Punta de n'Amer (TSL^A-HKS^B/Observation).

Cap de ses Salines-Colònia de Sant Jordi. Màxims mensuals a: costa (MAC, LOP, PAM)^A, BNG^B-JMO^D/Observation; platja des Dolç (BAZ)^C.

Colònia de Sant Jordi-s'Estalella. Màxims mensuals a: Colònia (MAC-LOP-PAM)^A; Salobrar (TSL^B-JMO^C/Observation), S'Estalella amb un registre aïllat el 24-VI (AMG)^D, platja des Trenc (VDW^E/Observation).

Dates A. interpres	I	II	III	IV	1*5** 14***V	VI	6*VII	19*20 **VIII	IX	X	XI	XII
Badia Palma	40 ^A	+	9 ^B	12 ^C	-	0	0	3 ^D */4 ^D	14 ^E	11 ^F	27 ^F	12 ^G
Badia Pollença	-	-	-	-	0	0	0	0	1 ^B	+	+	+
Badia Alcúdia	13 ^E	+	1 ^B	6 ^C	1 ^E ***	0	0	4 ^F *	8 ^G	12 ^H	+	+
Capdepera-ses Salines	-	-	-	1 ^A	6 ^B *	0	0	0	-	-	-	-
Cap Salines-Col. S. Jordi	3 ^A	+	+	2 ^B	1♂, 1♀ ^C **	0	0	0	-	2 ^D	+	+
Colònia Sant Jordi-Estalella	9 ^A	+	2 ^A	1 ^{B-C}	-	(1) ^D	5 ^E *	+	+	+	+	+
TOTAL MALLORCA	65	+	12	22	9	(1)	5	8	23	25	27	12

Menorca: Punta Prima, Sant Lluís. 13 ex. el 27-VIII (PIR).

Eivissa: Hivernada, el 3-I amb 3 ex. a es Pouet (Sant Josep) (TVR/Ob-servation). El el 21-XII (1 ex.) a la platja des Codolar (Sant Josep) (SDW/Observation).

Formentera: Pas postnupcial, primera cita el 14-IX amb 2 ex. a l'estany des Peix (SEP).

***Calidris canutus*.** Corriol gros. Correlimos gordo. Red Knot

Estatus: hivernant rar (MA-ME-EI). Migrant rar.

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: Pas prenupcial, el 16-V (1 ex.) al s'Albufera (RES, VIC, PNAM). Pas postnupcial, present 1 ex. entre el 23-IX (MAC/eBird), i el 6-X (BAZ, PAM), ambdós al Salobrar de Campos.

Menorca: Salines de Mongofre, Maó. 1 ex. el 8-V (VEG).

Calidris pugnax (abans *Philomachus pugnax*). Batallaire. Combatiente. Ruff

Estatus: hivernant escàs (MA) i rar (EI). Migrant moderat (MA-ME) i escàs (EI-FO).

Selecció: fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: es Salobrar, Campos. Màxims mensuals, dates extremes amb asterisc (GOBM; MUN, MNT; BAU; BAC, GRD; JMO-LNG/Observation).

S'Albufera. Un màxim de 9 ex. l'11-VI. Màxims mensuals (RES, VIC, PNAM; BTT/Observation).

Bassa de Can Guidet, Palma. Màxims mensuals (ZMR/eBird).

Dates <i>C. pugnax</i>	I	II	3*27 **III	8*23 **IV	15*17 **V	VI	2*24 **VII	VIII	IX	8*X	6*X	XI	XII
Salobrar	17	-	1	-	10/1*	0	1**	-	-	5	4*	0	
Albufera	0	0	2*/8	2	9/1**	0	2*	2	4	1*	0	0	
Can Guidet	0	0	3**	2**	0	0	0	0	0	0	0	0	

Pas prenupcial, el 15-III (1 ex.) al prat de Sant Jordi (Palma) (BAZ), i el 8-IV (1 ex.) a l'Albufereta (WTD/Observation).

Menorca: Basses de Lluriac, es Mercadal, 1 ex. el 24-IV (BLB/Observation). Salines de Mongofre, Maó. 1 ex. el 30-IV (PIR) i el 10-V (PNAG). Son Bou, Alaior. 1 ex. el 10-IX (PIR).

Eivissa: Pas prenupcial, el 21-IV amb 2 ex. a ses Salines (Sant Josep) (SDW/Observation).

Formentera: Pas prenupcial, 1 ex. el 3-IV a ses Salines (MTF/Observation)

Calidris falcinellus (abans *Limicola falcinellus*). Corriol becadell. Correlimos Falcinelo. Broad-billed Sandpiper

Estatus: accidental (MA). **Selecció:** tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Calidris himantopus. Corriol camallarg. Correlimos zancolín. Stilt Sandpiper

Estatus: divagant (MA). **Selecció:** tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Calidris ferruginea. Corriol beclarg. Correlimos zarapitín. Curlew Sandpiper

Estatus: hivernant rar (MA-EI), migrant moderat (MA-ME), escàs (EI-FO), i rar (CA).

Selecció: fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: es Salobrar, Campos. Un màxim d'11 ex. el 24-VII (JMO/Observation). Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (BAC-GRD; BAU; MON; JMO-TSL-HKS/Observation; SOL/eBird).

S'Albufera. Un màxim d'11 ex. el 16-V i 3-VIII. Màxims mensuals (RES, VIC, PNAM; BAZ; SCH/Observation).

Albufereta, Alcúdia. Màxims mensuals (RES, VIC, RNSA; TSL/Observation; LUQ/eBird).

Dates <i>C. ferruginea</i>	I	II	5*31 **III	25*IV	11*16** 17***V	VI	18*19** 20***VII	29*VIII	11*IX	4*X	XI	XII
Salobrar	0	0	0	3*/4	10*	0	4***/11	1	3*	0	0	0
Albufera	0	0	3*	2	11/2***	0	6**/8	11	2	1*	0	0
Albufereta	0	0	1**	1	1**	0	2*	2/1*	0	0	0	0

Pas prenupcial. el 28-IV (1 ex.) a la bassa de Can Guidet (Palma) (TSL/Observation).

Menorca: Pas prenupcial. Salines de Mongofre (Maó), 3 ex. el 5-IV (PIR), 1 ex. el 12-IV i 2 ex. el 10-V (PNAG).

Pas postnupcial. Son Bou (Alaior), 2 ex. el 21-VII (DVS/eBird), i 3 ex. el 31-VII (PIR).

Albufera des Grau, Maó. 3 ex. el 14-VIII (PNAG).

Eivissa: ses Salines, Sant Josep. Pas prenupcial, present entre el 21-IV amb 1 ex. i el 18-V (1 ex.). Un màxim de 12 ex. el 14-V (SDW/Observation). Pas postnupcial, present entre el 28-VII (8 ex.) (CST-SEP/eBird) i el 31-VII (4 ex.) (VRL/eBird).

Calidris temminckii. Corriol de Temminck. Correlimos de Temminck. Temminck's Stint

Estatus: hivernant rar (MA). Migrant escàs (MA) i rar (ME-EI-FO).

Selecció: fenologia.

Mallorca: s'Albufera. Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (RES, VIC, PNAM; DRS/Observation).

Es Salobrar, Campos. Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (MON; BAZ, PAM; JMO/Observation).

Dates <i>C. temminckii</i>	I	26*II	III	19*30 **IV	6*16**V	VI	25*VII	27*VIII	IX	6*X	XI	XII
Albufera	1	1*	0	1*	1**	0	1*	2/1*	0	0	0	0
Salobrar	0	0	0	1**	1*	0	0	0	0	6*	0	0

Pas prenupcial, darrera cita el 16-V (1 ex.) a l'Albufereta (RES, VIC, RNSA).

Menorca: Son Bou, Alaior. 4 ex. el 15-IV i 1 ex. el 31-VII (PIR).

Eivissa: ses Salines, Sant Josep. Prenupcial, 1 ex. el 12-II i 5-III (YAR; GAB).

Calidris alba. Corriol tres-dits. Correlimos tridàctilo. Sanderling

Estatus: hivernant rar (MA-EI-FO). Migrant escàs (MA-ME), i rar (EI-FO-CA).

Selecció: fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: Hivernada, 1 ex. del 19 al 26-I a l'Albufereta (RES, VIC, RNSA), el 3-I (4 ex.) a cala Galiota (Colònia de Sant Jordi) (BEN/eBird). El 25-XII (4 ex.) a Ciutat Jardí - Portixol - Molinar (Palma) (BAZ/eBird).

Es Salobrar, Campos. Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (MUN, SOL; BAZ; HKS-DRS-JMO/Observation).

Badia de Palma (Ciutat Jardí-Portitxol). Màxims mensuals (GIA, HMR, VIA; MUN; MUT).

Dates <i>C. alba</i>	I	II	23*III	10*IV	19*V	VI	24*VII	VIII	IX	X	XI	XII
Salobrar	0	0	0	1*/2	3/1*	0	2*	0	0	0	0	0
Badia Palma	9	+	2*	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Pas prenupcial. Primer registre el 21-III (1 ex.) a l'Albufereta (LNS-PHP/Observation). Darreres cites 19-V (1 ex.) al Salobrar de Campos (DRS/Observation), el 9-V amb 6 ex. a l'Albufereta (RES, VIC, RNSA), i l'1-V (1 ex.) a s'Albufera (RES, VIC, PNAM).

Pas postnupcial. Primers registres el 24-VII al Salobrar (JMO/Observation), el 26-VIII (1 ex.) a s'Albufera (RES, VIC, PNAM). Darrer el 10-IX amb **10** ex. a s'Albufera (MUT).

Menorca: Salines de Mongofre, Maó. 3 ex. el 3-VIII (CAU, VLN).

Son Bou, Alaior. 1 ex. l'11-VIII (PIR) i el 16-IX (CRT).

Eivissa: ses Salines, Sant Josep. 2 ex. el 10-V (SDW/Observation).

***Calidris alpina*.** Corriol variant. Correlimos común. Dunlin

Estatus: hivernant moderat (MA), escàs (EI) i rar (ME-FO). Migrant moderat (MA-ME), escàs (EI-FO), i rar (CA).

Selecció: fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: es Salobrar, Campos. Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (GOBM; MUN, MNT; BAC, GRD; BAU, SVL; HKS-J-MO/Observation).

S'Albufera. Un màxim de 31 ex. el 14-III. Un ex. aïllat el 4-VI. Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (RES, VIC, PNAM).

Albufereta, Pollença. Màxims mensuals (RES, VIC, RNSA; BAU; TSL/Observation).

Dates <i>C. alpina</i>	6*I	II	III	14*IV	11*16**V	7*VI	4*23**VII	2*24**VIII	IX	X	XI	XII
Salobrar	142	+	119	1	2/3*	0	0	1*/8	+	6	45	+
Albufera	1	1	3/31	7	6/1**	1	1*/2	3	4	4	12	4
Albufereta	1*	0	0	1*/3	2	2*	3**	3/1**	0	0	0	0

Menorca: Salines de Mongofre, Maó. 2 ex. el 5-IV (PIR) i 1 ex. l'11-IV (PNAG).

Salines de Fornells, es Mercadal. 7 ex. el 19-XI (PIR).

Eivissa: Ses Salines (Sant Josep). Hivernada, un màxim de 10 ex. el 12-I (YAR). Darrera cita el 15-II amb 2 ex. (SDW/Observation). Pas prenupcial, primera cita el 7-IV amb 1 ex., i darrera el 28-IV (4 ex.) (SDW/Observation). Pas postnupcial. 4 ex. el 7-IX (RTR/Observation).

***Calidris maritima*.** Corriol fosc. Correlimos oscuro. Purple Sandpiper

Estatus: accidental (MA). **Selecció:** tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Calidris bairdii. Corriol de Baird. Correlimos de Baird. Baird's Sandpiper

Estatus: divagant (MA). **Selecció:** tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Calidris minuta. Corriol menut. Correlimos menudo. Little Stint

Estatus: hivernant moderat (MA), escàs (EI) i rar (FO). Migrant moderat (MA-ME), escàs (EI-FO), i rar (CA).

Selecció: fenologia, màxims mensuals i dades d'interès.

Mallorca: es Salobrar, Campos. Un màxim de 72 ex. el 2-VIII i 6-XI (BAC, GRD; MUN). Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (GOBM; BAU; MUN, MNT; JMO-HBK/Observation). S'Albufera. Un màxim de 32 ex. el 3-VIII. Un registre aïllat el 14-VI. Màxims mensuals (RES, VIC, PNAM; HBK/Observation). Albufereta, Pollença. Un registre aïllat d'un ex. a V-VI. Màxims mensuals (RES, VIC, RNSA; BAZ; LNG/Observation).

Dates <i>C. minuta</i>	I	II	31*III	23*IV	9*11** 15***V	VI	4*23**24 ***VII	29*VIII	IX	X	XI	XII
Salobrar	53	4	21	6	17**	0	15***	72	+	6	72	3
Albufera	3	1	11	10	4*	(1)	2*/4	32	4	2	3	2
Albufereta	0	0	1*	2*	1***	(1)	2**/6	7*	0	0	0	0

Pas prenupcial. Bassa de Can Guidet (Palma) 1 ex. el 30-IV (ZMR/eBird).

Pas postnupcial. Bassa de Can Guidet (Palma) 1 ex. el 5-VIII (ZMR/eBird).

Menorca: Salines de Mongofre, Maó. 1 ex. l'11-IV i el 10-V (PNAG). 5 ex. el 30-IV i 11 ex. 5-VIII (PIR).

Albufera des Grau, Maó. 4 ex. el 14-VIII (PNAG).

Eivissa: ses Salines, Sant Josep. Hivernada, un màxim de 2 ex. el 15-II. Pas prenupcial, primera cita el 5-IV amb 6 ex., i darrera el 18-V amb 1 ex. (SDW/Observation). Pas postnupcial, 6 ex. el 29-VII (CZM/Observation).

Ses Feixes. 1 ex. al prat de ses Monges el 29-IV (SEP).

Formentera: Pas postnupcial, 2 ex. el 8-VIII a l'estany Pudent (BKX/Observation).

Calidris fuscicollis. Corriol coablanc, corriol cuablanc (MA). Correlimos culiblanco. White-rumped Sandpiper

Estatus: divagant (MA). **Selecció:** tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Calidris subruficollis (abans *Tryngites subruficollis*). Corriol rogenic.
Correlimos canelo. Buff-breasted Sandpiper

Estatus: divagant (MA).

Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Calidris melanotos. Corriol pectoral. Correlimos pectoral. Pectoral Sandpiper

Estatus: migrant rar (MA-EI).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: es Salobrar, Campos. **1** ex. des del 30-IV fins al 6-V.

S'Albufera. **1** jove els dies 15 i 16-IX.

Per a més informació d'aquest registre homologat, vegeu l'informe del Comitè de Rareses de Balears.

Cursorius cursor. Corredor. Corredor saharià. Cream-colored Courser

Estatus: divagant (ME). *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Glareola pratincola. Guatlereta de mar, polleta de mar (ME). Canastera. Collared Pratincole

Estatus: migrant escàs (MA) i rar (ME-EI-FO-CA).

Selecció: fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: pas prenupcial, primer registre el 28-III amb 4 ex. (HDS/eBird), i darrer el 12-V amb 2 ex. (MJS/Observation), i un màxim de 7 ex. el 2-IV, ambdós a s'Albufera (RES, VIC, PNAM; MAC/eBird).

Es Salobrar, Campos. Present entre el 5-IV amb 2 ex. (PGR/eBird), fins al 4-VI amb 3 ex. (SUA), i un màxim de 5 ex. el 10 i 11-IV (MUN, SOL).

Albufereta, Alcúdia. 2 ex. el 2-IV (BAU).

Pla de Vilafranca. 3 ex. el 29-IV (NIC/eBird).

Menorca: Salines de Mongofre, Maó. 1 ex. el 6-V (PIR).

Eivissa: Pas prenupcial, present entre el 5-IV amb 1 ex. (PRG), i el 29-IV amb 4 ex. (SDW/Observation), ambdós a ses Salines (Sant Josep).

Glareola nordmanni. Guatlereta de mar alànegra, guatlereta d'ala negra (MA-ME-EI-FO). Canastera alànegra. Black-winged Pratincole

Estatus: accidental (MA). *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Sternula albifrons (abans *Sterna albifrons*). Llambritja menuda. Char-rancito. Little Tern

Estatus: migrant escàs (MA) i rar (ME-EI-FO). Cria esporàdica 2020 i 2021 (FO).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: s'Albufera. Pas prenupcial, present en es Cibollar des del 18-IV (2 ex.) amb un màxim de 6 ex. el 19-IV. Darrer registre el 16-VII amb 1 ex. (RES, VIC, PNAM).

Eivissa: ses Salines, Sant Josep. Pas prenupcial, present entre el 14-V amb 2 ex. , i el 3-VII (1 ex.) (SDW-SEP-CST/eBird).

Gelochelidon nilotica (abans *Sterna nilotica*). Llambritja de bec negre, llambritja becnegra (MA-ME-EI-FO). Pagaza piconegra. Gull-billed Tern

Estatus: migrant escàs (MA-FO) i rar (ME-EI-CA).

Selecció: fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: pas prenupcial, present entre el 8-III (1 ex.) fins al 24-VI (6 ex.) ambdós a s'Albufera (RES, VIC, PNAM).

S'Albufera. S'observen de manera reiterada fins a 9 ex. amb comportaments territorials i de parella ben evidents però sense acabar de fructificar. Màxims mensuals (RES, VIC, PNAM; VTR-CST/eBird).

Albufereta, Alcúdia. Màxims mensuals (RES, VIC, RNSA).

Es Salobrar, Campos. Màxims mensuals (MON; BXT/eBird; TSL-DRS/Observation).

Dates <i>G. nilotica</i>	I-II	8*III	16*25**IV	19*V	24*VI	3*13**VII	VIII	IX	6*X	XI	XII
Albufera	0	1*/2	12	9	6*	1*/3	3	2	1*	0	0
Albufereta	0	0	1*	0	0	0	0	0	0	0	0
Salobrar	0	0	14**	17/3*	0	1**	0	0	0	0	0

Bassa de Can Guidet, Palma. 2 ex. el 2-IV (HIN/eBird), i el 28-IV (ZMR/eBird).

Can Trujillo, Calvià. 2 ex. el 25-IV (BEN/eBird) i 27-IV (GPR/eBird).

Menorca: Pas prenupcial. Primeres cites el 23-IV amb 1 ex. a ses basses de Lluriac (es Mercadal) (COL), i 1 ex. el 2-V a ses Salines de Fornells (es Mercadal) (PIR). Darrera el 20-V amb 1 ex. a l'Albufera des Grau (OVV/Observation).

Eivissa: ses Salines, Sant Josep. Pas prenupcial, present entre el 24-IV amb 4 ex., i l'11-VI amb 2 ex. (SDW-SEP/eBird). Pas postnupcial, 1 ex. el 29-VII (CZM/Observation).

Hydroprogne caspia (abans *Sterna caspia*). Llambritja de bec vermell, llambritja becnegre (MA-EI), llambritja grossa (ME).

Pagaza piquirroja. Caspian Tern**Estatus:** hivernant rar (EI). Migrant rar (MA-ME-EI-FO).**Selecció:** tots els registres rebuts.**Mallorca:** Pas prenupcial. 1 ex. el 15-IV a s'Albufera (RES, VIC, PNAM). 1 ex. el 24-IV a l'Albufereta (RES, VIC, RNSA; BEN-SOL/eBird; TSL/Observation). Un registre aïllat d'1 ex. el 19-VI a s'Albufera (VDB/Observation), pot ser una au molt retardada o un estival no reproductor (N. de l'ed.).Pas postnupcial. Primera el 30-VII amb 1 juvenil (DRC/Observation) cita molt primerenca, i el 13-IX amb 1 ex. (RES, VIC, RNSA), ambdós a l'Albufereta.

S'Albufera. Present entre el 14-IX (1 ex.) i 31-X amb 3 ex. a (RES, VIC, PNAM).

Hivernada. 1 ex. el 14-XII a l'Albufereta (RES, VIC, RNSA; HIN-LOP/eBird), primera cita com a hivernant per a l'illa (LOP).***Chlidonias hybrida*. Fumarell carabanc. Fumarel cariblanco. Whiskered Tern****Estatus:** migrant moderat (MA), escàs (ME-EI), i rar (FO-CA).**Selecció:** fenologia.**Mallorca:** s'Albufera. Un màxim de 189 ex. el 30-III, nou rècord, l'anterior era de 153 ex. el V-2000 a la mateixa localitat. Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (RES, VIC, PNAM; LBN/eBird).

Albufereta, Alcúdia. Màxims mensuals (RES, VIC, RNSA).

Bassa de Can Guidet, Palma. Màxims mensuals (ZMR-BAZ/eBird; TSL-HKS/Observation).

<i>Ch. hybrida</i> Dates	I-II	27*III	10*IV	4*V	1*13**VI	4*VII	VIII	24*VIII	IX-X	XI-XII
Albufera	0	16*/ 189	36	12	1**	1*	4	5/2*	0	0
Albufereta	0	0	6*	3	1*	0	0	0	0	0
Can Guidet	0	20**	33	13/1*	0	0	0	0	0	0

Menorca: pas prenupcial. Primera cita el 3-IV amb 1 ex. a d'Addaia (BLD/Observation), i 2 ex. el 5-IV a ses Salines de Mongofre (Maó) (PIR). Darrer el 16-V amb 1 ex. a l'Albufera des Grau (LMR/Observation).Pas postnupcial. Primera cita 1 ex. l'11-VII a l'Albufera d'es Grau (Maó) (PNAG). Darrers registres 1 juvenil el 7-IX (PIR) i el 16-IX (CRT) ambdós a Son Bou (Alaior).**Eivissa:** Pas prenupcial, present entre el 7-IV amb 1 ex. i el 21-IV (1 ex.) a ses Salines (Sant Josep) (SDW/Observation).***Chlidonias niger*. Fumarell, fumarell negre (ME). Fumarel común. Black Tern****Estatus:** migrant escàs (MA) i rar (ME-EI-FO-CA).

Selecció: fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: pas prenupcial. Primera cita el 17-IV (4 ex.) al cap de ses Salines (MAC/eBird). Darrer registre el 3-VI (1 ad.) a s'Albufera (RES/eBird). Un màxim de 30 ex. el 22-IV a la bassa de Can Guidet (ZMR/eBird).

S'Albufera. Present entre el 22-IV amb 1 ad. (HTT/eBird) i el 3-VI (1 ad.) (RES/eBird).

Pas postnupcial. Primera cita el 20-VII amb 4 adults mudant posats sobre troncs a la deriva mar endins al N de Mallorca (GGs/eBird). Darrers registres el 20-VIII amb 1 jove (RES, VIC, PNAM), i el 2-VIII (1 ex.) (DRC/eBird), ambdós a s'Albufera.

Menorca: Albufera des Grau. 1 ex. el 3-V (CLX/Observation).

***Chlidonias leucopterus*.** Fumarell alabanc. Fumarel aliblanco. White-winged Tern

Estatus: migrant escàs (MA) i rar (ME-EI-FO).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: Pas prenupcial, el 30-IV amb 1 ex. a la bassa de Can Guidet (Palma) (ZMR-BAZ/eBird), i el 4-V (3 ex.) al Salobrar de Campos (MRP/eBird).

Pas postnupcial, el 2-VIII (1 ex.) a s'Albufera (DRC/eBird).

***Sterna dougallii*.** Llambritja rosat. Charrán rosado. Roseate Tern

Estatus: accidental (ME). **Selecció:** tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

***Sterna hirundo*.** Llambritja. Charrán común. Common Tern

Estatus: reproductor escàs (MA). Migrant escàs (MA) i rar (ME-EI-FO-CA).

Selecció: reproducció i fenologia.

Mallorca: s'Albufera. Enguany hi han criat **52** parelles. Observació de nius a partir del 20-IV, polls del 28-V, i joves del 10-VI. En segona posta, còpules a partir del 28-VI, ous del 2-VII, i polls del 29-VII. Un màxim de 75 ex. l'1-VIII. Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (RES, VIC, PNAM; SHZ-VAS-LUQ/eBird).

Albufereta, Alcúdia. Observació de polls a partir de l'1-VI, i joves del 29-VI. Màxims mensuals (RES, VIC, RNSA; MUN; BAU; BEN-MAC-CST-TOM/eBird).

Dates <i>S. hirundo</i>	I	II	28*29**III	6*IV	V	VI	VII	24*VIII	3*IX	X-XI	XII
Albufera	0	0	1**	32	44, P	40, J	50, P, J	76 , J	2*	0	0
Albufereta	0	0	1*	12	23, P	25, J	25, J	13/1*	0	0	0

Thalasseus bengalensis (abans *Sterna bengalensis*). Llambritja bengalí, llambritja bengalina (MA). Charrán bengalí. Lesser Crested Tern

Estatus: accidental (MA). **Selecció:** tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Thalasseus sandvicensis (abans *Sterna sandvicensis*). Llambritja de bec llarg. Charrán patinegro. Sandwich Tern

Estatus: hivernant moderat (EI), escàs (MA-ME-FO), i rar (CA-DR).
Migrant escàs, i rar (CA-DR).

Selecció: fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: Badia de Palma. Un màxim de 28 ex. el 20-III (ZMR/eBird)^B.
Màxims mensuals, dates extremes amb asterisc. Zones:
Ciutat Jardí (BOC^A; MUN-MCH^C), Parc de la Mar (JMO^D/Observation),
cala Xinxell (RMY^E/Observation).
Badia de Pollença. Màxims mensuals. Zones: Albufereta (RES, VIC, RNSA)^A, Port de Pollença (GON)^B.
Badia d'Alcúdia. Màxims mensuals. Zones: platja de Muro (RES- VIC- PNAM^A; SCH^B/Observation).
Punta de Capdepera-Cap de ses Salines. Màxims mensuals.
Zones: Portocolom (RMY^A-JMO^B/Observation).
Cap de ses Salines-Cap Blanc. Màxims mensuals. Zones: port de la Colònia de Sant Jordi (MUN, PAM)^A.

Dates <i>T. sandvicensis</i>	I	II	25*31 **III	7*IV	V	VI	VII	VIII	26*IX	9*17**X	XI	XII
Badia Palma	19 ^A	+	28 ^B	12 ^{C*}	0	0	0	0	2 ^{D*}	+	3 ^E	+
Badia Pollença	4 ^A	3 ^A	2* ^{AA}	0	0	0	0	0	0	2 ^{B*}	4 ^A	4 ^A
Badia Alcúdia	7 ^A	7 ^A	7 ^A /1 ^{A*}	0	0	0	0	0	0	3 ^{B**}	4 ^A	6 ^B
P.Capdepera-C. Salines	-	-	-	0	0	0	0	0	0	-	1 ^A	1 ^B
Cap Salines-Cap Blanc	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	3 ^A
Total Mallorca	30	10	37	12	0	0	0	0	2	5	12	14

Menorca: Hivernada, un màxim de **12** ex. el 5-II al Port de Maó (MJJ/eBird).

Postnupcial, 1 ex. amb anella polonesa el 29-X (PIR).

Eivissa: port d'Eivissa. Hivernada, un màxim d'un grup de 28 ex. el 12-II (PRG).

Pas postnupcial, 2 ex. el 18-X a ses Salines (Sant Josep) (YAR).

Formentera: Pas prenupcial, darrera cita el 4-IV amb 8 ex. en vol al port de la Savina (MTF/Observation).

Thalasseus elegans. Llambritja elegant. Charrán elegante. Elegant Tern
Estatus: accidental (MA). **Selecció:** tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Hydrocoloeus minutus (abans *Larus minutus*). Gavinó. Gaviota enana.
Little Gull

Estatus: hivernant rar. Migrant rar (MA-ME-EI-FO-CA). **Selecció:** tots els registres rebuts.

Cap registre rebut.

Rissa tridactyla. Gavina tres-dits, gavina de tres dits (MA-ME-EI-FO).
Gaviota tridàctila. Black-legged Kittiwake

Estatus: hivernant escàs (ME) i rar (MA-EI-FO-CA). Migrant rar (MA-EI). **Selecció:** tots els registres rebuts.

Cap registre rebut.

Chroicocephalus genei (abans *Larus genei*). Gavina de bec prim. Gaviota picofina. Slender-billed Gull

Estatus: hivernant rar (MA-EI-FO). Migrant escàs (MA) i rar (ME-EI-FO).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: pas prenupcial, primeres cites el 6 i 27-IV (5 i 2 ex.) a s'Albufera (RES, VIC, PNAM; CST-GRP-BEN-SOL/eBird; TSL/Observation), i el 30-IV (1 ex.) al Salobrar de Campos (HKS/Observation; BEN-MAC-SOL/eBird).

Pas postnupcial. Primeres cites amb 1 ex. el 4-10-VIII a s'Albufera (RES, VIC, PNAM; CST/eBird).

Hivernada, 1 ex. des del 16 fins al 21-XII al Salobrar de Campos (RES-MTA-BAZ-MAC/eBird).

Menorca: Son Bou, Alaior. 1 adult el 19-VIII (PIR).

Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Pas prenupcial, present entre el 13-III amb 4 ex. (GAB), i darrer el 21-IV amb 1 ex. (SDW/Observation). Pas postnupcial, present entre el 8-X amb 1 ex. a la Torre de sa Sal Rossa (BYR/eBird), i darrer el 23-XI amb 1 adult (SDW/eBird).

Chroicocephalus ridibundus (abans *Larus ridibundus*). Gavina d'hivern, ploradora (MA), catràs (EI-FO). Gaviota reidora. Black-headed Gull

Estatus: Reproductor escàs (MA). Hivernant abundant (MA), moderat (ME-EI-FO), i rar (DR). Migrant abundant (MA-FO), moderat (EI), escàs (ME), i rar (CA-DR). Cria des de 2015 a MA.

Selecció: reproducció, fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: s'Albufera. Un màxim històric enguany hi han criat **28** parelles. Observació de nius a partir del 20-IV, polls del 28-V, i joves 10-VI. Un màxim de 321 ex. el 4-VIII. Màxims mensuals (RES, VIC, PNAM; MUN; TOM/eBird).

Albufereta, Alcúdia. Un màxim de 34 ex. el 7-III. Màxims mensuals (RES, VIC, RNSA).

Prat de Maristany, Alcúdia. Màxims mensuals (PNAM; CLF; MUN; BAU).

Es Salobrar, Campos. Màxims mensuals (BAC, GRD; MUN; JMO/Observation).

Badia de Palma. Màxims mensuals (MUN; BOC; JMO/Observation).

Bassa de Can Guidet, Palma. Un màxim de 340 ex. el 3-XII (BAU). Màxims mensuals (ZMR/eBird; MUN, PAM, GIA; MMA; TSL/Observation).

Dates <i>C. ridibundus</i>	I	II	III	IV	1*V	VI	VII	VIII	16*IX	14*X	XI	XII
Albufera	141	+	42	25	P	J	J	321	80	26	53	196
Albufereta	28	25	34	2	6	9	11	7	10	9	33	9
Maristany	2	23	+	-	0	0	3 ad. 1J	2	-	-	+	60
Salobrar	0	+	+	+	+	P	23, J	26	+	+	50	+
Badia Palma	78	+	+	0	0	0	0	0	2*/3	+	+	+
Can Guidet	36	12	27	8	1*	0	0	0	0	52*/110	135	340

Prat de Sant Jordi, Palma. 84 ex. el 3-XII (BAU).

Menorca: Albufera des Grau, Maó. Màxims mensuals (PNAG).

<i>C. ridibundus</i> Dates	13-I	15-II	14-III	10-IV	10-V	13-VI	11-VII	14-VIII	12-IX	9-X	14-XI	17-XII
Albufera	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	0	3

Depuradora d'es Mercadal. 1 ex. el 30-VII (CAU).

Eivissa: Pas postnupcial, primera cita el 29-VII amb 5 ex., i un màxim de 63 ex. el 23-XI, ambdós a ses Salines (CZM-SDW/Observation).

Ichthyaetus audouinii (abans *Larus audouinii*). Gavina roja, gavina de bec vermell (MA-FO), gavina corsa (ME), gavina de bec roig (EI). Gaviota de Audouin. Audouin's Gull

Estatus: reproductor i sedentari moderat (FO-CA). Reproductor moderat (MA-ME-EI), i escàs (DR). Hivernant moderat (EI-FO), escàs (MA) i rar (ME-CA).

Selecció: reproducció, i dades d'interès.

Mallorca: Port d'Andratx. 10 ex. el 6-I (BOC).

Badia de Palma. Un màxim de 33 ex. el 14-I (GIA, HMR, VIA/eBird), i 54 ex. en el dormidor al Moll Vell del port de Palma el 19-VIII (ZMR/eBird).

Badia d'Alcúdia. Un màxim de 8 ex. el 16-I (GON).

Menorca: Reproducció. Estimada una població total de 213 parelles reproductores distribuïdes entre quatre colònies. Vegeu les colònies censadas a la taula (PAB. Consell Insular de Menorca / Reserva de Biosfera; SOM).

<i>Ichthyaetus audouinii</i> 2024 / 10 COLÒNIES*	NÚM. PARELLES REPRODUCTORES	% BALEARS
Illot de s'Espardell / FO	224	30,98
Illeta de Cala Salada / EI	143	19,78
Illot de na Guardis / MA	-	-
Conillera / EI	90	12,45
Ciutadella / ME	76	10,51
Aire / ME	68	9,41
Torre de Sanitja / ME	50	6,92
Punta de ses Meleres / MA	-	-
Illot den Curt / MA	-	-
Dragonera / MA	-	-
Punta de ses Donardes / MA	-	-
Cala Salada / EI	27	3,73
Illot de Binissafuller / ME	19	2,63
Illot de Santa Eulària / EI	16	2,21
Illes Malgrats / MA	-	-
Illot de Formentor / MA	-	-
Illeta d'Encalders / EI	10	1,38
Total Balears	723	100

*No hi ha dades de Mallorca

Pitiüses: Reproducció. S'estima una població total de 510 parelles reproductores repartides en quatre colònies, el que suposa un increment de 95 pp més, és un 22,89 % més respecte a l'any anterior. Enguany s'han concentrat gairebé totes les parelles de la zona de ponent i zona sud, a es Freu, on es troba la colònia de s'Espardell (Formentera) amb **224** pp (un increment de 96 pp més que l'any anterior). Vegeu les colònies censadas a la taula. (Servei d'Agents de Medi Ambient i Servei de Protecció d'Espècies. Direcció General de Medi Natural i Gestió Forestal - Conselleria Agricultura, Pesca i Medi Natural).

Ichthyaetus melanocephalus (abans *Larus melanocephalus*). Gavina capnegre, gavina de cap negre (MA-ME-EI-FO). Gaviota cabecinegra. Mediterranean Gull

Estatus: hivernant escàs (MA-EI) i rar (ME-FO). Migrant escàs (MA-EI), i rar (ME-CA). Cria esporàdica 1984 (DR).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: hivernada, present el 6-I (2 ex.) a l'estany des Ponts (Alcúdia) (BEN- MAC/eBird), i des del 7 al 16-I amb 2 ex. a s'Albufera (RES, Vic, PNAM), i el 15-I (2 ex.) a l'Albufereta (RES, VIC, RNSA). El 8-XII (2 ex.) al prat de Maristany (Alcúdia) (LUQ/eBird).

Pas Pre i postnupcial. Badia de Palma. Màxims mensuals (ZMR-BAZ/eBird).

S'Albufera. Màxims mensuals (RES, VIC, PNAM; TIM/eBird; SCH/Observation).

Albufereta, Alcúdia. Màxims mensuals (RES, VIC, RNSA; BAZ-PAM/eBird; GGT/Observation).

Es Salobrar, Campos. Màxims mensuals (HKS-JMO/Observation).

Dates <i>I.melanocephalus</i>	I	11*II	11*III	28*30 **IV	6*V	21*VI	9*25 **VII	23*VII	VIII-IX	12* 28**X	12*XII	XII
Badia de Palma	0	1*	3/2*	0	1*	2*	1**	0	0	7**	4/1*	0
Albufera	2	0	0	0	0	0	1*	1*	0	2*	1	1
Albufereta	2	0	0	1*	0	0	1*	0	0	0	0	0
Salobrar	0	0	0	1**	0	0	0	0	0	0	0	0

Ses Fontanelles, Palma. 1 ex. l'11-II (BAZ).

Bassa de Can Guidet, Palma. 3 ex. el 2-III (TIM/eBird), i 1 ex. el 30-III (ZMR/eBird).

Cap de Formentor, Pollença. 2 ex. el 6-III (BAZ/eBird).

S'Algar, Portocolom. 2 ex. el 9-IV (RES/eBird).

Estany des Ponts, Alcúdia. 5 ex. el 2-XI (MAC-CST/eBird).

Menorca: Port de Maó. 1 ex. el 9-III i el 24-XII (PIR).

Eivissa: Pas postnupcial, 1 jove el 23-XI a ses Salines (Sant Josep) (SDW/eBird).

***Larus canus*.** Gavina cendrosa. Gaviota cana. Common Gull

Estatus: accidental (MA-ME). **Selecció:** tots els registres rebuts.

Mallorca: Bassa de Can Guidet, Palma. **1** ex. des del 29-I a l'1-II.

Prat de Sant Jordi, Palma. **1** ex. des del 6-III al 20-III.

Per a més informació d'aquest registre homologat, vegeu l'informe del Comitè de Rareses de Balears.

***Larus marinus*.** Gavinot, gavina grossa (ME). Gavió. Great Black-backed Gull

Estatus: accidental (MA). **Selecció:** tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

***Larus argentatus*.** Gavina atlàntica, gavina de cames roses (MA). Gaviota argentea. European Herring Gull

Estatus: accidental (MA). **Selecció:** tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

***Larus cachinnans*.** Gavina camagroga. Gaviota del Caspio. Caspian Gull

Estatus: accidental (MA). **Selecció:** tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Larus michahellis. Gavina, gavina vulgar (MA-EI-FO), gavina camagroga (ME). Gaviota patiamarilla. Yellow-legged Gull

Estatus: reproductor i sedentari abundant.

Selecció: reproducció i dades d'interès.

Mallorca: Albufereta, Pollença. Cria per tercer any consecutiu en aquesta localitat amb l'observació d'**1** niu. Observació d'ous a partir del 23-IV, polls del 29-V, i joves del 13-VI. Màxims mensuals (RES, VIC, RNSA; BAU; BXT/Observation).

Bassa de Can Guidet, Palma. Un màxim de 700 ex. l'1-X (ZMR-MAC-CST/eBird). Màxims mensuals (ZMR-BEN-MAC-CST/eBird; MMA).

S'Albufera. Màxims mensuals (RES, VIC, PNAM; BAU; VDG-BTT/Observation).

Port des Canonge, Banyalbufar. Màxim diari durant 3 hores (6:30/11:00), i indiquen la direcció de vol (RAMM).

<i>L. michahellis</i> Dates	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Albufereta	40	14	16	8	20, P	5, J	+	6	+	+	250	90
Can Guidet	240	22	56	205	86	69	+	12	600	700	26	90
Albufera	21	12	50	+	+	14	43	+	13	+	+	72
Port Canonge	103	20	44	350	42	38	48	135	8	6	23	58

Port d'Andratx. 95 ex. el 6-I (BOC).

Badia de Palma. 78 ex. el 14-I (MUN).

Puig de Galatzó. 350 ex. en vol el 22-I (SOL/eBird).

S'Algar, Portocolom. 215 ex. la majoria seguint barques de bou el 21-II (RES/eBird).

Cap de Cala Figuera, Calvià. 220 ex. la majoria seguint barques de bou i a les colònies de cria el 22-III (BEN-SOL/eBird).

Punta de Cala Gat, Capdepera. 311 ex. el 18-III (BAZ/eBird).

Embassament de Cúber, Escorca. 10 ex. el 23-III, 25 ex. el 20-V (PSM-DRS/Observation), 2 ex. el 30-VII (BAU)..

Son Hortolà, Calvià. 350 ex. en grans grups passen d'O-NE a les 17:30 h el 12-IV (BEN/eBird).

Palma. Nidificació dins el casc antic amb la trobada una closca d'ou eclosionat baix el campanar de l'església del Socors el 6-V (SAS).

Albufereta, Alcúdia. Un ex. depreda sobre una *Sterna hirundo* i durant una bona estona la va anar rompent amb el bec i fent-la voltar enlaire anava esquinçant el cos de l'animallet, mentre una dotzena de *S. hirundo* es tiraven damunt ella cridant fort i fent passades constantment el 25-VI (BAU).

Port de Sóller. 450 ex. el 10-VI (DSS/eBird).

Botanicactus, ses Salines. 300 ex. volant en cercles el 3-XI (MAC- CST/eBird).

- Cabrera:** nidificant. Un màxim de 230 ex. el 26-IV (TSL/Observation).
- Dragonera:** (Andratx). Nidificant. Un màxim de 400 ex. els dies 17-III, 14-V, i 3-VII. Observació de nius a partir del 14-V, i joves el 3-VII (TOM/eBird).
- Menorca:** Albufera des Grau, Maó. Màxims mensuals (PNAG). Salines d'Addaia-Mongofre, es Mercadal-Maó. Màxims mensuals (PNAG).

<i>L. michahellis</i>	13-I	15-II	14-III	10-IV	10-V	13-VI	11-VII	14-VIII	12-IX	9-X	14-XI	17-XII
Dates	85	24	9	11	11	21 A, 1 J	10	24	9	3	21	15
Albufera												
Addaia-Mongo.	12	3	2	7	5	1 A, 3 J	3	0	1	0	4	5
Dates	13-I	14-II	13-III	11-IV	10-V	12-VI	10-VII	13-VIII	11-IX	10-X	17-XI	16-XII

- Aire:** (Sant Lluís). S'han estimat entorn d'unes 250-**300** parelles reproductores (AIRE).
- Eivissa:** un màxim de 25 ex. el 21-VI a la Punta sa Torre (Sant Joan) (SHW/Observation).

***Larus fuscus*.** Gavina fosca, gavià fosc (EI). Gaviota sombría. Lesser Black-backed Gull

Estatus: hivernant escàs (MA) i rar (ME-EI-CA). Migrant escàs (MA-ME) i rar (EI-FO-CA).

Selecció: fenologia i subspècies.

Mallorca: Hivernada. Prat de Maristany, Alcúdia. Màxims mensuals (RES-MAC-BEN-HIN-LOP-SOL/eBird).

Sa Barrala, Campos. 1 ex. al camp de Polo el 20-I (BEN-MAC/eBird).

Bassa de Can Guidet, Palma. Registre aïllat el 4-VI amb parèntesis. Màxims mensuals (MAC-BEN-GRC-HIN-ZMR-CST-RES/eBird).

S'Albufera. Registre aïllat el 26-VI amb parèntesis. Màxims mensuals (RES, VIC, PNAM; SAS; BAU; BAZ-CST/eBird; SCH/Observation).

Port de Palma. Màxims mensuals (TIM-ZMR/eBird).

Dates	I	4*II	2*III	25*26 **IV	15*V	VI	VII	7*17 **VIII	13*15 **IX	15*26 **X	XI	5*XII
<i>L. fuscus</i>												
Maristany	2	1*	0	0	0	0	0	0	1*	0	0	0
Can Guidet	4	1	1	1*	0	(1)	0	1**	2	2/1**	0	1*/3
S'Albufera	1	1	1	1**	0	(1)	0	0	1**	1	1	1
Port Palma	0	0	1*	1	1*	0	0	1*	2	2/1*	0	0

Pas prenupcial, primeres cites el 29-II (1 ex.) al Saluet (Port d'Andratx) (MGH/eBird), el 2-III (1 ex.) a cala Gamba (Palma) (TIM/eBird), el 17-III (1 ex.) a sa Barrala (Campos)

(HIN- LOP/eBird), i el 23-III (1 ex.) al cap de Formentor (Pollença) (BAZ/eBird).

Darrers registres el 15-V (1 ex.) al port de Palma (ZMR/eBird).
Presència estival, el 24-VI (1 ex.) al cap Blanc (Llucmajor) (LGH/eBird).

Pas postnupcial, primeres cites el 4-VII (5 ex.) al Salobrar de Campos (VDW/Observation), el 7-VIII (1 ex.) al port de Palma (ZMR/eBird), el 17-VIII (1 ex.) a la bassa de Can Guidet (MAC/eBird), i el 22-VIII amb un grup de 3 ex. (2 ad., 1 ex. 3r ac) a s'Algar (Portocolom) (MDR/eBird),

Menorca: Port de Ciutadella. 2 ex. el 16-IX (MAC/eBird).

Port de Maó. 1 adult el 3-X i 1 juvenil el 7-X (PIR).

Eivissa: Pas prenupcial, 1 ex. 20-III al camí Corona de Dalt (Sant Antoni) (BSS/Observation), i 3 ex. el 6-IV a la Punta des Jondal (Sant Josep) (SDW/Observation).

Pas postnupcial, 1 ex. el 17-IX (DMZ/eBird), i el 15-XI amb 1 ex. (SDW/eBird), ambdós a ses Salines (Sant Josep).

Larus fuscus intermedius. Gavina fosca, gavià fosc (EI). Gaviota sombría. Lesser Black-backed Gull

Estatus: hivernant escàs (MA) i rar (ME-EI). Migrant escàs (MA-ME) i rar (EI-FO).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: Pas prenupcial, el 9-IV (1 ex.) a Moll Vell (Port de Palma) (ZMR/eBird),
Hivernada, el 31-XII (1 ex.) a s'Albufera (MAC-CST/eBird).

Larus fuscus graellsii. Gavina fosca, gavià fosc (EI). Gaviota sombría. Lesser Black-backed Gull

Estatus: hivernant rar (MA-ME-EI). Migrant escàs (MA-ME) i rar (EI).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: hivernada, el 15-I amb 1 ex. al golf de Son Muntaner (Palma) (MAC, LOP, VDE, PAM). El 15-XII (2 ex.) a sa Casa Blanca (Palma) (ZMR/eBird).

Pas prenupcial, primeres cites el 27-II amb 5 adults a l'estany des Ponts (Alcúdia) (RES/eBird), el 15-III (1 ex.) a la bassa de Can Guidet (Palma) (ZMR/eBird), el 25-III (1 ex.) a l'estany des Ponts (Alcúdia) (RES/eBird). Darrer registre el 25-IV (1 ex.) a la bassa de Can Guidet (ZMR/eBird),
Presència estival. El 27-VI (1 ex.) al clot de Son Noviet (Manacor) (ZMR/eBird).

Pas postnupcial, primers registres el 7-VIII (1 ex.), i 2 ex. des del 19-VIII fins al 6-X, ambdós al port de Palma (ZMR/eBird). El 16-IX (1 ad.) a s'Albufera (RES/eBird), el 14-15-X (1 ex.) a la bassa de Can Guidet (ZMR/eBird).

Darrer registre el 7-XI (1 ex.) a s'Albufera (RES/eBird).

Stercorarius pomarinus. Paràsit coaample. Págalo pomarino. Pomarine Jaeger

Estatus: migrant rar (MA-ME-CA). *Selecció:* tots els registres rebuts. Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Stercorarius parasiticus. Paràsit coapunxegut, paràsit (MA), paràsit coapunxut (ME). Págalo parásito. Parasitic Jaeger

Estatus: migrant rar (MA-ME-CA). *Selecció:* tots els registres rebuts.

Eivissa: Torre de ses Portes, Sant Josep. **1** ex. morfo fosc, llampecs d'una sola ala, envergadura clarament més petita que el virot gros atlàntic i més gran que els virots petits que ell estava atacant el 24-IV.

Registre pendent d'homologació pel Comitè de Rareses de Balears.

Stercorarius longicaudus. Paràsit coallarg, paràsit coallarga (MA). Págalo rabero. Long-tailed Jaeger

Estatus: accidental (MA). *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Stercorarius skua. Paràsit gros. Págalo grande. Great Skua

Estatus: hivernant i migrant escàs (MA-ME-FO), i rar (EI-CA-DR).

Selecció: fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: hivernada. 4 ex. a la mar volant al SW el 13-I a Portocolom (RAMM).

Pas prenupcial. S'Algar (Portocolom), 2 ex. el 21-II (RES/eBird).

Menorca: 2 ex. a una milla de la Mola de Fornells (es Mercadal) el 29-XII (VLN).

Uria aalge. Pingdai becfí, pingdai de bec prim (MA). Arao común. Common Murre

Estatus: accidental (MA). *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Fratercula arctica. Cadafet, gallineta (FO). Frailecillo. Atlantic Puffin

Estatus: hivernant escàs, i rar (CA).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: Colònia de Sant Jordi, ses Salines. **1** ex. el 30-XII (MAC-CST/eBird).

Alca torda. Pingdai, gallinetes de mar (EI). Alca. Razorbill

Estatus: hivernant escàs (MA) i rar (ME-EI-FO-CA).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: Prenupcial, primeres cites el 18-II amb 1 ex. a l'illot del Toro (Calvià) (GLT), el 21-II (1 ex.) a s'Algar (Portocolom) (RES/eBird). Darrer registre l'11-III (2 ex.) al cap de Cala Figuer

ra (Calvià) (GRP/eBird).

Postnupcial, el 30-XII (1 ex.) a la Colònia de Sant Jordi (ses Salines) (MAC-CST/eBird), i el 18-II (1 ex.) a Rafalbeig (Calvià) (GLT).

Gavia stellata. Calàbria petita, cabussó petit (MA-EI-FO). Colimbo chico.
Red-throated Loon

Estatus: accidental (MA). *Selecció*: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Gavia arctica. Calàbria agulla, cabussó (MA-ME-EI-FO). Colimbo ártico.
Black-throated Loon

Estatus: accidental (MA). *Selecció*: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Gavia immer. Cabussó gros. Colimbo grande. Great Northern Diver

Mallorca: Cala Gamba, Palma. 1 ex. el 14-I.

Aquesta au nidifica principalment al N d'Amèrica i freqüentment a Islàndia i Groenlàndia. A Europa hiverna a les costes del W, i és rara al Mediterrani. No figura en aquesta llista. Si hi és acceptada, serà el primer registre del Comitè a Balears.

Hydrobates pelagicus. Noneta, marineret (ME), paio (EI), fumarell (FO). Paíño europeo. European Storm Petrel

Estatus: reproductor i sedentari abundant (EI-CA), moderat (MA), escàs (FO), i rar (DR). Migrant escàs (CA). Reproductor escàs (ME). Falta informació.

Selecció: reproducció i fenologia.

Mallorca: Punta de n'Amer, Sant Llorenç. 1 ex. el 5-IV (SCH/Observation), i 18 ex. des de les 19:31 a les 20:47 h l'1-V (HKS/Observation).

Cales de Manacor. 5 ex. el 13-IV (BEN-HIN-CST-PAM-RES-DAZ-ZMR-BAZ/eBird).

Cap de ses Salines, Santanyí. 1 ex. al canal amb Cabrera el 26-IV (TSL/Observation).

S'Espartar: (Sant Josep). S'hi anellen 29 polls entre el 30-VII i 13-VIII, això suposa una disminució de -41,1 % de polls anellats respecte a la mitjana ($X = 49,2$ / $n = 11$ / 3 dies d'esforç). En aquest illot hi ha la major colònia del Mediterrani occidental (CAR, MAR).

Hydrobates monorhis (abans *Oceanodroma monorhis*)

Noneta de Swinhoe, petrell de Swinhoe (MA). Paíño de Swinhoe. Swinhoe's Storm-petrel

Estatus: divagant (CA). *Selecció*: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Hydrobates leucorhous (abans *Oceanodroma leucorhoa*)

Noneta grossa, bruixa (MA), petrell (ME). Païño boreal. Leach's Storm-petrel

Estatus: accidental (MA-ME-CA). *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Calonectris borealis (abans *Calonectris diomedea boealis*). Virots grossos atlàntic, virot atlàntic (MA), baldritja grossa atlàntic (ME), baldritja atlàntic (EI-FO). Pardela cenicienta atlàntica. Cory's Shearwater

Estatus: accidental (MA, CA).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: s'Algar, Portocolom. 1 ex. el 16-III.

Per a més informació d'aquest registre homologat, vegeu-ne l'informe del Comitè de Rareses de Balears.

Calonectris diomedea (abans *Calonectris diomedea diomedea*). Virots grossos mediterrani, virot mediterrani (MA), baldritja grossa mediterrani (ME), baldritja (EI-FO). Pardela cenicienta mediterrània. Scopoli's Shearwater

Estatus: reproductor abundant (ME-FO-CA), moderat (MA-EI), i escàs (DR). Hivernant escàs (MA-EI-FO).

Selecció: reproducció, fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: primers registres el 3-II amb 1 ex. al Port des Canonge (RAMM), i el 21-II (34 ex.) a Portopetro (MON). Darreres cites el 19-X (1.237 ex.) a Portocolom (RAMM), i 15-X (4 ex.) al cap de ses Salines (JMO/Observation).

Port des Canonge, Banyalbufar. Màxim diari durant 3 hores (6:30/11:00 h), i indiquen la direcció de vol (RAMM).

Portocolom, Felanitx. Màxim mensual diari durant 2 hores (17:00/19:00 h), i indiquen la direcció de vol (RAMM).

RAMM	14-I	3-II	3-III	6-IV	4-V	2-VI	6-VII	3-VIII	7-IX	5-X	3-XI	7-XII
<i>C. diomedea</i> Port Canonge	(2) NE	1 NE	1.228 NE	834 NE	294 SW	125 NE	146 NE	418 NE	273 NE	475 NE	0 NE	(1) NE
Portocolom	0	-	-	-	-	-	-	-	-	1.237 SW	0	0
Dates										19-X		

Portocolom, Felanitx. Màxim mensual i indiquen la direcció de vol (RES/eBird; MDR-BRY/eBird⁴).

Portopetro, Santanyí. Màxim mensual (MON;).

Dades de reproducció, primers joves volanders l'11-X i darrer el 21-X, n= 6, procedents d'Andratx (COFIB, Conselleria d'Agricultura, Pesca i Medi Natural). Aquests joves volanders enlluernats són víctimes de la contaminació lumínica. Aquesta xifra dona una idea de l'abast del problema d'aquest virot, a causa de la creixent il·luminació dels nuclis costaners urbans i turístics (LOP).

<i>C. diomedea</i> Portocolom	I	II	12-III	4-IV	2-V	VI	VII	22-VIII	IX	X	XI	XII
	0	-	2.100 SW	2.770 SW	480	-	-	51 ^A	-	-	0	0
Portopetro	0	34*/89	1.947	2.757	-	134	166	-	19	-	0	0
Dates	I	21*23-II	29-III	4-IV	V	13-VI	26-VII	VIII	30-IX	X	XI	XII

Centre de Recuperació de Fauna Silvestre, ingressats en total 4 ex.: tres d'ells morts, dos per ofegament el 19-III procedent de Calvià, un altre per malaltia no determinada el 2-XI procedent de Pollença. I un ex. amb malformació el 9-XI de Son Servera, posteriorment mor (COFIB, Conselleria d'Agricultura, Pesca i Medi Natural).

Cabrera: 15 ex. durant la travessa el 16-V (LPV/eBird).

Dragonera: 2 ex. el 14-V (RTF/eBird).

Menorca: Cap de Favàritx, Maó. Un màxim de 1.000 ex. el 14-III (COL).

Formentera: Uns màxims de 156 ex. l'1-IV al cap de Barbaria (MTF/Observation), i 41 ex. el 20-VI a es Freus (JMO/Observation).

Ardenna gravis (abans *Puffinus gravis*). Virot capnegre, baldritja capnegra (MA). Pardela capirotada. Great Shearwater

Estatus: accidental (MA-ME). *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Puffinus yelkouan. Virot de llevant, baldritja mediterrània (MA-EI-FO), baldritja petita (ME). Pardela mediterrània. Yelkouan Shearwater

Estatus: reproductor i sedentari escàs (ME). Hivernant rar (MA-EI-FO-CA). Migrant rar (DR).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: Portocolom, Felanitx. Màxim mensual i indiquen la direcció de vol (RES/eBird; MAC-CST/eBird^A).

Punta de n'Amer, Sant Llorenç. Màxim mensual (HDS/eBird; SCH/Observation).

Portopetro, Santanyí. Màxim mensual (MON).

<i>P. yelkouan</i> Costa de Llevant	I	4-II	16-III	4-IV	2-30 ^A -V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
	-	11 SW	61	51 SW	2 SW	-	-	-	-	-	-	-
Portocolom												
Punta n'Amer 31-III/ 5-IV	-	-	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Portopetro 21-II	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Menorca: Binidali, Maó. 165 ex. el 26-II (GRI).

Eivissa: Costa sureste, 3 ex. el 30-I, i 2 ex. el 20-II (GUI-RMN/eBird).
Sant Joan. 4 ex. a la costa a prop de Portinatx el 3-IX (RTR/

Observation), i 2 ex. a sa punta des Moscarter el 26-IX (VDM/Observation).

***Puffinus mauretanicus*.** Virot petit, baldritja (MA), baldritja balear (ME), virot (EI-FO). Pardela balear. Balearic Shearwater

Estatus: reproductor abundant (EI-FO-CA) i moderat (MA-DR). Hivernant moderat (DR).

Selecció: reproducció, fenologia i dades d'interès.

Mallorca: darreres cites postnupcials el 19-VII amb 12 ex. al coll de la Creueta (Pollença) (TSK/eBird), i el 6-VII (4 ex.) al Port des Canonge (RAMM). El retorn, primers registres el 7-IX (1 ex.) al Port des Canonge (RAMM), i el 15-IX (21 ex.) al cap de ses Salines (MOU-PAM/eBird).

Port des Canonge, Banyalbufar. Màxim diari durant 2 hores (17:00/19:00), i indiquen la direcció de vol (RAMM).

Portocolom, Felanitx. Màxim diari, durant 2 hores (17:00/19:00 h), i indiquen la direcció de vol (RAMM).

RAMM <i>P. mauretanicus</i>	14-I	4-II	3-III	6-IV	4-V	2-VI	6-VII	3-VIII	7-IX	5-X	3-XI	7-XII
Port Canonge	187 NE	1.543 NE	445 NE	1.146 NE	814 NE	63 NE	4 NE	0	1 NE	0	1 NE	67 NE
Portocolom	43 SW	-	-	-	-	-	-	0	0	1 SW	3 SW	-
Dates	13-I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	19-X	17-XI	XII

Centre de Recuperació de Fauna Silvestre. Ingressades 3 aus: 2 ex. per causes desconegudes l'1 i 4-VII procedents de Felanitx i Andratx, i 1 ex. per desorientació el 3-VII procedent de Santa Ponça (Calvià) (COFIB, Conselleria d'Agricultura, Pesca i Medi Natural).

Portocolom, Felanitx. Màxim mensuals, i indiquen la direcció de vol (RES).

Portopetro, Santanyí. Màxim mensual (MON).

Punta de n'Amer, Sant Llorenç. Màxim mensual (SCH-HKS/Observation).

Costa de Llevant <i>P. mauretanicus</i>	15-I	21-II	16-III	4-IV	4-V	13-VI	VII	VIII	IX	9-X	XI	XII
Portocolom	-	2.516 SW	4.330 SW	4.535 SW	-	-	-	0	0	-	-	-
Portopetro 13-III	118	2.036	2.580	3.020	-	32	-	0	0	-	-	-
Punta n'Amer 26-III/1-V	-	-	1.000	-	300	-	-	0	0	-	-	-

Cabrera: un màxim de 21 ex. el 15-IX (MUN, PAM, SOL, MOU).

Formentera: un màxim de 365 ex. l'1-IV al cap de Barbaria (MTF/Observation).

Ciconia nigra. Cigonya negra. Cigüeña negra. Black Stork

Estatus: migrant rar.

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: Pas prenupcial, el 4-V amb 1 ex. a la talaia d'Albercutx (Pollença) (BEN-MAC-GRP/eBird).

Ciconia ciconia. Cigonya, cigonya blanca (ME). Cigüeña blanca. White Stork

Estatus: hivernant escàs (ME) i rar (MA-EI). Migrant escàs (ME) i rar (MA-EI-FO-CA).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: Pas prenupcial, primera cita el 7-II amb 1 ex. a s'Albufera (PNAM). Un màxim de 35 ex. a Turixant de Baix (Escorca) el 15-III (SRV/eBird).

Son Reus, Palma. Present entre l'11-II (2 ex.) fins al 15-II (8 ex.) (ZMR-MAC/eBird).

S'Albufera. Present entre el 14-15-III (30 ex.) i el 24-IV (3 ex.) (RES, VIC, PNAM).

Albufereta, Alcúdia. Present entre el 18-IV (3 ex.) i 23-IV (4 ex.) (RES, VIC, RNSA; MAC/eBird).

Es Salobrar, Campos. 2 ex. el 25-III (GAB/eBird).

Talaia d'Albercutx (Pollença). S'han vist en pas actiu cap al N, 27 ex. el 19-IV (GORA).

Pla de Vilafranca. 1 ex. amb una cama ferida del 30-IV al 3-V (BEN-SOL-MTA/eBird). Apareix a diverses localitats i és possible que sigui l'au que ingresà al COFIB (N. de l'ed.).

Centre de Recuperació de Fauna Silvestre. Ingressat per traumatisme desconegut 1 ex., procedent de sa Pobla el 6-V, posteriorment mor (COFIB, Conselleria d'Agricultura, Pesca i Medi Natural)

Presència estival d'1 ex. des del 14-VI fins al 13-VII al prat de Sant Jordi (MCM/eBird), estany de ses Gambes (MUN, SOL), i al Salobrar de Campos (MON).

Pas postnupcial, el 27-VIII amb un grup de 9 ex. en camp obert (MCM/eBird).

Menorca: Camí de Tramuntana, es Mercadal. 8 ex. el 25-VIII (COL).

Morus bassanus. Mascarell, soteler (MA-FO), boix (EI). Alcatraz. Northern Gannet

Estatus: hivernant escàs, i rar (DR). Migrant escàs i rar (EI).

Selecció: fenologia, màxims mensuals (indicant si són adults/A, immadurs/Im o joves/J) i dades d'interès.

Mallorca: Badia d'Alcúdia – Cap des Freu. Màxims mensuals: Zones: platja de Muro (RES, VIC, PNAM)^C.
 Punta de Capdepera – Cap de ses Salines (Santanyí). Màxims mensuals per zones: Capdepera (GSR/Observation)^A, Portopetro (MON)^D, Portocolom (RAMM^E; Cap de ses Salines (MON^C; DVT/eBird^B).
 Punta Negra (Santanyí) – Cap Blanc (Llucmajor). Màxims mensuals per zones: Platja des Trenc (JMO/Observation)^A, illot na Llarga (GRD)^B.
 Cap Cala Figuera (Calvià) - Illa sa Dragonera (Andratx). Màxims mensuals per zones: cap de Cala Figuera (BAZ)^B, Dragonera (JMO/Observation)^A.
 Cap des Llebeig (Andratx) - Cap de Formentor (Pollença). Màxims mensual per zones: cap de Formentor (CTR/eBird)^A.

Dates <i>M. bassanus</i>	I	II	III	IV	6*V	VI	VII	VIII	IX	9*X	XI	XII
Badia Alcúdia	-	-	1 ^B	0	0	0	0	0	0	0	-	-
P.Capdepera-Cap Salines	5 ^C	1 ^D	+	1 ^A	1 ^{B*}	0	0	0	0	2 ^{C*}	2 ^E	+
P. Negra – Cap Balnc	1 ^B	-	-	-	0	0	0	0	0	-	-	1 ^A
Cap C.Figuera - Dragonera	1 ^B	1 ^A	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-
C. Llebeig - C. Formentor	-	-	-	-	0	0	0	0	0	1A ^{A*}	-	-
Total Mallorca	7	2	1	1	1	0	0	0	0	3	2	1

Menorca: La Mola. 1 ex. el 27-X (JMO/Observation).
 Port de Son Blanes, Ciutadella. 1 ex. el 15-XII (COL).
Eivissa: hivernada, 3 adults el 25-I (Sant Josep) (SDW/Observation). Un màxim de **7** ex. a la Torre de ses Portes el 22-XII (CST/eBird).
Pas postnupcial, primer registre el 6-XI amb 1 jove de primer any a Punta Roja (SDW/Observation).
Formentera: Hivernada, darrera cita el 27-II amb 4 ex. a ses Illetes (MAR).

***Sula leucogaster*.** Mascarell bru. Piquero pardo. Brown Booby
Estatus: accidental (MA). **Selecció:** tots els registres rebuts.
 Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

***Phalacrocorax carbo*.** Corb marí gros, corpetassa (MA). Cormorán grande. Great Cormorant
Estatus: migrant abundant (ME), escàs (MA-CA-DR) i rar (EI). Hivernant abundant (ME), moderat (MA), escàs (EI-FO), i rar (CA).
Selecció: fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: s'Albufera. Un màxim de 376 ex. en dormidors el 16-I (MAC/eBird). Presència estival fins a dues aus aïllades els mesos de maig, juny, juliol, i agost. Màxims mensuals, dates extremes amb asterisc (RES, VIC, PNAM; BAU; MAC-DLG/eBird; ENL/Observation).

Albufereta, Alcúdia. Un màxim de 191 ex. el 4-I. Màxims mensuals, dates extremes (RES, VIC, RNSA; MUN; MLR-HKS/Observation).

Badia de Pollença. Màxims mensuals (PHP-BTT-PTS/Observation).

Badia d'Alcúdia. Màxims mensuals (GON; DOP-BSF/Observation).

Badia de Palma. Màxims mensuals (MUN, VIA, GIA, HMR; MUT; BAU; BOC).

Estany des Ponts, Alcúdia. Un màxim de 270 ex. el 3-II (BEN-MAC/eBird). Màxims mensuals (MUN; MAC-BEN/eBird; PHP/Observation).

Bassa de Can Guidet, Palma. Màxims mensuals (MMA; ZMR/eBird).

Dates <i>Ph. carbo</i>	I	II	III	10*16**22*** 26****IV	3*4**V	VI	VII	6*27 **VIII	9*10 *IX	14*X	XI	XII
Albufera	376	312	186	82/5*** (2)	(2)	(2)	(2)	(1)	3**/6	46	125	214
Albufereta	191	16	6	1	1**	0	0	1*	3	7	81	96
Badia Pollença	1	+	6	0	0	0	0	0	1*	1	+	+
Badia Alcúdia	8	2	+	2*	0	0	0	0	0	+	+	1
Badia Palma	70	6	4	2**	0	0	0	1**	+	+	+	9
Estany Ponts	255	270	9	1****	0	0	0	0	-	+	+	+
Can Guidet	6		9	2	1*	0	0	0	0	3*	1	6

Embassament de Cúber, Escorca. 5 ex. el 2-III (BAU), el 7-IV (2 ex.) (BSF/Observation),
PN de Mondragó. 7 ex. el 13-III (AMG).

Pas prenupcial, darrera cita el 26-IV amb 1 ex. al estany des Ponts (MUN), i el 22-IV amb 5 ex a s'Albufera (DPR-GSR-HBK/Observation).

Talaia d'Albercutx (Pollença). S'han vist en pas actiu cap al N, 2 ex. el 16-III (1 ex.) i el 5-V (1 ex.) (GORA).

Pas postnupcial, 1 ex. el 6-X al cap de ses Salines (Santanyí) (GORA).

Menorca: Albufera des Grau, Maó. Màxims mensuals (PNAG; OVV/Observation).

Salines d'Addaia-Mongofre, es Mercadal-Maó. Màxims mensuals (PNAG).

<i>Ph. carbo</i> Dates Albufera	13-I	15-II	14-III	10-IV	20-V	13-VI	11-VII	14-VIII	12-IX	9-X	14-XI	17-XII
Addaia-Mongo.	7	15	8	2	0	0	0	0	0	0	14	35
Dates	13-I	14-II	13-III	11-IV	10-V	12-VI	10-VII	13-VIII	11-IX	10-X	17-XI	16-XII

Prenupcial, darrera cita el 21-V amb 1 ex. a Ciutadella (OVV/Observation).

Eivissa: Hivernada, un màxim de **55** ex. el 14-I a ses Salines (Sant Josep) (YAR-SEP/eBird).

Prenupcial, darrer registre el 14-V amb 1 ex. a ses Salines (SDW/Observation).

Postnupcial, primera cita el 20-X amb 1 ex. a ses Salines, i un màxim de 7 ex. en vol a punta Roja el 6-XI (SDW/Observation).

Formentera: Postnupcial, primera cita el 4-VII amb 5 ex. a l'estany des Peix (MRN/eBird).

Gulosus aristotelis (abans *Phalacrocorax aristotelis*). Corb marí. Cor-morán moñudo mediterráneo. Shag

Estatus: reproductor i sedentari abundant (ME-FO-CA), moderat (MA-EI), i escàs (DR).

Selecció: reproducció i màxims mensuals.

Mallorca: Reproducció. Observació de joves a partir del 25-II a s'Olla (Santanyí) (INK/Observation).

Badia de Palma. Un màxim de 26 ex. des del Molinar fins cala Estància el 14-I (MUN, GIA, HMR, VIA), 30 ex. el 7-IV (MUN, MCH).

Mirador de ses Malgrats, Calvià. 57 juvenils el 26-IV (VIA/eBird).

Badia d'Alcúdia. Un màxim de 50 ex. el 29-X (TOM/eBird).

Badia de Pollença. Un màxim de 45 ex. el 31-XII (MAC-CST/eBird).

Aire: (Sant Lluís). Aparentment, la població podria estar estabilitzada entorn de les 15-20 parelles, tot i que sembla que s'ha produït un canvi en la ubicació dels nius (AIRE).

Eivissa: Es Freus. Un màxim de **96** ex. pescant el 15-III (GUI/eBird).

Plegadis falcinellus. Ibis negre. Morito. Glossy Ibis

Estatus: reproductor i sedentari rar (MA). Hivernant rar (ME). Migrant rar. *Selecció*: reproducció i fenologia.

Mallorca: s'Albufera. Continua l'augment de colles nidificants, s'estima que hi han criat entre 45-**50** parelles, amb segones postes dins la primera setmana de juliol (2-VII). Fet que suposa un augment del 25 % en el nombre de parelles respecte a l'any passat. S'escolten cants a partir del 21-III, observació de nius a partir de l'1-IV fins al 4-VI, polls l'1-V, i joves del 7-V fins al 17-VI. Un màxim de 272 ex. el 4-VIII. Màxims mensuals (RES, VIC, PNAM; TRL-DVJ-TSK/eBird).

Albufereta, Alcúdia. Un màxim de 12 ex. el 7-IX. Màxims mensuals (RES, VIC, RNSA; GGT/Observation).

Dates <i>P. falcinellus</i>	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	12*X	XI	XII
Albufera	38	27	34	50	P, J	52, J	75, J	272	141	27	21	31
Albufereta	1	1	1	4	10	2	3	1	12	5*	0	0

Prenupcial. Canal de Menorca. En vol 1 ex. venint de Menorca el 5-IV (MRP/eBird).

Prat de Sant Jordi, Palma. 2 ex. el 16-IV (BAU). 40 ex. el 24-IV (TSL/Observation).

Bassa de Son Navata, Felanitx. 1 ex. el 16-IV (MMA, MAN).

Postnupcial. Prat de Maristany (Alcúdia). Primera cita el 7-IX (2 ex.) (MUN), i darrera el 21-X (2 ex.) (SCH/Observation).

Salobrar de Campos. 1 ex. el 13-IX (BBR/Observation).

Cap de ses Salines, Santanyí. S'han vist en pas actiu cap al S, 15 ex. el 14-IX (GORA).

Centre de Recuperació de Fauna Silvestre. Ingressat mort 1 ex. per botulisme procedents de Muro el 24-VIII (COFIB, Conselleria d'Agricultura, Pesca i Medi Natural).

Menorca: Vergers de Sant Joan, Maó. 1 ex. el 10-I (PIR).

Son Bou, Alaior. **62** ex. el 28-IV, 23 ex. el 9-V i 7 ex. el 31-VII (PIR).

Albufera d'es Grau, Maó. 1 ex. el 20-V (OVV/Observation), 2 ex. l'11-VII (PNAG).

Prat de Lluriac, es Mercadal. 5 ex. el 24-IV (BLB/Observation).

Eivissa: **Pas prenupcial**, primera cita el 24-IV amb 1 ex. a ses Salines (YAR). Darrer registre el 6-V amb 14 ex. en vol a ses Feixes (SDW/Observation).

Pas postnupcial, primer registre el 27-VII amb 1 ex. a Santa Eulària (CZM/Observation). Un màxim de 3 ex. a ses Salines el 31-VIII (YAR).

***Platalea leucorodia*.** Bec planer. Espàtula. Eurasian Spoonbill

Estatus: hivernant rar (MA-ME). Migrant rar (MA-ME-EI-FO).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: s'Albufera. Un màxim d'11 ex. el 7-II. Màxims mensuals (RES, VIC, PNAM; MON; BAU; LOP-HIN-TOM-MAC-GAB-BAZ-CST/eBird; PSM/Observation).

Albufereta, Alcúdia. Màxims mensuals (RES, VIC, RNSA; TOM/eBird).

Dates <i>P. leucorodia</i>	I	II	19*24**III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	5*X	27*X	XI	XII
Albufera	3	11	2/1*	0	0		0	0	0	1*/3	3	3	
Albufereta	3	3	1**	0	0	0	0	0	0	0	1*	-	

Pas prenupcial, darrera cita el 15-V (1 ex.) al Salobrar de Campos (LNG/Observation).

Pas postnupcial, primeres cites el 23-IX (1 ex.) al Salobrar de Campos (CST/eBird),

Hivernada, Prat de Sant Jordi, Palma. 1 ex. el 29-XII (MAC/eBird, CST/eBird).

Eivissa: Hivernada-prenupcial, present 1 juvenil des del 2-I fins al 29-IV a ses Salines (Sant Josep) (VRL-GAB/eBird).

Platalea alba. Bec planer africà, becplaner africà (MA). Espàtula africana. African Spoonbill

Estatus: divagant. **Selecció:** tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Botaurus stellaris. Bitó, queca (MA-EI-FO). Avetoro. Eurasian Bittern

Estatus: reproductor i sedentari rar (MA). Migrant rar (MA-ME-EI-FO) i rar (DR). **Selecció:** tots els registres rebuts.

Mallorca: s'Albufera. Enguany s'estima que hi han criat entre 2-3 parelles. S'escolten cants des de l'1-IV (1 ex.) fins al 9-V (1 ex.) amb un màxim de 2 ex. el 20-IV (RES, VIC, PNAM). Albufereta, Pollença. Gravat 1 ex. el 14-III gairebé al clarejar, al final de la nit (RES/NFC).

Botaurus minutus. (abans *Ixobrychus minutus*). Suís, quequí (MA-EI-FO). Avetorillo. Little Bittern

Estatus: reproductor escàs (MA). Hivernant rar (MA). Migrant escàs (MA-ME) i rar (EI-FO-CA-DR). Cria esporàdica 2011 i 2012 (ME). Falta informació.

Selecció: reproducció, fenologia, dades d'interès i tots els registres a FO.

Mallorca: s'Albufera. Observació de joves a partir del 26-V fins al 12-VII. Màxims mensuals (RES, VIC, PNAM; CST/eBird; VSV/Observation).

Albufereta, Alcúdia. Màxims mensuals (RES, VIC, RNSA).

Dates <i>I. minutus</i>	I	II	III	IV	9*V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Albufera	50	+	3	+	J	3, J	J	+	+	+	+	+
Albufereta	5	+	0	0	(1)*	0	0	0	0	0	1	1

Basses de Magaluf, Calvià. 3 ♂ entre el 8-26-V. Observació de joves el 5-VII (GRP/eBird).

Prat de Maristany, Alcúdia. 1 ex. el 7-VII (VDN/Observation).

Bassa de Son Navata, Felanitx. 1 jove el 6-IX (JMO/Observation).

Menorca: Golf de Son Parc, es Mercadal. 1 femella el 12-VI, posteriorment s'observa 1 mascle i la seva niuada. Aquests exemplars també s'observaran durant l'hivern (PIR).

Vergers de Sant Joan, Maó. 1 femella en uns hortalers de la zona el 30-XII (PIR).

Eivissa: Pas postnupcial. Ses Feixes, **1** ex. al prat de ses Monges l'1-IX (SEP).

Nycticorax nycticorax. Orval, martinet (EI). Martinete. Black-crowned Night Heron

Estatus: reproductor i sedentari escàs (MA). Estival no reproductor rar (ME). Migrant moderat (MA) i escàs (ME-EI-FO-CA-DR). Hivernant escàs (MA).

Selecció: reproducció i fenologia.

Mallorca: s'Albufera. Enguany s'estima que hi han criat entre 30-**35** parelles. Observació de símptomes de cria (coloració de cames) el 21-III, s'anoten cames vermelles per pujada hormonal, nius a partir de l'1-IV, polls l'11-V, i joves del 26-V fins al 21-VIII. Segona posta a les darreries de juny amb la construcció de nius i postes. Un màxim de 112 ex. el 12-I. Màxims mensuals (RES, VIC, PNAM; HIN-LOP-NEA-GAB/eBird; KRG/Observation).

Albufereta, Alcúdia. Un màxim de 17 ex. el 12-I. Màxims mensuals (RES, VIC, RNSA; KRR/eBird).

Dates <i>N. nycticorax</i>	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	21*IX	X	XI	XII
Albufera	112	+	20	28	P, J	J	J	J	48	26	96	34
Albufereta	17	1	2	1	2	4	8	2	1*	0	0	-

Pas prenupcial, primeres cites el 27-IV (1 ex.) a Felanitx (JMO/Observation), i el 10-IV amb 1 adult en vol baix a Costitx (VEN). Darrers registres el 12-VI (3 ex.) a Son Ferriol (Palma) (BAZ), el 10-VI (1 ex.) a ses basses de Vilafranca (SUA), el 25-V (1 ex.) a es Saluet (Andratx) (BAZ), i el 9-V (1 ex.) a Ariant (Pollença) (GON).

Pas postnupcial, el 7-IX (8 ex.) al prat de Maristany (Alcúdia) (MUN).

Dragonera: pas prenupcial, el 7-VI amb 9 ex. (JMO/Observation).

Pas postnupcial, el 18-IX amb 1 ex.) (JMO/Observation).

Menorca: Albufera des Grau. 5 ex. el 20-V (OVV/Observation).

Eivissa: Pas prenupcial, darrera cita el 9-VI amb 1 ex. a es Broll de Buscastell (Sant Antoni) (SDW/Observation).

Pas postnupcial, 1 ex. l'1-IX a Ses Feixes al prat de ses Monges (SEP).

Egretta garzetta. Agró blanc, garseta blanca (EI). Garceta común. Little Egret

Estatus: reproductor escàs (MA). Estival no reproductor escàs (ME-FO). Hivernant moderat (MA-ME), escàs (EI-FO), i rar (DR). Migrant moderat, i escàs (CA-DR).

Selecció: reproducció, fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: s'Albufera. Enguany la població reproductora s'ha estabilitzat en les xifres de l'any passat entre 45 i **50** colles, però continua enfora de les dels anys anteriors. Observació de nius a partir de l'1-IV, i joves del 26-V fins al 21-VIII. Algunes segones postes a partir del 3-VII. Un màxim de 176 ex. el 7-VIII. Màxims mensuals (RES, VIC, PNAM; BAU; TSK-CST/eBird; DPR-GSR-HBK-EKK-ENL/Observation).
 Albufereta, Pollença. Un màxim de 116 ex. el 4-I. Màxims mensuals (RES, VIC, RNSA; BAU; KRR/eBird).
 Prat de Maristany, Alcúdia. Un màxim de 230 ex. amb molt poca aigua el 9-IX (RES/eBird). Màxims mensuals (BAU; MUN; MAC/eBird).
 Es Salobrar, Campos. Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (GOBM; BAU; BAC, GRD; KLN/Observation).
 Badia de Palma. Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (MUN, GIA, HMR, VIA; BOC; MUT; PAM; MCH; BAU).

Dates <i>E. garzetta</i>	I	II	III	7*IV	V	VI	2*11**VII	27*VIII	IX	X	XI	XII
Albufera	135	27	34	50	105	120, J	130	176, J	140	144	+	32
Albufereta	116	6	11	6	16	8	60	9	7	36	15	86
Maristany	0	0	2	-	0	0	2**	43	230	125	-	-
Salobrar	1	+	-	-	0	0	2*	12	+	14	1	1
Badia Palma	7	4	2	2*	0	0	0	1*	5	+	1	1

Pas prenupcial, primeres cites 12-III (1 ex.) a la bassa de Can Guidet (ZMR/eBird), el 15-IV (4 ex.) al golf de Santa Ponça (Calvià), el 16-IV (1 ex.) a la bassa de Son Navata (Felanitx) (MMA, MAN), i el 18-IV (1 ex.) al PN de Mondragó (AMG).

Darrer registre, el 13-VI (1 ex.) al golf de Santa Ponça (Calvià) (MAN).

Bassa de Can Guidet, Palma. Un màxim de 76 ex. el 8-IV (ZMR/eBird).

Presència primaveral-estival. 3 ex. el 20-VI a l'estany des Tamarells (MUN, SOL).

Pas postnupcial, primeres cites el 2-VII (2 ex.) al Salobrar de Campos (BAU), l'11-VII (2 ex.) al prat de Maristany (Alcúdia) (MUN).

Darrers registres, el 23-X (5 ex.) al prat de Sant Jordi (Palma) (SAS), el 9-X (1 ex.) a la Gola (Port de Pollença) (GON), i el 7-IX (1 ex.) a l'estany des Ponts (MUN).

Menorca: Albufera des Grau, Maó. Màxims mensuals (PNAG).
 Salines d'Addaia-Mongofre, es Mercadal-Maó. Màxims mensuals (PNAG).

<i>E. garzetta</i> Dates	13-I	15-II	14-III	10-IV	10-V	13-VI	11-VII	14-VIII	12-IX	9-X	14-XI	17-XII
Albufera	25	13	4	6	4	10	1	4	3	8	15	14
Addaia-Mongo. Dates	4	7	11	3	2	1	2	2	6	4	4	1
	13-I	14-II	13-III	11-IV	10-V	12-VI	10-VII	13-VIII	11-IX	10-X	17-XI	16-XII

***Egretta gularis*.** Agró d'escull. Garceta dimorfa. Western Reef Heron

Estatus: accidental (MA). *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

***Ardeola ralloides*.** Toret. Garcilla cangrejera. Squacco Heron

Estatus: reproductor rar (MA). Migrant escàs (MA-ME-EI-DR) i rar (FO-CA). Hivernant rar.

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: s'Albufera. Enguany hi han criat entre 2 i **3** parelles, con sempre, han criat una mica més tard que la resta d'agrons. Observació de nius a partir del 7-V, i polls del 22-VI. Màxims mensuals (RES, VIC, PNAM; VDC-MLR/Observation; MAC/eBird).

Albufereta, Alcúdia. Un registre aïllat el 31-XII (BAU). Màxims mensuals (RES, VIC, RNSA).

Dates <i>A. ralloides</i>	I	II	III	4*24**IV	V	7*VI	VII	VIII	IX	X	1*X	XI	XII
Albufera	0	0	0	1*/3	4	3, P	4, J	J	2	1	1*		0
Albufereta	0	0	0	1**	1	1*	0	0	0	0	0		(1)

Prat de Maristany, Alcúdia. 1 ex. l'11-VII (MUN).

Pas prenupcial, el 8-IV amb 2 ex. a la bassa de Can Guidet (ZMR/eBird).

Pas postnupcial, primera cita el 8-VIII amb 1 ex. a un safareig de Son Pou (Selva) (GON), i el 7-IX (1 ex.) al prat de Maristany (Alcúdia) (MUN).

Menorca: Son Boter, Alaïor. 2 ex. el 13-IV (PIR).

Son Bou, Alaïor. 4 ex. el 28-IV i 1 ex. l'11-VIII (PIR).

Albufera d'es Grau, Maó. 1 ex. el 13-VI (PNAG).

Ardea alba (abans *Egretta alba*). Agró blanc gros. Garceta grande. Great Egret

Estatus: estival no reproductor rar (MA). Hivernant rar (MA) i escàs (ME) i rar (EI-FO). Migrant escàs (MA) i rar (EI-FO-CA-DR).

Selecció: fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: s'Albufera. Un màxim de 21 ex. el 12-I. Màxims mensuals i dates extremes (RES, VIC, PNAM; BAU).

Albufereta, Alcúdia. Un màxim de 23 ex. el 12-I. Màxims mensuals (RES, VIC, RNSA; BAU; MUN; ART, MUÑ; MAC-ADD/eBird).

Dates <i>A. alba</i>	I	II	III	IV	3*V	VI	30*VII	VIII	IX	X	XI	XII
Albufera	21	11	5	2	2	4	5	4	7	10	18	11
Albufereta	23	11	6	3	3/1*	1	9*	5	8	12	8	9

Hivernada, 2 ex. el 14-I des del Molinar fins a cala Estància (Palma) (MUN, GIA, HMR, VIA), el 6-II (1 ex.) al prat de Maristany (Alcúdia) (BAU), i el 12-II (1 ex.) a l'estany del Bisbe (Santa Margalida) (DOP/Observation).

Pas prenupcial, primera cita el 16-III amb 3 ex. en vol per la costa del Toro (Calvià) (GLT).

Pas postnupcial, primeres cites el 24-VII (2 ex.) al prat de Maristany (Alcúdia) (MAC/eBird), el 14-IX (1 ex.) al Salobrar de Campos (MAC-CST-BAZ-BRC/eBird), i el 18-IX (1 ex.) a les basses de Son Navata (Felanitx) (MTA/eBird). Darrers registres el 5-X (1 ex.) i el 21-IX (2 ex.) ambdós al cap de ses Salines (GORA).

Menorca: Albufera des Grau, Maó. Màxims mensuals (PNAG; CLX/Observation).

Salines d'Addaia-Mongofre, es Mercadal-Maó. Màxims mensuals (PNAG; PIR*).

<i>A. alba</i> Dates Albufera	13-I	15-II	14-III	10-IV	3-V	13-VI	11-VII	14-VIII	12-IX	9-X	14-XI	17-XII
	7	7	3	2	2 ^A	1	1	0	3	1	3	6
Addaia-Mongo.	0	1	2	0	0	0	1	0	0	0	3*	2
Dates	13-I	14-II	13-III	11-IV	10-V	12-VI	10-VII	13-VIII	11-IX	10-X	3-XI	16-XII

Prat de Son Bou, Alaior. 4 ex. el 25-VIII (ETP/eBird), i 2 ex. el 16-IX (CRT).

Eivissa: Pas prenupcial, 1 ex. el 6 i 14-III a ses Salines (Sant Josep) (PRG, BST; MAR).

Pas postnupcial. Ses Salines, primer registre el 30-VIII amb 1 ex. (SEP). Darrera l'1-XI amb 1 ex. volant (SDW/Observation).

Ardea ibis (abans *Bubulcus ibis*). Esplugabous. Garcilla bueyera. Western Cattle Egret

Estatus: Reproductor i sedentari moderat (MA) i escàs (ME). Hivernant moderat (MA-ME), i escàs (EI-FO). Migrant moderat (MA-ME), escàs (EI-FO), i rar (CA). Accidental (DR). Cria esporàdica al 1997 (FO).

Selecció: reproducció, màxims mensuals i tots els registres a FO.

Mallorca: s'Albufera. La colònia de cria ha experimentat un augment molt notable, entre 75 i **85** parelles. Observació de polls a partir de l'11-V fins al 14-VIII, i joves del 26-V fins al 21-VIII. El 26-V ja hi ha joves que volen i a començament de juliol s'anoten algunes segones postes a la zona de cria.

Un màxim de 418 ex. el 12-I. Màxims mensuals (RES, VIC, PNAM; SHZ-TOM-GRP-ABD/eBird; VDC-MLR-GVR-VDG-SMT-STG/Observation).

Albufereta, Pollença. Un màxim de 224 ex. el 12-I. Màxims mensuals (RES, VIC, RNSA; BAU).

Basses depuradora Binissalem. Nidificant. Observació de nius a partir del 29-IV, polls del 14-VI. Màxims mensuals (RES/eBird).

Bassa de Can Guidet, Palma. Màxims mensuals (BAU; ZMR-MAC/eBird).

Dates <i>A. ibis</i>	I	II	III	30*IV	V	VI	VII	5*VIII	IX	X	XI	XII
Albufera	418	+	+	70	200, J	200, J	130, +	J	200, P	231	+	+
Albufereta	224	7	11	6	1	9	16	61	36	191	270	142
Binissalem	17	+	135	70	P	110, J	+	+	+	+	+	+
Can Guidet	14	+	4	42/18*	0	0	0	2*	130	95	+	12

Prat de Sant Jordi, Palma. 154 ex. a la colgada el 16-I (VDE/eBird), el 16-IV (27 ex.) (BAU), i 220 ex. el 29-XII (MAC-CST/eBird).

Bassa de Son Navata, Felanitx. 228 ex. el 12-I (JMO/Observation), i 160 ex. a la colgada el 26-III, 125 ex. el 14-IV (MTA/eBird), **1** adult amb polls nounats el 6-VIII (JMO/Observatori), 120 ex. el 28-IX i 31-X (MTA/eBird),

Es Blanquer de Maria. Concentració per alimentar-se de 155 ex. el 2-VI (RES/eBird).

Pas postnupcial, primeres cites el 2-VII (3 ex.) al Salobrar de Campos (BAU), el 27-VII amb 401 ex. al pla de Sant Jordi (Palma) (DBB/Observation), i el 13-VIII amb 6 ex. en vol a Capdepera (VWG/Observation).

Darrers registres el 28-XI (2 ex.) a Esporles (BAU), i el 29-X amb 70 ex. creuant la badia de Pollença a les 11:21 h (DPY/Observation).

Eivissa: Pas prenupcial, primera cita el 16-IV amb 6 ex. a Santa Eulària (SDW/Observation). Darrera el 24-VI amb 3 ex. a ses Païsses (Sant Antoni) (MAR).

Pas postnupcial, 7 ex. el 20-IX al pla de Sant Antoni (RSL), i 6 ex. el 3-XI a ses Salines (Sant Josep) (SDW/Observation).

Ardea cinerea. Agró blau, agró gris (ME), garsa (EI). Garza real. Grey Heron

Estatus: estival no reproductor, rar (MA) i escàs (ME). Hivernant moderat (MA-ME-EI) i rar (FO-CA-DR). Migrant moderat, i escàs (CA-DR). Crià 1990 i 91 (MA).

Selecció: fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: s'Albufera. Arribada massiva al pas postnupcial amb un màxim de 76 ex. el 15-IX. Màxims mensuals (RES, VIC, PNAM). Albufereta, Alcúdia. Màxims mensuals (RES, VIC, RNSA; MUN, BRD).

Es Salobrar, Campos. Màxims mensuals i dates extremes (GOBM; BAU; MUN; TSL-LNG/Observation).

Dates <i>A. cinerea</i>	I	II	III	IV	15*V	VI	2*VII	VIII	IX	X	XI	XII
Albufera	24	17	11	4	5	3	7	11	76	13	19	14
Albufereta	17	7	2	1	2	12	11	5	13	31	6	9
Salobrar	17	+	1	4	1*	0	1*	3	-	-	1	2

Prat de Maristany, Alcúdia. 2 ex. el 6-II (BAU), 1 ex. el 24-IV (CLF),

Pas prenupcial, primeres cites el 2-III (1 ex.) a l'embassament de Cúber (Escorca) (BAU), el 15-III amb 3 ex. a la bassa de Can Guidet (Palma) (ZMR/eBird), el 16-III (1 ex.) al port de Pollença (PHP/Observation), i un màxim de 23 ex. el 22-III a la bassa de Can Guidet (MUN, PAM).

Darrers registres el 15-V al Salobrar (LNG/Observation), el 2-V (1 ex.) a Port Pollença (VDS/Observation), l'1-V (1 ex.) a la bassa depuradora II de Palma (TSL/Observation), i el 20-IV amb 3 ex. cap al N a la talaia d'Albercutx (GORA).

Presència estival, a més de s'Albufera i Albufereta, el 13-VI (2 ex.) al golf de Santa Ponça (Calvià) (MAN), el 18-VI (1 ex.) al port de Pollença (LMT/Observation), el 25-VI (1 ex.) al prat de Maristany (Alcúdia) (BAU).

Pas postnupcial, primeres cites el 2-VII (1 ex.) al Salobrar (BAU), l'11-VIII amb 1 ex. a la desembocadura del torrent de sa Riera (Port de Palma) (BOC), i el 20-VIII amb 14 ex. al prat de Maristany (BAU).

Cap de ses Salines (Santanyí). S'han vist en pas actiu cap al S, 33 ex. des del 21-IX fins al 7-X (GORA).

Darrers registres el 15-XI (2 ex.) al golf de Santa Ponça (MAN), el 29-X amb 3 ex. creuant la badia de Pollença (DPY/Observation),

Dragonera: Prenupcial, el 12-IV amb 3 ex. (JMO/Observation).

Postnupcial, almenys present entre el 15-IX amb 30 ex. i el 18-IX (3 ex.) (JMO/Observation).

Menorca: Albufera des Grau, Maó. Màxims mensuals (PNAG; OVV/Observation).
Salines d'Addaia-Mongofre, es Mercadal-Maó. Màxims mensuals (PNAG).

<i>A. cinerea</i>	13-I	15-II	14-III	10-IV	20-V	13-VI	11-VII	14-VIII	12-IX	9-X	14-XI	17-XII
Dates	5	5	7	4	1 ^A	0	2	3	6	6	4	8
Albufera												
Addaia-Mongo.	4	4	5	0	1	1	0	4	5	3	4	6
Dates	13-I	14-II	13-III	11-IV	10-V	12-VI	10-VII	13-VIII	11-IX	10-X	17-XI	16-XII

Eivissa: Hivernada. 1 ex. el 21-I a Santa Eulària (SDW/Observation), i el 28-XII (1 ex.) a ses Salines (Sant Josep) (ODS/Observation).
Pas prenupcial, 1 ex. el 14-V a ses Salines (Sant Josep) (SDW/Observation), i 1 ex. el 30-V al port de Eivissa (PRG).
Pas postnupcial, primer registre el 29-VII amb 10 ex. a ses Salines (CZM/Observation), i darrer el 9-XI (1 ex.) a Santa Eulària (SDW/Observation).

Ardea purpurea. Agró roig, agró reial (FO). Garza imperial. Purple Heron
Estatus: reproductor moderat (MA) i rar (ME). Hivernant rar (CA). Migrant moderat (MA), escàs (ME-EI-FO-CA), i rar (DR).

Selecció: reproducció i fenologia.

Mallorca: s'Albufera. Enguany s'estima que solament hi han criat entre 4-5 parelles, és una minva forta amb un -66 % menys que l'any passat de colles reproductores. Continuen rebent molèsties pels *Himantopus himantopus* i *Recurvirostra avosetta* que crien i s'alimenten quasi a tocar de la zona. Observació de joves a partir del 10-VII. Màxims mensuals (RES, VIC, PNAM; BZL/eBird).
Albufereta, Pollença. Un màxim de 19 joves el 24-VII. Per primera vegada 2 ex. es queden a l'hivern (2 ex. presents a I-2025). Màxims mensuals (RES, VIC, RNSA).

Dates	I	II	17*22**III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	14*X	XII
<i>A. purpurea</i>												
Albufera	0	0	1*/7	7	7	9	J	4, J	6	1	1*	0
Albufereta	0	0	1**	1	2	8	19 J	4	3	1	2	1

Pas prenupcial, primeres cites: el 24-III amb 1 ex. a la costa de Capdepera (QUN), el 25-III (1 ex.) a ses basses de Magaluf (Calvià) (SCH/Observation), el 28-III (1 ex.) a la bassa de Can Guidet (ZMR/eBird), el 20-IV (2 ex.) a l'atalaia d'Albercutx (GORA), i el 23-IV (1 ex.) al cap de Formentor (DPR-HBK-GSR/Observation).

Darrers registres el 16-V (1 ex.) al PN de Mondragó (AMG, FIO), el 15-V (1 ex.) al Salobrar de Campos (LNG/Observation), el 4-V amb 1 ex. en vol cap al N al vall den Marc (Pollença) (BAZ), i el 24-IV (1 ex.) al prat de Maristany (Alcúdia) (CLF). Pas postnupcial, primers registres el 4-VII (1 ex.) al Salobrar de Campos (VDW/Observation), el 24-VII (1 ex.) i 9 ex. el 28-VIII ambdós al PN de Mondragó (AMG), el 20-VIII (3 ex.) al prat de Maristany (BAU). Darrera cita el 7-IX (6 ex.) al prat de Maristany (MUN).

Enguany s'ha vist 1 jove des del 2-XI fins a final d'any a s'Albufera, Albufereta (2 joves el 26-XI), i pla de Vilafranca (RES; MAC, CST; MUN, BRD; LOP).

Dragonera: pas prenupcial, el 18-IV amb 2 ex. (JMO/Observation).

Menorca: Son Bou, Alaior. 1 ex. el 23-III (CAU, VLN), i 1 ex. el 16-V (OVV/Observation).

Salines d'Addaia, es Mercadal. Un grup en vol de 9 ex. l'1-IV (ALL/eBird).

Basses de Lluriac, 6 ex. l'1-IV (ARL).

Golf de Son Parc, 1 ex. el 8-IV (PIR).

Albufera d'es Grau, Maó. 4 ex. el 10-IV i 1 ex. el 10-V (PNAG).

Salines de Mongofre, Maó. 1 ex. el 13-VIII (PNAG).

Eivissa: Pas prenupcial, 1 ex. present entre el 20-IV a ses Feixes i el 21-VI a ses Salines (Sant Josep) (MAR, SEP, MRZ).

Hivernada, 1 jove al prat de ses Monges (ses Feixes) el 4-XII (SEP).

Pandion haliaetus. Àguila peixatera, àguila peixera (EI). Àguila pescadora. Western Osprey

Estatus: reproductor i sedentari rar (MA-ME-EI-CA). Hivernant rar (MA-FO). Migrant escàs (MA-EI-FO) i rar (ME-CA). Accidental (DR). Extint com a reproductor (FO).

Selecció: reproducció i dades d'interès.

Balears: Reproducció. Enguany el nombre de parelles territorials ha estat de 18, un mínim de 17 nius ocupats, 15 parelles han fet posta i un mínim de 24 polls volats. La primera parella vista arreglant un niu fou el 23 de gener a Cabrera, i la darrera observació de polls volant sobre un niu i fora fou de l'11 de juliol a Menorca (Dates de: Servei Agents de Medi Ambient i Servei de Protecció d'Espècies - Direcció General de Medi Natural i Gestió Forestal - Conselleria Agricultura, Pesca i Medi Natural/ A Menorca Rafel Triay (SOM - Consell Insular de Menorca/Reserva de la Biosfera/Agència de la Reserva de la Biosfera).

Aquestes dades, si exclouen Cabrera per dades incompletes, donen un èxit reproductor de 1,60 (polls volats/nius ocupats, $X = 1,50$, $n = 9$) i una taxa de vol de 1,84 (polls volats/parelles èxit, $X = 1,59$, $n = 9$) (N. de l'ed.).

<i>P. haliaetus</i> ILLA	PARELLES TERRITÒ- RIALS	NIUS OCUPATS	NIUS AMB POSTA	NIUS AMB ÈXIT	POLLS VOLATS	POLLS PERDUTS	ÈXIT RE- PRODUC- TOR	TAXA DE VOL
Mallorca	12	11	9	7	9	1	0,8	1,5
Cabrera	(6)	-	-	-	-	-	-	-
Menorca	4	4	4	4	12	0	3,0	3,0
Eivissa	2	2	2	2	3	3	1,5	1,5
BALEARS*	18	17	15	13	24	4	1,60	1,84

* Exclouen Cabrera

S'Albufera. Possible nova localitat de cria amb la construcció del niu a un post amb aportacions de material a la zona del Cibollar a partir del 21-XII (RES, VIC, PNAM).

Mallorca: pas prenupcial, talaia d'Albercutx i Formentor (Pollença), s'ha vist en pas actiu cap al N tan sols 1 exemplar l'1-V (GORA).

Dragonera: 1 ex. l'1-II (JMO/Observation).

***Neophron percnopterus*.** Miloca, moixeta voltonera (MA-EI-FO). Ali-moche. Egyptian Vulture

Estatus: reproductor i sedentari escàs (ME) i rar (MA). Migrant rar (MA-EI-CA).

Selecció: reproducció, i dades d'interès.

Mallorca: Reproducció. És probable que l'any 2024 hi ha tornat a haver reproducció d'1 parella a un niu a la vall de Ternelles (Pollença) (LOP). Observació d'una còpula el 27-III (TOM/eBird). Diverses cites per localitats properes d'1 adult, el primer avistament és a cala Sant Vicenç el 22-III (ATK/Observation) i també el 5-7-V (LBN-MAC/eBird), el 17-IV a la vall de Bóquer (RSY/eBird), i el 10-V a la finca d'Ariant (Pollença)(MUN, TAP). Talaia d'Albercutx, Pollença. 1 jove probablement de segon any el 12-V (CST/eBird).

PN de Llevant, Artà. 1 ex. el 29-IV al torrent des Fondo (MTA/eBird). 1 ex. el 19-V (JSB/eBird), 2 adults el 18-XI (FSC/eBird).

Capdepera. 1 ex. per la vall de Canyamel el 14-VIII (VWG/Observation).

Pas postnupcial. Pas migratori actiu cap al S, 1 jove el 4-X al cap de ses Salines (Santanyí) (GORA).

Menorca: Camí de cala Morell, Ciutadella. Un màxim d'un grup de 26 ex. el 2-X (GMS/eBird).

Eivissa: Pas postnupcial, 1 ex. amb un peix a les urpes l'11-IX (1 ex.) a Casa Torre (Sant Josep) (DMZ/eBird).

***Pernis apivorus*.** Aligot vesper, falcó vesper (MA-EI-FO). Abejero europeo. European Honey Buzzard

Estatus: migrant moderat, i escàs (DR).
Selecció: màxims mensuals i fenologia.
Mallorca: pas prenupcial. S'han vist en pas actiu cap al N, **32** ex. des de l'1-V fins al 25-VI. Màxims diaris a les localitats Talaia d'Albercutx (Pollença) (GORA), Son Real (Santa Margalida) (DRS/Observation)^A, Esporles (JMO/Observation)^B.

Dates	1-V	4-V	12-V	21-V	25-VI
Albercutx	3	2	10	6 ^A	1 ^B

Presencia estival, l'1-VII amb 2 ex. a Son Calvo (Palma) (BAZ).
Pas postnupcial. Pas migratori actiu cap al S, **74** ex. des del 10-VIII fins al 7-X, a les localitats: Cap de ses Salines (Santanyí) (GORA), s'Albufera (PNL)^A. Màxims diaris.

Dates <i>P. apivorus</i>	10-VIII	13-IX	14-IX	16-IX	21-IX	22-IX	26-IX	27-IX	5-X	6-X	7-X	9-X	12-X	14-X
Cap Salines	1 ^A	2	28	1	2	9	7	8	3	6	7			

Cabrera: Pas postnupcial, en migració activa cap al sud s'ha vist 1 ex. el 15-IX (MUN, PAM, SOL, MOU).
Dragonera: (Andratx). Postnupcial, 1 ex. el 22-IX (JMO/Observation).
Menorca: Cap de Cavalleria, es Mercadal. 3 ex. el 24-V (COL).
Eivissa: pas prenupcial, s'han vist en pas actiu cap al N **5** ex. des del 7-V fins al 10-VI, a les localitats de Sant Mateu, Sant Josep, Sant Joan i Sant Antoni (SDW/Observation).
Pas postnupcial, el 12-X (1 ex.) al cap Blanc (Sant Josep) (DMZ/eBird).

Gyps fulvus. Voltor lleonat, voltor foraster (MA-EI-FO), voltor (ME). Buitre leonado. Griffon Vulture

Estatus: reproductor i sedentari escàs (MA). Accidental (ME-EI-FO-CA-DR).

Selecció: reproducció i dades d'interès.

Mallorca: Reproducció. Serra de Tramuntana, el 2024 s'han localitzat 38 parelles ocupant niu i efectuant posta. S'han detectat 7 colles que han fracassat, volant un total d'un màxim de **34** polls. Són les dades més elevades des que aquesta espècie va començar a nidificar a Mallorca l'any 2012 i suposen un increment molt considerable, tant en parelles que comencen a reproduir-se com polls volats respecte d'anys anteriors. L'any 2022, que va ser l'any amb més polls volats, varen iniciar la cria 26 parelles i varen volar 23 polls, és a dir, 8 polls manco que enguany. Per altre costat, l'extensió territorial de l'espècie es va consolidant, amb cinc zones de reproducció, totes ubicades a la zona

central de la serra de Tramuntana, dues d'elles a la costa (Grup Local SEO-Virot, Fundació Vida Silvestre de la Mediterrània, Servei Agents de Medi Ambient i Servei de Protecció d'Espècies -Direcció General de Medi Natural i Gestió Forestal - Conselleria Agricultura, Pesca i Medi Natural).

Clot d'Albarca, Escorca. Un màxim de 40 adults i juvenils l'1-XII (CRN/eBird).

Aegypius monachus. Voltor negre, voltor (MA-EI-FO). Buitre negro.
Cinereous Vulture

Estatus: reproductor i sedentari escàs (MA). Accidental (ME-EI-CA-DR).

Selecció: reproducció i dades d'interès.

Mallorca: Reproducció. Serra de Tramuntana, enguany s'han visitat 83 nius coneguts, dels quals estaven ocupats 49 (parelles territorials). S'ha donat posta a 46 nius, del les quals se n'han perdut 10 i 1 poll. Es reproduceixen amb èxit 35 parelles, i han volat **34** polls. (Dades: Servei Agents de Medi Ambient i Servei de Protecció d'Espècies. Direcció General de Medi Natural i Gestió Forestal - Conselleria Agricultura, Pesca i Medi Natural). Amb una productivitat de 0,69; un èxit reproductor de 0,73; i una taxa de vol de 0,94 (N. del ed.).

Centre de Recuperació de Fauna Silvestre, ingressat 1 ex. mort per col·lisió amb estesa elèctrica a Calvià 12-I (COFIB, Conselleria d'Agricultura, Pesca i Medi Natural).

Vall d'Orient, Bunyola. Un màxim de 53 ex. el 7-XII (LOP/eBird, MAC/eBird, CST/eBird, ZMR/eBird).

Circaetus gallicus. Àguila marcenca. Àguila culebrera. Short-toed Snake Eagle

Estatus: migrant rar. Hivernant rar (MA-ME-EI).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: Hivernada, **1** ex. el 6-XII al prat de Sant Jordi (Palma) (BAZ).

Menorca: Postnupcial. Punta Nati (Ciutadella), el 26-X amb **1** ex. en vol cap al S (JMO/Observation), i **2** ex. volant molt a prop vists des del pàrquing, àguila de gran tamany que ha fet l'aleta varies vegades, tret indicatiu, el 3-XI (ALL/eBird).

Clanga pomarina (abans *Aquila pomarina*). Àguila pomerània. Àguila pomerana. Lesser Spotted Eagle

Estatus: accidental (MA-ME). *Selecció*: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Clanga clanga (abans *Aquila clanga*). Àguila cridanera. Àguila moteada. Greater Spotted Eagle

Estatus: accidental (ME). *Selecció*: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Hieraaetus pennatus. Àguila calçada, esparver (MA-EI-FO), soter (ME).
Àguila calçada. Booted Eagle

Estatus: reproductor i sedentari moderat (MA-ME). Hivernant escàs (EI) i rar (FO-CA). Migrant moderat (MA), i escàs (EI-FO-CA-DR).

Selecció: reproducció i fenologia.

Mallorca: Pas prenupcial. S'han vist en pas actiu cap al N **28** ex. des del 23-III fins al 16-V. Màxims diaris a les localitats de la Talaia d'Albercutx (Pollença) (GORA), Sant Elm (Andratx) (JOM^A/Observation), i vall de Bóquer (Pollença) (KRR/eBird).

Dates Pre. <i>H. pennatus</i>	23-III	13-IV	21-IV	4-V	16-V
Albercutx	2	4	1	17^A	4 ^B

Pas postnupcial, Pas migratori actiu cap al S, **54** ex. des del 27-IX fins al 16-X. Màxims diaris a les localitats cap de ses Salines (Santanyí) (GORA), JMO^A/Observation.

Dates Post. <i>H. pennatus</i>	15-IX	27-IX	4-X	5-X	12-X	13-X	16-X
Cap Salines		3	1	15	19	2 ^A	14

Cabrera: Hivernada, 2 ex. el 23-I (VIC).

Pas prenupcial, en migració activa cap al N, **2** ex. el 16-IV (VIC).

Pas postnupcial, en migració activa cap al S, **21** ex. des del 15-IX (MUN, PAM, SOL, MOU), i el 22-IX (20 ex.) (MLG/eBird).

Dragonera: (Andratx). Pas prenupcial, en migració activa cap al N, **4** ex. el 21-IV (DPT/Observation).

Eivissa: Pas prenupcial, en migració activa cap al N, amb **10** ex. des del 10-III fins al 23-VI a localitats de Santa Eulària, San Joan, Sant Josep i Sant Antoni (MÑZ/eBird; BSS/Observation; RSL; PRG). Amb un màxim de 3 ex. a la talaia de Sant Antoni el 23-V (MAR).

Pas postnupcial, en migració activa cap al S, **5** ex. des del 3-IX fins al 9-XI a localitats de puig des Molins (Eivissa), costa dels Amunts, i ses Balandres (Sant Antoni) (RSL; SDW/Observation).

Aquila chrysaetos. Àguila reial, àguila daurada (ME). Àguila real. Golden Eagle

Estatus: accidental. Extingit com a reproductor (MA). **Selecció:** tots els registres rebuts.

Cap registre d'origen natural rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Aquila fasciata (abans *Hieraaetus fasciatus*). Àguila coabarrada. Águila de Bonelli. Bonelli's Eagle

Estatus: reproductor rar i sedentari escàs (MA). Accidental (ME-EI-CA-DR). Extingit com a reproductor a Mallorca, darrer any de cria 1964. Reproducció a Mallorca a partir del 2014 com a conseqüència de la seva reintroducció.

Selecció: reproducció i dades d'interès.

Mallorca: Durant el 2024 a l'inici de l'època de reproducció hi havia 12 parelles territorials, dues més que el 2023. De les quals 11 varen nidificar amb èxit amb 11 postes i 20 polls, i un mínim de **16** polls volats (Seguiment reslitzat per MAN (IBA-NAT) i TRN (COFIB). La productivitat és de 1,33 (núm. joves volats/parelles territorials), l'èxit reproductor és de 1,45 (núm. joves volats/nius amb posta), i la taxa de vol és de 1,45 (núm. joves volats/nius amb èxit) (N. de l'ed.).

Cap de ses Salines, Santanyí. 2 ex. al canal de Cabrera el 4-VIII (MON).

Dragonera: 1 subadult el 17-IV (JMO/Observation).

Accipiter nisus. Esparver, falcó torter (MA-EI-FO), falcó torder (ME). Gavilán. Eurasian Sparrowhawk

Estatus: hivernant escàs. Migrant escàs (MA-ME-EI-CA) i rar (FO-DR).

Selecció: fenologia.

Mallorca: Pas prenupcial, Pollença: talaia d'Albercutx i Formentor. S'han vist en pas actiu cap al N **6** ex. des del 16-III fins al 27-IV. Màxims diaris (GORA).

Dates Pre. <i>A. nisus</i>	16-III	23-III	20-IV	21-IV	27-IV
Albercutx	1	1	1	1 ♀	2

Pas postnupcial, primeres cites el 10-IX (1 ex.) a Esporles (SMH/eBird), el 20-IX (1 ex.) a Galatzó (Calvià) (GRP/eBird), i l'11-X (1 femella) a Felanitx (JMO/Observation).

Cap de ses Salines (Santanyí), pas migratori actiu cap al S, **1** ex. el 2-XI (JMO/Observation).

Cabrera: Postnupcial, 1 ex. el 15-IX (MUN, PAM, SOL, MOU) i el 20-X (BAZ-SCH/eBird).

Menorca: Pas prenupcial, el 23-VI amb 1 adult a es Mercadal (VDR/Observation).

Pas postnupcial. Alaior, 1 ex. el 28-IX a la carretera cap a Maó (PIR).

Llucmaçanes, Maó. 1 ex. el 21-XI (GRI).

Eivissa: hivernada, darrera cita el 26-I amb 1 ex. a Sant Joan (SDW/Observation).

Pas postnupcial, primer registre el 23-IX (1 ex.) al cap Llen-trisca (VDM/Observation).

Astur gentilis (abans *Accipiter gentilis*). Astor. Azor. Northern Goshawk
Estatus: accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Circus aeruginosus. Arpella, arpella d'aigua (ME), pilot d'àdenes (EI).
Aguilucho lagunero. Western Marsh Harrier

Estatus: reproductor i sedentari escàs (MA). Hivernant escàs (MA-ME)
i rar (EI-FO-CA). Migrant moderat, i escàs (DR). Cria espo-ràdica 2018 (ME).

Selecció: reproducció, fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: s'Albufera. Enguany ha estat una notable temporada amb 29 territoris detectats, havent constatació de 20 nius amb posta d'ous, dels quals 17 han tingut una cria amb èxit, amb **34** joves volats. La distribució dels nius s'ha vist alterada per un incendi de 50 ha el 28-V, que va destruir un niu amb polls i va afectar a una altra parella territorial, sense niu confirmat. Les primeres dades de territorialitat (cants i vols de mascles) són els darrers dies de novembre del 2023. Primera evidència de posta a partir del 6-IV (un mascle que aporta menjar a una femella), observació de joves volant a partir de l'11-VI fins al 28-VI, aquest retard és degut a les pluges que van afectar negativament els nius més primerencs. El nombre màxim de joves volats per niu és de 3, a 3 nius, i el mínim és d'1 jove, a 5 nius. La productivitat és de 1,17 (núm. joves volats/ parelles territorials), l'èxit reproductor és de 1,7 (núm. joves volats/nius amb posta), i la taxa de vol és de 2 (núm. joves volats/nius amb èxit), aquestes ràtios notablement bones, indiquen un manteniment de la població nidificant al PNAM. Un màxim de 148 ex. en dormidors el 12-I. Màxims mensuals (RES, VIC, PNAM; TSL/Observation).

Albufereta, Alcúdia. Màxims mensuals (RES, VIC, RNSA).

Es Salobrar, Campos. Enguany s'estima que hi han criat entre 4 i 5 colles (LOP). Observació d'aportacions de branques a un niu, i d'aliment del mascle a la femella a un altre l'1-V (RES/eBird). Màxims mensuals (GOBM; BAU; MUN, SOL, PAM; BAC, GRD; PHP-LNS-TSL/Observation; HIN-LOP-RES/eBird).

Dates <i>C. aeruginosus</i>	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Albufera	148	+	+	16	P	J	J	+	+	+	51	94
Albufereta	2	3	2	2	2	2	1	1	1	3	3	1
Salobrar	17	10	7	12	9	+	5	3	+	4	32	43

Prat de Maristany, Alcúdia. 1 ex. el 12-III (BAU).
Pla de Vilafranca. 2 ex. el 26-IV (TSL/Observation).
Finca s'Avall. 3 ex. el 20-VI podrien haver niat aquí (MUN, SOL).
Pas prenupcial, talaia d'Albercutx i Formentor (Pollença),
s'han vist en pas actiu cap al N, **124** exemplars des del
16-III fins al 12-V. Màxims diaris (GORA; HKS^A/Observation).

Dates	16-III	23-III	14-IV	19-IV	20-IV	21-IV	24-IV	27-IV	28-IV	30-IV	1-V	4-V	5-V	9-V	12-V
Albercutx	2	11	1	42	19	8	4	12	4A	3	16	1	1	1	4

Pas postnupcial, pas migratori actiu cap al S, **64** ex. des
del 28-VIII fins al 19-X. Màxims diaris a les localitats: cap
de ses Salines (Santanyí) (GORA), al PN Mondrago (AMG)^A, a
Ariant (Pollença) (GON)^B.

Dates	28-VIII	4-IX	6-IX	14-IX	21-IX	22-IX	27-IX	28-IX	4-X	5-X	6-X	7-X	12-X	16-X	19-X
<i>C.aeruginosus</i>															
Cap Salines	1♂ ^A	1	1 ^B	5♂	9	4	4	3	1	16	8	3	2	5	1

Cabrera: hivernada, 1 femella el 23-I (VIC). Segona vegada que se cita
al parc nacional com a hivernant (LOP).
Postnupcial, pas migratori actiu cap al S, **1** ex. el 15-IX (MUN,
PAM, SOL, MOU).
Menorca: Albufera des Grau, Maó. Màxims mensuals (PNAG).

<i>C.aeruginosus</i> Dates	13-I	15-II	14-III	10-IV	10-V	13-VI	11-VII	14-VIII	12-IX	9-X	14-XI	17-XII
Albufera	2	1	2	0	1	2	1	2	1	1	2	3

La Mola de Fornells, es Mercadal. 2 ex. en vol el 21-III (TRI).
Prat de Son Bou, Alaior. **2** ex. construint niu el 18-V (OVV/
Observation).

Eivissa: Pas prenupcial, 1 mascle el 16-IV a ses Feixes (Eivissa), i 1 fe-
mella el 7-V al pla d'Albarca (Sant Antoni) (SDW/Observation).
Pas postnupcial, 1 ex. el 22-IX a Benirràs (Sant Joan) (VDM/
Observation).

Circus cyaneus. Arpella pàl·lida, esparver d'albufera (MA-EI-FO), arpella
d'albufera (ME). Aguilucho pàlido. Hen Harrier
Estatus: hivernant escàs (ME) i rar (MA-EI-FO-CA-DR). Migrant escàs.
Selecció: fenologia.
Mallorca: s'Albufera. Màxims mensuals, dates extremes amb asterisc
(RES, VIC, PNAM; BEN-LOP-MAC-MLL-NIC/eBird).
Albufereta, Alcúdia. Màxims mensuals (RES, VIC, RNSA; BEN-
MAC-KRH/eBird).

Dates <i>C. cyaneus</i>	I	27*II	III	1*IV	V	VI	VII	VIII	IX	5*X	24*27 **XI	XII
Albufera	3	1	1 ♀	1 ♀*	0	0	0	0	0	0	1 ♂*/1 ♀	1 ♀
Albufereta	1 ♀	1 ♂*	0	0	0	0	0	0	0	1*	1 ♀**	1 ♂

Es Blanquer de Maria. Present 1 ex. des del 5-I (♀) fins al 25-I (♂ ad.) (BEN-SOL-RES/eBird).

Pas prenupcial, darreres cites l'1-IV amb 1 femella (NIC/eBird), i el 26-III amb 1 mascle al prat de Sant Jordi (Palma) (DIE).

Pas postnupcial. Primera cita el 6 i 29-IX (1 ex.) al Blanquer de Maria (MON; MAC, CST/eBird), i el 31-X amb 1 mascle a sa Barrala (Campos) (BAZ).

Menorca: Son Bou, Alaior. 1 ex. el 21-I (PIR).

Eivissa: Pas prenupcial, 1 femella el 6-II (GAB) i el 8-III (MÑZ/eBird), ambdós a ses Salines (Sant Josep).

Circus macrourus. Arpella russa, arpella pàl·lida (MA-EI-FO). Aguilucho papialbo. Pallid Harrier

Estatus: hivernant rar (CA). Migrant rar.

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: Pas prenupcial, el 19-IV amb 1 ex. a Can Cullerassa (Pollença). Talaia d'Albercutx, Formentor (Pollença). S'han vist en pas actiu cap al N, 1 femella el 20-IV.

Pas postnupcial, el 24-IX amb 1 mascle de segon any al pla de Vilafranca.

Botanicactus, ses Salines. 1 mascle el 5-X.

Santanyí. 1 mascle a prop de cala Santanyí el 14-XI.

Menorca: Pas prenupcial. Camí de Binimel·là (es Mercadal), 1 ex. sedimentat a la mateixa zona que les quatre arpelles cendroses i dues arpelles d'aigua el 20-IV. 1 femella el 4-V a sa Gola de l'Albufera.

Eivissa: Pas postnupcial, 1 ex. el 27-X i el 30-X, ambdós a ses Salines. Per a més informació d'aquest registre, vegeu l'informe del Comitè de Rareses de Balears.

Circus pygargus. Arpella cendrosa, àguila d'albufera (MA-EI-FO). Aguilucho cenizo. Montagu's Harrier

Estatus: migrant escàs, i rar (DR). Cria esporàdica el 2001, 03 i 04 (MA).

Selecció: fenologia.

Mallorca: Hivernada. 1 juvenil el 12-I a S'Albufera (BEN/eBird), primera vegada que hiverna a Balears aquest transaharià (N. de l'ed.).

Pas prenupcial, s'ha vist en pas 25 ex., entre el primer registre el 9-II (molt primerenc) i darrer el 12-V, a les localitats de: Costitx (VEN)^D, talaia d'Albercutx (GORA)^A, Pla de

Vilafranca (RES^B-ZMR^E-SOL^K/eBird), Blanquer de Maria (BEN-MAC-CST/eBird)^H, s'Albufera (RES, VIC, PNAM)^C (BXT^L/eBird), Albufereta (LIS)^F (MAC^G-MTA^J/eBird). Màxims diaris:

Dates <i>C. pygargus</i>	9-12-II	13-III	9-IV	17-IV	18-IV	20-IV	21-IV	21-IV	24-IV	30-IV	30-IV	1-V	12-V
Exemplars	1juv.	1	1♂	1♂, 1♀	2♂, 2♀	1♀	1♀	2♂, 2♀, 1juv	1juv	1♂, 1♀	2juv	1♀	1♂, 1♀
Localitat	C	C	D, B	D	F, G	A	A	H	A	F	K	J	A, L

Pas postnupcial, s'han vist en pas **19** ex., entre la primera cita el 6-VIII i darrera el 10-X, a les localitats de: Albufera (RES, VIC, PNAM)^A, Prat de Sant Jordi (MCM/eBird)^G, cap de ses Salines (GORA)^E, Albufereta (RES, VIC, RNSA)^B, Pla de Vilafranca (JMO/Observation)^C, (RES^J-MRP^K/eBird), Blanquer de Maria (MAC^F-RES^H/eBird). Màxims diaris:

Dates <i>C. pygargus</i>	6-VIII	1-IX	3-IX	11-IX	14-IX	15-IX	19-IX	24-IX	29-IX	4-X	7-X	10-X
Exemplars	1♂	1♀	1J	2	1	1♂	1	5juv	1♀	1J	3	1
Localitats	C	H	G	F	E	A	E	J	K	J	E	B

Menorca: Pas prenupcial. Basses de Lluriac (es Mercadal), 1 mascle el 16-IV (BNN/eBird).

Camí de Tramuntana, es Mercadal. 1 ex. el 18-IV (PIR), i 4 ex. sedimentats junts en un conreu segat el 20-IV, darrera cita l'11-V amb 2 ex. (♂,♀) (MJJ/eBird).

Pla de Favàritx, Maó. 1 ex. el 19-IV (PIR).

Milvus milvus. Milà reial, milana (MA), milà (ME-EI-FO). Milano real. Red Kite

Estatus: reproductor i sedentari escàs (MA-ME). Hivernant escàs (MA), i rar (CA). Migrant rar (MA-EI-FO-CA). Accidental (DR).

Selecció: reproducció, fenologia.

Mallorca: Hivernada. La població hivernant en el cens del 13-I a 15 dormidors va ser de **435** aus registrades (GOBM), és un descens per primera vegada des del 2020, però per sobre de mitjana (X= 304 ex., n = 11) (N. de l'ed.).

Reproducció. S'ha fet una estima en aquest període donant un nombre mínim de 141 parelles reproductores. Els primers nius ocupats són de 4-III, els primers adults covant s'observaren el 5-IV, els primers polls amb plomissó blanc (0-10 dies) el 26-IV, els primers polls de 30-40 dies (totalment emplomallats) són de 15-VI. Enguany s'han prospectat principalment la zona Migjorn i Llevant, tot i que s'han prospectat altres municipis de l'illa. S'han prospectat un

total de 185 nius/territoris i el mínim de colles que han reallitzat posta ha estat de 49, de les quals 47 amb reproducció i presència de polls. Amb un mínim de **84** polls (MMA, Servei de Protecció d'Espècies i Servei Agents de Medi Ambient -Direcció General de Medi Natural i Gestió Forestal - Conselleria Agricultura, Pesca i Medi Natural; ZMR, SEO/BirdLife).

Amb aquesta petita mostra d'un èxit reproductiu d'1,71 (polls volats/nius posta) i una taxa de vol d'1,78 (polls volats/parelles èxit) (N. de l'ed.).

Pas prenupcial, S'han vist en pas actiu cap al N, **5** exemplars des del 16-III fins al 24-IV. Màxims diaris a la localitat de la talaia d'Albercutx i Formentor (Pollença) (GORA), costa Banyalbufar (BAU)^A.

Dates	16-III	14-IV	21-IV	24-IV
Albercutx	2	1 ^A	1	1

Pas postnupcial, s'han vist en pas **9** ex. entre la primera cita el 27-IX (1 ex.) i darrera el 5-X (8 ex.) al cap de ses Salines (Santanyí) (GORA).

Pla de Vilafranca. 24 ex. dels quals 16 posats, amb corbs, gairebé tots joves de l'any el 4-X (RES/eBird).

Centre de Recuperació de Fauna Silvestre. Ingressats **47** ex. per diverses causes: electrocució (5), caiguda a safareig (6), col·lisió amb avió (10), atropellament (2), desnutrició (3), tir (2), trauma desconegut (3), causes desconegudes (10), intoxicació (4), volanton (1), i trampejat (1). Posteriorment alliberats 7 ex. i romanen en recuperació (1) (CO-FIB, Conselleria d'Agricultura, Pesca i Medi Natural).

Dragonera: 1 ex. el 2-II i 4 ex. el 4-IV (JMO/Observation).

Menorca: Reproducció. La població reproductora per un mínim de 73 parelles territorials, i un total de **117** polls. Es considera que la població en aquest darrer any es manté estable respecte als anys anteriors que s'ha mantingut al voltant de les 70 parelles territorials, tot i que és probable que no s'hagin detectat totes les colles presents a l'illa degut a l'increment de la població (PAB. Consell Insular de Menorca / Reserva de la Biosfera).

Milvus migrans. Milà negre, milana negra (MA-EI). Milano negro. Black Kite

Estatus: estival no reproductor rar (ME). Hivernant rar (MA-ME-CA). Migrant escàs (MA-EI-DR) i rar (ME-FO-CA).

Selecció: fenologia.

Mallorca: Hivernada. El 6-II amb 1 ex. a Son Real (Santa Margalida) (BOT/Observation), i el 22-II (1 ex.) a Ariant (Pollença) (GON).

Pas prenupcial, s'han vist en pas actiu cap al N **39** ex. des del 18-III fins al 16-VI, sent les de juny molt tardanes. A les localitats: Talaia d'Albercutx i Formentor (Pollença) (GORA)^A (HKS^L/Observation), s'Albufera (RES, VIC, PNAM)^B (VDB)^P, Cala Llamp (Andratx) (VEN)^C, Embassament del Gorg Blau (BSF^D/Observation), Llubí (VHT/Observation)^F (GVR/Observation)^R, Capdepera (VHT/Observation)^G, Alcúdia (VDT/Observation)^H, Costitx (VEN)^J, Embassament de Cúber (BNG/Observation), Blanquer de Maria (DRS^M/Observation), Marina de Llucmajor (SUA)^N, Màxims diaris.

Dates <i>M. migrans</i>	18-III	23-III	6-IV	7-IV	8-IV	9-IV	13-IV	17-IV	21-IV	23-IV	24-IV	27-IV	28-IV
Exemplars	3 ^C	2 ^A	2 ^B	1 ^D	10^F	1 ^G	1 ^A	1 ^H , 1 ^J	2 ^A	1 ^K	1 ^A	3 ^A	1 ^L

Dates	1-V	4-V	16-V	21-V	8-VI	16-VI
Ex.	2 ^A	3 ^A	1 ^B	1 ^M	1 ^N	1 ^{P, R}

Pas postnupcial, s'han vist en pas actiu cap al S, **19** ex. des del 28-VII fins al 17-XI, sent les de novembre molt tardanes. A les localitats: Cap de ses Salines (GORA)^A (SCH/Observation)^J, s'Albufera (RES, VIC, PNAM)^B, Son Ferriol (DBB/Observation)^C, es Vidriers i na Maïans (Capdepera)(GMR/eBird)^D, Son Pax (Palma)(MMA)^E, sa Marina Gran (Santanyí) (RES/eBird)^F (MAC-CST/eBird)^G (MON)^K, finca Galatzó (MUN, SOL)^H, Palma (BUS)^L. Màxims diaris.

Dates <i>M. migrans</i>	27-VII	28-VII	28-VIII	13-IX	15-IX	21-IX	23-IX	24-IX	27-IX	13-X	19-X	17-XI
Exemplars	1	2	1+1	1+1	1	1	1	1	3	2	1	1+1
Localitat	C	A	D	A+E	F	G	B	F	A	H	J	K+L

Dragonera: prenupcial, el 4-V amb 1 ex. (JMO/Observation).

Menorca: Pas prenupcial, primera cita el 17-III amb 1 ex. al cap de Cavalleria (es Mercadal) (CAU). Darrers registres el 8-VI amb 2 ex. a Alaïor (CLF), i el 21-V amb 2 ex. en vol a Punta Nati (Ciutadella) (OVV/Observation).

Pas postnupcial, primer registre el 10-VII amb 1 ex. a Son Quart (Ciutadella) (VLN). Darrers registres el 16-IX amb 1 ex. volant cap al S a es Pla Verd (MAC/eBird), i el 5-IX amb 1 adult amb coloració general més fosca, tot i que pit

d'un to rogenc, cap gris i finestres alars no massa clares, cua quasi gens forçada, i fins i tot recta quan feia maniobres amb vol baix, he percebut 6 dits a les ales, a ses basses de Lluriac (es Mercadal) (ALL/eBird).

Eivissa: Pas prenupcial, primera cita el 14-IV amb 1 ex. a Sant Agustí des Vedrà (Sant Josep) (YAR). Darrera el 9-VI amb 1 ex. a Buscastell (SDW/Observation).

Pas postnupcial, el 5-IX amb 1 ex. a Sant Joan (RTR/Observation), i el 21-IX amb 5 ex. a s'Aumanguena (Sant Joan) (ESR).

Haliaeetus albicilla. Àguila marina. Pigargo. White-tailed Eagle

Estatus: accidental (MA). **Selecció:** tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Buteo buteo. Aligot. Ratonero común. Common Buzzard

Estatus: reproductor i sedentari escàs (MA). Hivernant escàs (ME) i rar (MA-EI-FO-DR). Migrant escàs, i rar (CA-DR).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: Santa Maria. 1 ex. el 13-III (BUS).

Bendinat, Calvià. 1 ex. el 6-IV (BAZ).

Sa Figuereta, Marina de Lluçmajor. 1 ex. el 19-IV (VIC).

Pas prenupcial, s'han vist en pas actiu cap al N 1 ex. sobre el mar el 1-V en Punta de n'Amer (Sant Llorenç) (HKS/Observation).

Pas postnupcial, Cap de ses Salines, Santanyí. S'ha vist en pas actiu cap al S, 1 ex. l'11-IX (GORA).

Felanitx. 1 ex. l'11-IX (JMO/Observation).

Pla de Vilafranca. 1 ex. el 14-IX (BAZ).

Centre de Recuperació de Fauna Silvestre, Ingressat mort 1 ex. amb traumatisme desconegut el 31-XII, procedent de Porreres (COFIB, Conselleria d'Agricultura, Pesca i Medi Natural).

Tyto alba. Òliba, olivassa (FO). Lechuza común. Western Barn Owl

Estatus: reproductor i sedentari moderat, i rar (CA-DR).

Selecció: reproducció i dades d'interès.

Mallorca: Reproducció, primers polls encara amb plomissol el 8-VI i darrer el 19-VI, $n = 2$ _{polls} ($X_{\text{polls}} = 4,1$ $n = 11$ _{anys}) (COFIB, Conselleria d'Agricultura, Pesca i Medi Natural).

Cabrera: 1 ex. el 17-I (VIC).

Athene noctua. Miula. Mochuelo. Little Owl

Estatus: hivernant rar (MA-ME-EI). Migrant escàs (EI). Accidental (FO). Cria esporàdica el 1973, 75 i 83 a (MA), i (ME). Falta informació. **Selecció:** tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Otus scops. Mussol. Autillo. Eurasian Scops Owl

Estatus: reproductor i sedentari abundant (MA-EI) i moderat (ME). Cria esporàdica el 2001 i 02 (FO). Hivernant moderat (ME), escàs (MA-EI-FO), i rar (CA-DR). Migrant moderat (ME), i escàs (MA-FO-DR).

Selecció: reproducció, subespècies, i dades d'interès.

Mallorca: primers cants, l'11-II amb 2 ex. al polígon de Pollença (PXL/eBird).

Reproducció, fent cants territorials el 13-II a Marratxi. Dos adults entrant a un niu a un forat d'una paret d'una porxada el 5-VI Son Pizà (Marratxí) (FIO).

Dades de reproducció, primers polls encara amb plomissol el 29-V i darrer el 22-VII, $n = 36$ (COFIB, Conselleria d'Agricultura, Pesca i Medi Natural). L'entrada de polls es manté per sobre de la mitjana que és de $X = 34,9$ _{polls}, $n = 10$ _{anys} (LOP). Finca Galatzó, Calvià. Abundància al llarg del camí de pujada de l'aparcament al dipòsit d'aigua antiincendis. És comptabilitzen un mínim de 7 ex. cantant en un trajecte d'1,90 km (IKA= 3,68 indiv/km) i una durada de 55 minuts el 29-V (SOL/eBird).

Dragonera: 1 ex. el 2-II (JMO/Observation).

Menorca: Platja de Son Xoriguer, Ciutadella. 1 jove a una palmera d'atileria (*Phoenix dactylifera*) el 15-VII (ARS/Observation).

Asio otus. Mussol banyut, mussol reial (MA-ME-EI). Búho chico. Long-eared Owl

Estatus: reproductor i sedentari moderat (MA-FO) escàs (EI), i rar (ME). Migrant escàs (MA-ME), i rar (CA). Hivernant rar (CA). Accidental (DR).

Selecció: reproducció i dades d'interès.

Mallorca: primers cants el 21-II a Llucmajor (BAC, GRD).

Palma. Gravat el so d'1 juvenil a Son Busquets des del 19 al 23-III (AMG; BAC, GRD, MUT).

Dades de reproducció, primers polls encara amb plomissol el 3-IV i darrer el 18-VI, $n = 19$ _{polls} (COFIB, Conselleria d'Agricultura, Pesca i Medi Natural). L'entrada de polls es manté per sobre de la mitjana que és de $X = 15,3$ ($n = 10$ _{anys}) (LOP).

S'Albufera. 1 ex. cantant el 4-IV (RES, VIC, PNAM).

Clossos Can Gaià, Portocolom. 2 polls volanders reclamant el 17-IV (MTA/eBird).

Serral de ses Monges, Inca. Gravat el reclam de polls en niu el 20-IV (RES/NFC).

Golf de Son Quint, Palma. Se senten 2 joves mendicant el 8-V (MAC/eBird).

Sant Llorenç. 2 joves reclamant el 21-V a un conreu per sa Coma (EKK/Observation).

Menorca: Es Mercadal, 1 ex. el 5-VIII (COL).

Asio flammeus. Mussol emigrant. Lechuza campestre. Short-eared Owl
Estatus: hivernant escàs (ME), i rar (MA-CA). Migrant escàs (MA-ME-EI-FO), i rar (CA). Cria esporàdica el 1976 (MA).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: Pas prenupcial, primers registres el 15-II a s'Albufera (1 ex.) (RES, VIC, PNAM), el 24-III amb 1 ex. entrant des de la mar al cap de ses Salines (Santanyí) (BEN-MAC/eBird), el 18-IV amb 1 ex. xop refugiat a la part baixa d'un tamariu sec a s'Albufera (RES/eBird).

Darrers el 20-V (1 ex.) a s'Albufera (RES, VIC, PNAM), i el 22-IV amb 1 ex. en vol a l'Albufereta (EVR/eBird).

Hivernada, el 16-XII amb 1 ex. arribant als conreus de sa Barrala (Campos) (RES/eBird).

Aire: (Sant Lluís). 1 ex. és atacat per unes gavines el 9-IV (CRV/eBird).

Upupa epops. Puput. Abubilla. Eurasian Hoopoe

Estatus: reproductor i sedentari abundant (MA), moderat (ME-EI), escàs (FO), i rar (CA). Hivernant escàs (MA), i rar (DR). Migrant moderat (ME-EI), i escàs (MA-CA-DR).

Selecció: reproducció i fenologia.

Mallorca: Reproducció. Niu a un forat d'una soca d'ametler, a poc més d'1,20 m d'alçada, d'on veig sortir un adult i a dins hi ha almenys 3 pollets d'una setmana aproximadament el 12-II a prop de l'Hospital de Son Llätzer (Palma) (FIO).

Prat de Sant Jordi, Palma. 1 jove el 20-III (JMO/Observation).

Port Pollença. 1 ex. transportant menjar o excrements el 22-III (LNS-PHP/Observation).

Alcúdia. Niu ocupat amb polls a un conreu el 23-III (KRG/Observation).

Albufereta, Alcúdia. 1 ex. transportant menjar o excrements el 28-III (KRG/Observation).

Palma. 1 ex. en vol amb menjar al bec a una zona enjardinada de la Soledad sud el 2-IV (SAS).

Parc dels Pins, Port de Pollença. Una parella amb 2 joves el 5-V (VAS/eBird).

Cabrera: Prenupcial, el 30-IV amb 2 ex. (JMO/Observation).

Hivernada, 1 ex. el 3-XII (JMO/Observation).

Dragonera: Prenupcial, el 3-IV amb 1 ex. i el 18-IV (1 ex.) (JMO/Observation).

Eivissa: primers polls a partir del 16-V a sa Carroca (Sant Josep) (SEP/eBird).

***Coracias garrulus*.** Gaig blau. Carraca. European Roller

Estatus: migrant escàs (ME) i rar (MA-EI-FO-CA-DR).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: Presència hivernal, el 18-I amb 1 ex. en uns camps darrere de la Reserva de l'Albufereta (RES/eBird). Primera cita hivernal a Balears (N. de l'ed.).

Pas prenupcial, primeres cites el 22-IV (1 ex.) a l'Albufereta (RES, VIC, RNSA; EVR/eBird), el 25-IV (1 ex.) a Mortitx (Escorca) (TOM/eBird), i el 26-IV (1 ex.) a Can Cullerassa (Pollença) (MAC-LRN/eBird).

Darrers registres el 21-V amb 1 adult a Son Real (Santa Margalida) (DRS/Observation), el 15-V (1 ex.) a Santanyí (AMG), i el 12-V a s'Albufera (1 ex.) i al pla de Vilafranca (1 ex.) (BXT-TOM/eBird).

Un màxim de 5 ex. posades en cables el 28-IV a Can Cullerassa (BEN-MAC-CST/eBird).

Pas postnupcial, només dues cites el 28-VIII amb 1 ex. a Son Hortolà i un altre a Galatzó (Calvià) (DGZ/eBird).

Menorca: Pas prenupcial, primeres cites el 7-IV amb 1 adult a es Mercadal (BLD/Observation), el 18-IV amb 1 ex. al camí de Tramuntana (es Mercadal), i el 23-IV amb 1 ex. a la ctra. de Fornells (es Mercadal) (PIR).

Darrers registres, el 4-VI amb 1 ex. a la ctra. de Canutells (Maó) (PIR), el 28-V amb 1 ex. posat a un cable a la ctra. d'es Mercadal- Fornells (MJJ/eBird), i l'11-V amb 1 ex. a na Beatles des Pou (es Mercadal) (CAU).

Pas postnupcial, només dues cites el 10-IX amb 1 ex. perxat en estesa elèctrica a la ctra. d'Artrutx (MJJ/eBird), i el 8-IX amb 1 jove al camí de Tramuntana (es Mercadal) (PIR).

Eivissa: Pas prenupcial, 1 ex. el 28 i 29-IV a ses Salines (Sant Josep) (SDW/eBird; YAR).

***Alcedo atthis*.** Arner, blauet (EI). Martín pescador. Common Kingfisher

Estatus: hivernant escàs, i rar (CA-DR). Migrant moderat (MA), escàs (ME-EI-FO), i rar (CA-DR).

Selecció: fenologia i dades d'interès.

Mallorca: Pas prenupcial, darreres cites el 17-IV (1 ex.) a l'Albufereta, el 20-III (1 ex.) a s'Albufera (RES, VIC, RNSA, PNAM), i el 15-III (1 ex.) al prat de Sant Jordi (Palma) (GLT).

Pas postnupcial, primers registres, el 25-VII (1 ex.) a s'Albufera, el 30-VII a l'Albufereta amb un 1 ex. al torrent (RES, VIC, PNAM, RNSA), i el 8-VIII (1 ex.) a Portopetro (Santanyí) (MON).

Dragonera: postnupcial, 1 ex. el 15-IX (JMO/Observation).

Menorca: Albufera des Grau, Maó. Màxims mensuals (PNAG).

Salines d'Addaia-Mongofre, es Mercadal-Maó. Màxims mensuals (PNAG).

<i>A. atthis</i>	13-I	15-II	14-III	10-IV	10-V	13-VI	11-VII	14-VIII	12-IX	9-X	14-XI	17-XII
Dates												
Albufera	2	1	0	0	0	0	0	0	1	3	1	2
Addaia-Mongo.	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1
Dates	13-I	14-II	13-III	11-IV	10-V	12-VI	10-VII	13-VIII	11-IX	10-X	13-XI	16-XII

Arenal d'en Castell, es Mercadal. 1 ex. el 25-VII (CAU).

Eivissa: Postnupcial, primer registre el 22-X amb 1 adult a ses Salines (Sant Josep) (ODS/Observation).

Formentera: hivernada, darrer registre l'11-II amb 1 ex. al camí des Brolls (MAR).

***Merops persicus*.** Abellerol gola-roig. Abejaruco papirrojo. Blue-cheeked Bee-eater

Estatus: accidental (MA-CA). **Selecció:** tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

***Merops apiaster*.** Abellerol. Abejaruco común. European Bee-eater

Estatus: reproductor moderat (ME) i escàs (MA-EI). Migrant abundant (MA), moderat (ME-EI-FO-CA) i escàs (DR).

Selecció: reproducció i fenologia.

Mallorca: Pas prenupcial, primeres cites el 6-IV amb 30 ex. a Costitx (VEN), el 14-IV (13 ex.) a Esporles (BAU), i el 15-IV (22 ex.) a Santanyí (RJN/Observation).

Darrers registres el 6-VI (sentit) a Ariant (Pollença) (GON), el 2-VI (6 ex.) a l'Albufereta (RES, VIC, RNSA), i el 21-V (12 ex.) al Salobrar de Campos (BAU).

Pas postnupcial. Primeres cites el 5-IX (22 ex.) a Lluc (Escorca) (GON), el 6-IX a Esporles (45 ex.)(BAU) i a Felanitx (1 ex.) (JMO/Observation), i el 7-IX sentit sobrevolant Valldemossa (GON).

Darrers registres el 29-IX amb una estima de **150** ex. (Primer grup a les 07:27 h, segon grup a les 07:46 h, aquest segon grup s'observa amb prismàtics i està compost per 70 aus, el primer era una mica més gran per intensitat i nombre de reclams, surten tots dos grups al mar) al cap de ses Salines (camps interiors) (RES/NFC). El 28-IX (80 ex.) al canal de Cabrera (MON), el 15-IX (22 ex.) a l'Albufereta (RES, VIC, RNSA).

- Menorca:** Golf de Son Parc, es Mercadal. 5 ex. el 26-IV (PIR).
Llucmaçanes, Maó. 34 ex. el 23-IX (GRI).
- Eivissa:** Prenupcial, primeres cites el 17-III (escollat) a cala Sant Vicenç (Sant Joan) (MAR), i el 3-IV amb 16 ex. a la costa de Portinatx (Sant Joan). Un màxim de 57 ex. el 5-V a ses Salines (Sant Josep) (SDW/Observation).
Postnupcial, darrers registres el 25-IX amb 1 ex. a un conreu de Can Guerxo (Sant Josep) (VDM/Observation), i el 12-IX amb 25 ex. al pla d'Aubarca (Sant Antoni). Un màxim de 35 ex. al N de Sant Joan el 10-IX (RTR/Observation).

Jynx torquilla. Formiguer. llenguerut (MA), formiguerol (ME), llengut (EI). Torcecuello. Eurasian Wryneck

Estatus: reproductor i sedentari abundant (MA), moderat (EI). Re-productor rar (ME-FO). Hivernant moderat (MA-EI), escàs (ME-FO), i rar (CA). Migrant moderat, i escàs (CA-DR).

Selecció: reproducció, i fenologia.

Mallorca: sentits els primers mascles cantant el 7-III (4 ex.) a Galatzó (Calvià) (HIN/eBird), i el 14-III (1 ex.) a Felanitx (JMO/Observation).

Alcanada, Alcúdia. 4 polls de 12-14 dies d'edat dins una caixa niu el 8-VII (FIO).

Cabrera: Hivernada, 1 ex. el 3-XII (JMO/Observation).

Dragonera: Pas postnupcial, 1 ex. el 18-IX (JMO/Observation).

Menorca: Ses Quarterades, Alaïor. 1 ex. el 24-IV (CAU).

Hort des Lluïsser, Alaïor. 1 ex. el 3-IX (CAU, VLN) i el 27-IX (VLN).

Llucmaçanes, Maó. 1 ex. el 23-IX (GRI).

Dryobates minor (abans *Dendrocopos minor*). Picot menut. Pico menor. Lesser Spotted Woodpecker

Estatus: accidental (MA). **Selecció:** tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Dendrocopos major. Picot gros. Pico picapinos. Great Spotted Woodpecker

Estatus: accidental (MA-FO). **Selecció:** tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Picus sharpei (abans *Picus viridis*). Picot verd. Pito ibérico. Iberian Green Woodpecker

Estatus: accidental (MA). **Selecció:** tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

***Falco naumanni*.** Xoriguer petit, xòric petit (ME). Cernícalo primilla. Lesser Kestrel

Estatus: migrant rar. Cria esporàdica 2020 i 21 (MA). Falta informació. Extingit com a reproductor (ME).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: Reproducció. Maria de la Salut, enguany hi ha **1** niu ocupat. Primera observació en la zona de cria el 21-III amb 1 parella (RES/eBird), i darrera el 29-IX (2 ex.) (MAC-CST/eBird). Observació de còpules a partir del 21-IV (RRS), i femella amb 2 volanders en un arbre el 2-VI (RES/eBird). Un màxim de 7 ex. el 28-IV (a la zona de cria només 2 mascles adults) (RES/eBird).

Pla de Vilafranca, Primera observació en la zona de cria el 25-III amb 1 mascle (MTA/eBird), i darrera el 28-IX amb 4 ex. (MAC-CST/eBird). Uns màxims de: 16 ex. alimentant-se en un camp de crucíferes amb diversos xoriguers comuns molt a prop el 26-III (RES/eBird); un grup posat al camp darrere de la depuradora amb 6 mascles i 12 femelles el 29-IV (NIC/eBird); i 21 ex. posados el 30-IV (BEN/eBird). Almenys **1** niu ocupat amb polls el 26-IV (JMO/Observation). És la segona vegada que se'n comprova la cria en aquesta localitat (LOP).

Pas prenupcial, s'han vist 5 ex. des del 20-III fins al 19-VI. Màxims diaris a les localitats: vall de Bóquer (PSM/Observation)^A, torrent de na Borges (HKS/Observation)^B, Can Cullerassa (Pollença) (GRP/Observation)^C, s'Albufera (VDG/Observation)^D, Son Serra (Santa Margalida) (BLB/Observation).

Prenupcial <i>F. naumanni</i>	20-III	19-IV	1-V	18-V	19-VI
Exemplars	1♂	1	1	1	1
Localitats	A	E	B	C	D

Pas postnupcial, s'han vist 1 ex. el 8-X al camí de Llenaire (Pollença) (TOM/eBird).

Menorca: Camí de Cavalleria, es Mercadal. 1 ex. el 12-IV (PIR).

***Falco tinnunculus*.** Xoriguer, xòric (ME). Cernícalo. Common Kestrel

Estatus: reproductor i sedentari abundant (MA) i moderat (ME-EI-FO). Hivernant moderat (ME), i escàs (MA-EI). Migrant moderat (MA-ME), i escàs (CA). Accidental (DR).

Selecció: reproducció i dades d'interès.

Mallorca: s'Albufera. S'estima que hi han criat **3** parelles. Primers nius a partir de l'1-IV, i joves del 5-VI (RES, VIC, PNAM). RN de l'Albufereta. S'estima que hi han criat **2** parelles. Observació de joves a partir del 30-VII (RES, VIC, RNSA).

Pas prenupcial, talaia d'Albercutx i Formentor (Pollença).
S'han vist en pas actiu cap al N **25** exemplars des del 23-III fins al 12-V. Màxims diaris (GORA).

Dates <i>F. tinnunculus</i>	23-III	19-IV	20-IV	21-IV	27-IV	1-V	4-V	12-V
Albercutx	4	4	6	4	1	1	3	2

Dades de reproducció, primers polls encara amb plomissol el 26-V i darrer el 31-VII, $n = 58$ ^{polls} (COFIB, Conselleria d'Agricultura, Pesca i Medi Natural). Un any amb forta disminució d'entrada de polls, encara que està a prop de la $X_{\text{polls}} = 61,1$ $n = 7$ ^{anys} (LOP).

Estany de ses Gambes, Santanyí. 13 ex. entre ells 2 polls vo-landers damunt una tallada alimentats pels adults el 20-VI (MUN, SOL).

Pas postnupcial, cap de ses Salines, Santanyí. S'han vist en pas actiu cap al S, **129** ex. des del 4-VIII fins al 16-X. Màxims diaris (GORA) (JMO/Observation a els Escars (ses Salines).

Dates <i>F. tinnunculus</i>	4-VIII	14-IX	21-IX	29-IX	5-X	6-X	7-X	12-X	13-X	16-IX	2-X	9-X	10-X	12-X
Cap Salines	4	1	2	3	17	53	1	12	3 ^A	33				

Cabrera: Hivernada, 1 ex. el 18-I i **1** parella (♂ ♀) el 23-I (VIC).

Dragonera: pas prenupcial, 1 ex. el 4-IV (JMO/Observation).

Pas postnupcial, 2 ex. el 18-IX (JMO/Observation).

Menorca: Ciutadella. 2 adults a un niu amb pol·ls el al Museu Diocesà 10-VI (VDR/Observation).

***Falco vespertinus*.** Falcó cama-roig, xoric cama-roig (ME). Cernícalo patirrojo. Red-footed Falcon

Estatus: migrant escàs (MA-ME-EI) i rar (FO-CA).

Selecció: tots els registres rebuts. Sobre tot en pas prenupcial.

Mallorca: pas prenupcial, s'han vist **23** ex. del 24-III fins al 4-VI. Màxims diaris a les localitats de: talaia d'Albercutx (Pollença) (GORA)^A, s'Albufera (RES, VIC, PNAM)^B, Albufereta (RES, VIC, RNSA)^C (CRH/eBird)^F, Binissalem (SAS)^D, Costitx (VEN)^E, pla de Vilafranca (TSL/Observation)^G, es Blanquer de Maria (PEO-VAS/eBird)^H,

Prenupcial <i>F. vespertinus</i>	24-III	18-IV	21-IV	22-IV	25-IV	26-IV	27-IV	30-IV	11-V	21-V	4-VI
Exemplars	1♀	1♂, 1♀	1♀	2♀	1	6	2♂, 3♀	1	1	2	1♂
Localitats	D	E	B	C	F	G	H	C	B	A	C

Pas postnupcial, present 1 ex. des del 26 al 29-IX al pla de Vilafranca (BAZ-MAC- CST/eBird).

Menorca: pas prenupcial, primera cita el 14-IV amb 1 ex. a cala Rotja (es Mercadal) (BCH/eBird), el 20-IV amb 5 ex. (4♂,1♀) perxats junts a una estesa elèctrica al camí de Tramuntana (es Mercadal) (MJJ/eBird), i 1 parella el 26-IV al camí de Tramuntana (es Mercadal) (FRX/eBird).

Pas postnupcial, 1 juvenil el 4-XI a ses Arenetes de Dalt (Ciutadella)(CAO).

Falco eleonora. Falcó marí, falcó torter (EI). Halcón de Eleonor. Eleonora's Falcon

Estatus: reproductor moderat (MA-EI-CA-DR). Migrant escàs (ME-FO).

Selecció: reproducció, fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: primeres arribades, el 28-IV (1 ex.) al far de Formentor (Pollença) (BAZ, PAM), i el 4-V (8 ex.) a la talaia d'Albercutx (Pollença) (BEN-MAC-GRP/eBird). Un màxim de **50** ex. a Can Bauma (Alcúdia) el 7-VI (21:00 h) (CLF).

Pas postnupcial, darreres cites el 2-XI (1 ex.) al cap de Formentor (RMY/Observation), el 16-X (1 ex.) a Esporles (BAU), i el 15-X amb 1 ex. al cap de ses Salines (JMO/Observation).

Cabrera: Prenupcial, primera cita el 26-IV amb 1 ex. (TSL/Observation).

Dragonera: (Andratx). Primera arribada el 22-IV amb 2 ex. (JMO/Observation), i darrera cita el 12-X amb 7 ex. (GLT).

Menorca: Punta Nati, Ciutadella. 1 ex. el 9-IX (CRT).

Sa Punta Roja, Ciutadella. 1 ex. el 10-IX (CRT).

Cap de Cavalleria, es Mercadal. 1 ex. fase fosca l'11-X (COL).

Eivissa: Prenupcial, primera cita el 26-IV amb 1 ex. al cap Llentrisca (SDW/Observation). Darrera el 28-X amb 1 ex. a Sant Josep (BKX/Observation).

Es Vedrà: (Sant Josep). Prenupcial, primera cita el 24-IV amb 10 ex. (SEP, RMS).

Falco columbarius. Esmerla. Esmerejón. Merlin

Estatus: hivernant i migrant rar.

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: Hivernada. 1 ex. el 7-I, i 2 ex. el 18-XII a s'Albufera (RES, VIC, PNAM).

Pas prenupcial, 1 mascle el 6 i 14-III, i 1 ex. el 6-7-IV a s'Albufera (RES, VIC, PNAM). El 30-III amb 1 ex. volant cap al N al cap de Formentera (KRG/Observation).

Pas postnupcial, s'han vist en migració **2** ex. el 27-IX (1 ex.) i el 14-XI (1 ex.) al cap de ses Salines (GORA) i a sa Barrala (BAU) respectivament.

Eivissa: Pas prenupcial, 1 mascle el 2-IV a la depuradora (Sant Josep) (PRG) i el 6-IV a ses Salines (Sant Josep) (SDW/Observation).

Falco subbuteo. Falconet. Alcotán. Eurasian Hobby

Estatus: Migrant escàs (MA-ME) i rar (EI-FO-CA-DR). Cria esporàdica el 1988, 89 i 90 (MA), i 2003 (ME).

Selecció: fenologia i tots els registres a EI-FO.

Mallorca: pas prenupcial, s'han vist en migració **18** ex. des del 19-IV fins al 12-V. Màxims diaris a les localitats de: Talaia d'Albercutx (GORA)^A, s'Albufera (RES, VIC, PNAM)^B, Son Serra (Santa Margalida) (BLB/Observation)^C.

Dates Prenupcial	19-IV	20-IV	21-IV	22-IV	24-IV	27-IV	4-V	12-V
Exemplars	1	2	9	1	2	1	1	1
Localitats	C	A	A	B	A	A	A	B

Pas postnupcial, s'han vist **6** ex. des del 2-X fins al 9-X. Màxims diaris a les localitats de cap de ses Salines (Santanyí) (GORA)^A, Felanitx (JMO/Observation)^B, Santanyí (AMG)^C.

Dates <i>F. subbuteo</i>	2-X	5-X	6-X	9-X
Exemplars	2	1	2	1
Localitats	B	A	A	C

Centre de Recuperació de Fauna Silvestre, ingressat 1 ex. amb traumatisme desconegut l'1-VI, procedent de Llucmajor, posteriorment mor (COFIB, Conselleria d'Agricultura, Pesca i Medi Natural).

Menorca: Sant Lluís. 1 ex. el 23-IV (BLB/Observation).

Eivissa: Pas prenupcial, 1 ex. el 28-V a s'Aumanguena (Sant Joan) (ESR), i el 15-VI (1 ex.) a ses Salines (Sant Josep) (VZZ/eBird).

Falco biarmicus. Falcó llaner. Halcón borní. Lanner Falcon

Estatus: accidental (MA-ME).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: Blanquer de Maria de la Salut. **1** jove, el 14 d'abril.

Per a més informació d'aquest registre homologat, vegeu l'informe del Comitè de Rareses de Balears.

Falco cherrug. Falcó sagrat. Halcón sacre. Saker Falcon

Estatus: accidental (ME). **Selecció:** tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Falco peregrinus bookei. Falcó, falcó reial (EI). Halcón peregrino. Peregrine Falcon

Estatus: reproductor i sedentari moderat (MA), escàs (ME-EI-FO-CA), i rar (DR). Hivernant escàs (EI) i rar (MA).

Selecció: reproducció i dades d'interès.

Mallorca: Reproducció, observació de joves a partir del 16-VI a Capdepera (ART), el 20-VI a s'Avall (MUN, SOL), el 30-VI al golf de Son Quint (Palma) (MAC/eBird), i l'11-VII a s'Albufera (RES, VIC, PNAM).

Cap Blanc, Lluçmajor. Presumptament 2 parelles el 22-II (SOL-BEN/eBird).

Talaia d'Albercutx, Pollença. 1 parella local el 16-III (BEN-HIN-LOP/eBird).

Cap de Cala Figuera, Calvià. 2 ex. capturen un ropit que entra des del mar el 22-III (BEN/eBird).

Castell d'Alaró. Adult entrant a niu amb polls volanders el 18-VI (FIO).

Cabrera: 4 ex. barallant-se tot el temps el 25-X (RES/eBird).

Dragonera: 2 ex. el 21-IV (DPT/Observation).

Menorca: Biniarroi, Alaior. 2 ex. copulant el 8-III (PIR).

Formentera: Cap de Barbaria, 2 ex. l'1-IV (MTF/Observation).

La Mola, 1 ex. el 23-VI (MUN), i 4 ex. al far el 30-XI (SEP/eBird).

***Myiopsitta monachus*.** Cotorra de cap gris. Cotorra argentina. Monk Parakeet

Estatus: reproductor i sedentari escàs (EI). Cria esporàdica (MA, ME).

Selecció: reproducció.

Mallorca: Palma. 1 ex. vist volant entre copes d'arbres a l'av. d'Antoni Maura el 23-VII (TSK/eBird).

A causa del seu potencial colonitzador i perquè constitueix una amenaça greu per a les espècies autòctones, els hàbitats o els ecosistemes, aquesta espècie va ser inclosa al Catàleg Espanyol d'Espècies Exòtiques Invasores, aprovat pel Reial decret 630/2013.

***Psittacula krameri*.** Cotorra de Kramer. Rose-ringed Parakeet

Estatus: reproductor i sedentari escàs (MA-EI). **Selecció:** reproducció.

Cap registre rebut.

***Oriolus oriolus*.** Oriol, pardal cirer (EI). Oropéndola. Eurasian Golden Oriole

Estatus: migrant escàs. Cria esporàdica el 1978 (MA).

Selecció: fenologia.

Mallorca: Pas prenupcial, primers registres el 23-IV amb 2 ex. cantant a l'Albufereta (HBK-GSR-DPR/Observation), el 27-IV amb 1 femella a Mortitx (Escorca) (SER), i el 28-IV amb 2 ex. a Cases Velles de Formentor (GORA) i la punta de n'Amer (Sant Llorenç) (TSL/Observation). Un màxim d'un grup de 9 ex. que es mou per les copes dels pins cridant de tant en tant a es Banc d'Eivissa (Calvià) el 29-IV (BYW/eBird).

Darrers el 4-VI amb 1 mascle cantant a Can Cullerassa (Pollença) (RES/eBird) cita molt tardana (N. de l'ed.), el 27-V amb 1 mascle cantant a s'Albufera (RES/eBird), i el 20-V amb 1 ex. cantant a Fornalutx (DRS/Observation).

Pas postnupcial, primeres cites el 5-IX (1 ex.) a l'Albufereta (RES, VIC, RNSA), i el 8-IX (2 ex.) a sa Marina Gran de Santanyí (JMO/Observation).

Darrer el 16-IX amb 1 femella a s'Albufera (RES, VIC, PNAM), i el 12-IX (1 ex.) a Ariant (Pollença) (GON).

Cabrera: Pas prenupcial, el 19-V amb 4 mascles i 1 femella (RES/eBird).
Menorca: Hort d'es Lluïsser. Alaïor. 4 ex. l'1-V (CAU) i 1 ex. el 3-IX (CAU, VLN).

Golf de Son Parc, es Mercadal. 3 ex. el 26-IV (PIR).

Punta Grossa, es Mercadal. 1 ex. el 17-VIII (CAU).

Eivissa: Pas prenupcial, Primera cita el 20-IV (1 ex.), i la darrera el 10-V (1 ex.) ambdós a Sant Joan (SDW/Observation).

Garrulus glandarius. Gaig. Arrendajo. Eurasian Jay

Estatus: accidental (MA). **Selecció:** tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Lanius meridionalis. Botxí meridional, capsigrany reial ibèric (MA-FO), capsigrany reial (ME), capsigrany gris ibèric (EI). Alcaudón real ibérico. Iberian Grey Shrike

Estatus: hivernant rar. Migrant rar.

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: Hivernada. Pla de Vilafranca. 1 ex. present des del 7-IX-2023 (DAZ-ZMR/eBird) fins al 26-I-2024 (MON). Cinquè any consecutiu que hiverna en aquesta zona (N. de l'ed.). Retorna el 6-VIII amb 1 adult (JMO/Observation) fins al 28-XI (RES/eBird).

Pas prenupcial, 1 ex. el 20-IV (RES, VIC, PNAM).

Per a més informació d'aquests registres, vegeu-ne l'informe del Comitè de Rareses de Balears.

Lanius senator. Capsigrany. Alcaudón común. Woodchat Shrike

Estatus: reproductor abundant (MA-EI) i moderat (ME-FO). Hivernant rar (MA-ME). Migrant abundant, moderat (ME-CA), i escàs (DR).

Selecció: reproducció, fenologia i subespècies.

Mallorca: Pas prenupcial, primers registres el 23-III (1 ex.) a l'Albufereta (RES, VIC, RNSA), el 26-III (1 ex.) al Salobrar de Campos (BAU), i el 29-III (1 ex.) a ca n'Eixut (Muro) (SCH/Observation).

Pas postnupcial, darreres cites, el 15-IX (1 ex.) a l'Albufereta (RES, VIC, RNSA), el 13-IX (1 ex.) a s'Albufera (BTT/Observa-

tion), i el 8-IX (2 ex.) a sa Marina Gran de Santanyí (JMO/Observation).

Menorca: Ses Coves Noves, es Mercadal. 1 ex. el 17-III (CAU).
Salines de Mongofre, es Mercadal. 1 ex. el 19-III (PIR).
Alfurí, Ciutadella. 1 ex. el 4-IV (MMA).

Eivissa: Prenupcial, primeres cites el 16-III (1 ex.) a ses Salines (GAB), i el 2-IV amb 3 ex. a Can n'Andreu (Sant Mateu) (SEP/eBird).

Postnupcial, darrer registre el 22-IX (1 ex.) a Sant Antoni (VDM/Observation).

Formentera: Prenupcial, primera observació el 3-IV amb 1 ex. a la platja des Trucadors (MTF/Observation).

Lanius senator senator. Capsigrany. Alcaudón común. Woodchat Shrike

Estatus: migrant abundant, moderat (ME-CA), i escàs (DR).

Selecció: fenologia.

Mallorca: Pas prenupcial, primera cita el 30-III (1 ex.) al cap de Formentor (Pollença) (KRG/Observation). Darrera el 3-V (1 ex.) a l'Albufereta (JMO/Observation).

Cabrera: pas prenupcial, el 19-V amb 1 mascle (RES/eBird).

Dragonera: Pas prenupcial, el 4-IV amb 1 ex. (JMO/Observation).

Eivissa: Pas prenupcial, el 3-IV (1 ex.) a Sant Joan (SDW/Observation).

Lanius senator badius. Capsigrany balear. Alcaudón común del Mediterráneo. Woodchat Shrike

Estatus: reproductor abundant (MA-EI), moderat (ME) i escàs (FO). Migrant abundant (MA-EI-FO), moderat (ME-CA), i escàs (DR).

Selecció: reproducció, fenologia.

Mallorca: Pas prenupcial, primer registre el 14-IV amb 4 ex. a la costa de Son Real (Santa Margalida) (DNL/eBird), i el 16-IV (1 ex.) a Felanitx (JMO/Observation).

Reproducció. Observació de polls a partir del 12-V a Llubí (MJS/Observation), joves el 23-V al Salobrar (LRN/eBird).

Pas postnupcial, darrera cita el 13-IX (1 jove) a s'Albufera (BTT/Observation), i el 8-IX (2 ex.) a sa Marina Gran de Santanyí (JMO/Observation).

Dragonera: Pas prenupcial, el 3-IV amb 1 ex. (JMO/Observation).

Eivissa: Primera cita el 2-IV amb 3 ex. a Can n'Andreu (Sant Mateu) (SEP/eBird). Darrer registre el 22-IX amb 1 ex. a Sant Antoni (VDM/Observation).

Reproducció, adult encebant joves el 10-VI al camí des Fornàs (GAB/eBird).

Lanius collurio. Capsigrany roig, capsigrany d'esquena roja (MA-EI-FO). Alcaudón dorsirrojo. Red-backed Shrike.

Estatus: migrant rar (MA-ME-FO-CA-DR).

Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Lanius isabellinus. Capsigrany pàl·lid. Alcaudón isabel. Isabelline Shrike

Estatus: divagant (MA). **Selecció:** tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses

Lanius minor. Trenca, capsigrany gris petit (MA), capsigrany petit (ME).

Alcaudón chico. Lesser Grey Shrike

Estatus: accidental (MA-ME). **Selecció:** tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Lanius excubitor. Botxí septentrional. Capsigrany reial (MA-ME-FO),

capsigrany gris (EI). Alcaudón real. Great Grey Shrike

Estatus: migrant rar (MA-EI-FO-CA). **Selecció:** tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Lanius nubicus. Capsigrany emmascarat. Alcaudón núbico. Masked

Shrike

Estatus: accidental (MA-CA). **Selecció:** tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Pyrhcorax pyrrhcorax. Gralla de bec vermell. Chova piquirroja.

Red-billed Chough

Estatus: hivernant rar (MA-ME-EI). **Selecció:** tots els registres rebuts.

Cap registre rebut.

Pyrhcorax graculus. Gralla de bec groc. Chova piquigualda. Alpine

Chough

Estatus: accidental (MA-EI). **Selecció:** tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Coloeus monedula (abans *Corvus monedula*). Gralla. Grajilla. Western

Jackdaw

Estatus: accidental (MA-ME-DR). **Selecció:** tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Corvus frugilegus. Graula, gralla pelada (MA-EI). Graja. Rook

Estatus: accidental (MA-ME-EI). **Selecció:** tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Corvus corone. Cornella negra, corb foraster (MA). Corneja negra. Car-

rion Crow

Estatus: accidental (MA-EI). **Selecció:** tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Corvus cornix. Cornella emmantellada. Corneja cenicienta. Hooded Crow
Estatus: accidental (MA-EI). *Selecció:* tots els registres rebuts.
 Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Corvus corax. Corb. Cuervo. Northern Raven

Estatus: reproductor i sedentari moderat (ME), escàs (MA) i rar (EI-FO). Accidental (CA-DR).

Selecció: reproducció, màxims mensuals, i a FO tots els registres.

Mallorca: Reproducció. Observació de joves a partir del 6-VI a Felanitx (3 ex.) (JMO/Observation).

Cap de ses Salines, Santanyí. Un grup de **60** ex. sortint cap a Cabrera el 4-IX a les 8:00 h (GORA).

Marina de Santanyí. Un grup de 104 ex. el 24-IX (ARR/eBird), 80 el 28-IX (MAC-GRP-CST/eBird).

Pla de Vilafranca. Un grup de 80 ex. el 29-IX (MAC-CST/eBird).

Menorca: Son Catlar, Ciutadella. 50 ex. posats entre el bestiar el 17-I (TRI).

Camí de Son Saura, Ciutadella. Un màxim de **52** ex. el 21-II (CTJ/eBird).

Canal dels Horts, Ciutadella. 18 ex. en vol el 17-III (TRI).

Cap de Cavalleria, es Mercadal. 123 ex. l'1-V (COL).

Lloc de Cavalleria, es Mercadal. 34 ex. en vol el 5-V (TRI).

Eivissa: Un màxim de 3 ex. el 17-X a sa Serra (Sant Antoni) (CAR, RSL).

Es Vedrà: (Sant Josep). 2 ex. l'11-IX (RTR/Observation).

Cyanistes caeruleus balearicus (abans *Parus caeruleus balearicus*).

Ferrerico blau. Herrerillo mallorquí. Eurasian Blue Tit

Estatus: reproductor i sedentari moderat (MA). Accidental (EI-CA-DR).
 Falta informació.

Selecció: reproducció i tots els registres rebuts (EI).

Mallorca: Reproducció. Adult sortint d'un forat a la soca d'una olivera des d'on guaita un poll volander el 14-V al camí de Muleta (Sóller) (FIO).

Sa Comuna de Bunyola. Niu a una encletxa a la roca devora el camí, amb 2 pollets avançats el 8-V (MUT).

Aire: (Sant Lluís). 1 ex. és capturat per a anellament el 13-IV. És el primer cop que aquesta espècie és citada a l'illa (AIRE).

Periparus ater (abans *Parus ater*). Ferrerico petit. Carbonero garrapinos. Coal Tit

Estatus: accidental (MA-EI). *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Parus major mallorcae. Ferrerico, primavera (ME), picaformatges (EI).
Carbonero balear. Great Tit

Estatus: reproductor i sedentari abundant (MA-EI) i moderat (ME).
Accidental (DR).

Selecció: reproducció.

Mallorca: Reproducció. Primers cants a partir del 19-I, i joves del 5-VI,
ambdós a s'Albufera (RES, VIC, PNAM).

Albufereta, Alcúdia. Una parella amb 2 polls a la zona de sa
Barcassa el 15-V(KRR/eBird).

Esporles. CitAu. Una parella alimentant 3 pollets acabats de
sortir del niu el 20-V (BAC, GRD).

Finca Galatzó, Calvià. Abundància extraordinària al llarg del
camí de pujada de l'aparcament al berenador. Es comp-
tabilitzen 26 individus al llarg d'un transecte de 2,21 km
(IKA= 11,76), duració 1:09 h (més presència a l'alzinar
dens que al pinar aclarit) el 24-III (CST/eBird).

Mortitx, Escorca. Un grup família de 8 ex. el 13-VI (TOM/
eBird).

Eivissa: Observació de joves a partir del 2-VI al torrent des Jondal
(SEP/eBird).

Remiz pendulinus. Teixidor. Pájaro moscón. Eurasian Penduline Tit

Estatus: hivernant escàs (ME) i rar (MA-EI). Migrant rar (MA).

Selecció: fenologia.

Mallorca: Basses de Magaluf, Calvià. Presència des del 17-I (3 ex.) fins
al 6-IV sentit 1 ex. (SOL-CST/eBird). Un màxim d'un grup de
5 ex. el 21-II (BEN/eBird).

S'Albufera. 2 ex. el 20-VIII (RES, VIC, PNAM).

Alaemon alaudipes. Terrola del desert. Alondra ibis. Hoopoe Lark Alaemon

Estatus: accidental (ME). *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Ammomanes cinctura. Terrola coabarrada, terrolot coabarrat (MA). Ter-
rera colinegra. Bar-tailed Lark

Estatus: accidental (MA). *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Lullula arborea. Cotoliu. Totovía. Woodlark

Estatus: accidental (MA-CA-DR). *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Alauda arvensis. Alosa, terrola, (MA), terrol·la (EI-FO). Alondra común.
Eurasian Skylark

Estatus: hivernant abundant (MA-EI), moderat (ME-FO), escàs (CA), i rar (DR). Migrant abundant (MA), moderat (ME-EI), escàs (CA-DR), i rar (FO).

Selecció: fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: hivernada, uns màxims de **525** ex. a quatre grups a sa Barrala (Campos) el 3-I (BEN-SOL/eBird), 450 ex. a Can Vairet (Calvià) el 16-I (BEN/eBird), gran entrada amb 400 ex. a es Blanquer de Maria el 13-I (RES/eBird), 334 ex. en diversos grups al pla de Vilafranca el 19-I (GRC/eBird), i 25 ex. com a mínim a un sementer de Son Sales (Marratxi) el 28-I (GON). Uns màxims quant retornen de 225 ex. a sa Barrala (Campos) el 28-XI, 175 ex. en diversos grups a es Blanquer de Maria el 24-XI, i 150 ex. en diversos grups al pla de Vilafranca el 15-XI (RES/eBird).

Pas prenupcial, darreres cites l'1-IV sentit 1 ex. a son Bosc (NIC/eBird; SCH/Observation), el 26-III sentit 1 ex. en vol a es Blanquer de Maria (RES/eBird), i el 26-III (1 ex.) al cap de ses Salines (PSM/Observation).

Pas postnupcial, primers registres el 28-IX (2 ex.) al pla de Vilafranca (GRP-MAC-CST/eBird), el 30-IX (1 ex.) a l'aeroport de Palma (MCM/eBird), i el 5-X (5 ex.) a sa Barrala (Campos) (MAC-CST/eBird).

Menorca: Plans de Favàritx, Maó. 50 ex. el 31-XII (PIR).

Eivissa: Hivernada, darrera cita el 19-I a Sant Joan (SDW/Observation). Pas postnupcial, primer registre el 5-X (varis ex.) a Can Parentona (Sant Antoni) (MAR). Un màxim d'un grup de 150 ex. l'11-XI a ses Salines (Sant Josep) (ISS/eBird).

***Galerida theklae*.** Cucullada, torrola caraputxina (ME), terrol·la capelluda (EI-FO). Cogujada montesina. Thekla's Lark

Estatus: reproductor i sedentari moderat. Accidental (CA).

Selecció: reproducció i dades d'interès.

Mallorca: Pla de Vilafranca. Uns màxims de 21 ex. en petits grups el 19-I (GRC/eBird), i 32 ex. el 29-IX (MAC-CST/eBird). Es Salobrar, Campos. Adult amb ceba el 15-IV (TOM/eBird), i el 4-VII (VDW/Observation).

Centre de Recuperació de Fauna Silvestre, ingressats 2 ex. procedents de Palma: un poll el 10-V, posteriorment és alliberat; i 1 ex. ingressa mort per traumatisme desconegut el 10-VII (COFIB, Conselleria d'Agricultura, Pesca i Medi Natural).

Cap Blanc, Lluçmajor. Un màxim de 19 ex. el 30-IX (NIC/eBird).

Menorca: Punta Nati, Ciutadella. Un màxim de 15 ex. el 3-XI (BSH/eBird).

Eivissa: Pla de Sant Mateu. Un màxim de 16 ex. en terra a les vinyes el 30-III (CST/eBird).

***Calandrella brachydactyla*.** Terrola, terrolot (MA), torrola (ME), terrol·la de cap pla (EI), terrol·la (FO). Terrera común. Greater Short-toed Lark

Estatus: reproductor moderat (MA-ME-EI) i escàs (FO). Migrant moderat (MA-ME-EI), escàs (CA), i rar (DR).

Selecció: reproducció i fenologia.

Mallorca: Prenupcial, primers registres el 26-III amb 42 ex. (diversos grups) al pla de Vilafranca (RES/eBird), el 21-IV (1 ex.) al Salobrar de Campos (BNG/Observation), Reproducció, primers cants a partir del 26-IV (1 ex.) al pla de Vilafranca (TSL/Observation).

Un màxim d'un grup lax de 60 ex. el 24-VIII a es Blanquer de Maria (RES/eBird).

Postnupcial, darreres cites el 14-IX amb 50 ex. al pla de Vilafranca (BAZ/eBird), i el 7-IX (2 ex.) a Felanitx (JMO/Observation).

Cabrera: Pas prenupcial, el 17-IV amb 2 ex. (VIC).

Menorca: Punta Nati, Ciutadella. 1 ex. el 8-III (MJJ/eBird), **30** ex. cantant per tot el 25-IV (BNN/eBird), i 20 ex. cantant el 21-V (OVV/Observation).

Eivissa: prenupcial, primera cita el 21-III (1 ex.) a ses Tanques de s'Hereu (Sant Antoni) (BSS/Observation).

Reproducció, primers cants a partir del 6-IV (10 ex.) als conreus de ses Salines (Sant Josep) (SDW/Observation).

Postnupcial, darrer registre el 7-IX amb 40 ex. en varis grups a ses Salines (SEP/eBird).

Formentera: un màxim de 4 ex. el 23-VI a la Mola (MUN).

***Melanocorypha bimaculata*.** Calàndria oriental. Calandria bimaculada. Bimaculated Lark

Estatus: accidental (MA). **Selecció:** tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

***Melanocorypha calandra*.** Calàndria. Calandria. Calandra Lark

Estatus: accidental (MA).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: Can Vairet, Calvià. **1** ex. al costat de *Alauda arvensis*, més gran, bec gruixut i potent, taca negra just sota el coll el 16-I.

Registre pendent d'homologació, vegeu-ne l'informe del Comitè de Rareses de Balears.

Alaudala rufescens (abans *Calandrella rufescens*). Torrola de prat, terrolot de prat (MA), torrola de prat (ME). Terrera marismeña. Mediterranean Short-toed Lark

Estatus: accidental (MA-ME). Cria esporàdica (MA). **Selecció:** tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Riparia riparia. Cabot de vorera, vinjolita de vorera (ME), oronella de vorera (EI). Avión zapador. Sand Martin

Estatus: migrant abundant (MA), moderat (ME-EI), escàs (FO-CA), i rar (DR).

Selecció: fenologia.

Mallorca: Pas prenupcial, primers registres, el 12-III amb 4 ex. a s'Albufera i el 16-III amb 2 ex. a l'Albufereta (RES, VIC, PNAM, RNSA), el 23-III (2 ex.) a la talaia d'Albercutx (GORA), i el 25-III (1 ex.) a Felanitx (JMO/Observation).

Darrers registres el 24-VI (2 ex.) al Salobrar de Campos (BAZ), el 13-VI a s'Albufera (3 ex.) i l'Albufereta (2 ex.) (PNAM).

Impressionant concentració d'un màxim de **250** ex. en un dia de mal temps, juntament amb altres hirundínids i falzies, a la zona des Rotlos de s'Albufera el 30-IV a les 10:00 h (RES/eBird). I 200 ex. a la bassa de Can Guidet l'1-V (TSL/Observation).

Presència estival, el 7-VII amb **3** ex. en un gran grup mixt de cabots i falzies, esquena clara totalment marró amb ventre blanc i banda de coll marró, vist al prat de Maristany (Alcúdia) (VDN/eBird). Aquesta cita de juliol se surt del rang conegut per a aquesta espècie a les Balears, sent el pas des de febrer amb les més primerenques i escasses, el pas més intens a partir d'abril i es perllonga fins a la primera setmana de maig, sent escasses les cites a juny. Podria tractar-se de concentracions premigratòries sobretot de juvenils en dispersió (principalment al juliol i agost) en aiguamolls litorals (N. de l'ed.).

Pas postnupcial, primeres cites el 6-IX amb 6 ex. a l'Albufereta i el (RNSA), el 8-IX amb 6 ex. al cap de ses Salines (Santanyí) (JMO/Observation), el 10-IX (7 ex.) a s'Albufera (PNAM). Darrers el 13-X (1 ex.) a s'Albufera (SCH/Observation), i l'1-X amb 18 ex. a la bassa de Can Guidet (ZMR/eBird).

Dragonera: Pas prenupcial, el 3-IV amb 1 ex. (JMO/Observation).

Menorca: Pas prenupcial, primera cita el 24-III amb 1 ex. a ses basses de Lluriac (es Mercadal) (CAU, VEG, VLN). Darrers, l'11-V amb 4 ex. al cap de Cavalleria (es Mercadal) (MJJ/eBird), i el 9-V amb 1 ex. a Son Bou (Alaior) (PIR).

Pas postnupcial, el 23-IX amb 37 ex. a Lluçmaçanes (Maó) (GRI).

Salines de Mongofre, Maó. 50 ex. el 17-X (PIR).

Eivissa: Pas prenupcial, present entre el 3-IV amb 1 ex. a San Joan (SDW/Observation) i el 10-V amb 2 ex. a ses Salines (Sant Josep) (SDW/eBird).

Pas postnupcial, primer registre el 26-IX amb 3 ex. a Sant Joan (VDM/Observation), i darrer el 20-X amb 1 ex. a ses Salines (SDW/Observation).

Ptyonoprogne rupestris. Cabot de roca, oronella de penyal (MA), vinjolita de penyal (ME), oronella de roca (EI). Avión roquero. Eurasian Crag Martin

Estatus: reproductor i sedentari abundant (MA) i escàs (EI-DR). Hivernant moderat (MA-EI), escàs (ME-FO), i rar (CA). Migrant escàs (ME-FO) i rar (MA-CA).

Selecció: reproducció, màxims mensuals i dades d'interès.

Mallorca: Hivernada. S'Albufera. Present fins a l'1-IV amb 10 ex. Tornen a partir del 19-XII (10 ex.). Un màxim de 300 ex. el 30-I (RES, VIC, PNAM).

Prat de Maristany, Alcúdia. Present fins a l'11-III amb 25 ex. (CLF). Un màxim de 150 ex. l'11-II (BEN-HIN-LOP-MAC/eBird).

Albufereta, Pollença. Present fins al 24-IV (2 ex.). Tornen a partir del 9-XI (20 ex.) (RES, VIC, RNSA). Un màxim de 115 ex. el 12-I (BEN/eBird).

Estany des Ponts, Alcúdia. Un gran grup de 200 ex. el 6-I (BEN-MAC/eBird).

Bassa de Can Guidet, Palma. Un màxim de 45 ex. el 28-II (ZMR/eBird).

Menorca: Son Bou, Alaior. 5 ex. el 12-II (CAU, VLN) i 3 ex. el 10-XII (PIR).

Salines de Mongofre, Maó. 4 ex. el 23-VIII i 10 ex. el 17-X (PIR). Cap de Cavalleria, es Mercadal. 2 ex. del 31-X fins al 7-XI (COL).

Eivissa: Hivernada. 7 ex. el 24-II a Valverde (Santa Eulària) (SDW/Observation).

Hirundo rustica. Oronella. Golondrina común. Barn Swallow

Estatus: reproductor moderat (MA-EI) i escàs (ME-FO). Migrant abundant (MA-ME-EI-FO-CA), i moderat (DR).

Selecció: reproducció i fenologia.

Mallorca: Presència hivernal, entre el 27 i 31-I a s'Albufera i Albufereta (1 ex.) (RES, VIC, PNAM, RNSA; MON), prat de Maristany amb 2 ex./28-30-I (HIN-MAC/eBird), i basses de Magaluf amb 1 ex./28-I (BAZ).

Pas prenupcial, primeres arribades el 31-I amb 4 ex. entre un grup de *rupestris* a les basses de Magaluf (Calvià) (GRP/eBird), el 6-II (2 ex.) al golf de Son Quint (Palma) (MAC/eBird), el 8-II (9 ex.) al prat de Maristany (Alcúdia) (RES/eBird), i l'11-II (6 ex.) a l'Albufereta (TOM/eBird).

Darrers registres el 12-V amb 5 ex. a la talaia d'Albercutx (GORA), i el 30-IV amb 65 ex. a la bassa de Can Guidet (ZMR/eBird). Un màxim d'un grup de 1.300 ex. el 27-III a la bassa de Can Guidet (HIN-LOP/eBird).

Reproducció. Cas Moliner, Son Sardina (Palma). El 13-IV primera observació d'1 ex. cantant a la zona de cria (cotxera) sense poder determinar el sexe. El 16-IV primera observació de l'exemplar dormint a la cotxera, ús intensiu de la zona de cria amb estades llargues a diferents posadors habituals. El 21-IV l'exemplar no dorm a la cotxera. El dia 22 no se l'observa durant tot el dia, tampoc dorm a la zona de cria. El 25-IV primera observació de 2 exemplars a la zona de cria, fent diferents estades llargues, els dos exemplars dormen a la cotxera. El 12-V primera observació de la posta amb 6 ous. El 25-V primera observació d'un poll acabat de néixer i 5 ous que encara no s'han desclòs. El 14-VI de la primera posta, 5 polls han surat i dos d'ells abandonen el niu. Els altres tres ho faran un dia després. Durant la primera setmana els vols són curts. Els joves es passen molt temps al niu. A mesura que passen els dies els temps de vol s'allarguen i els exemplars guanyen destresa i agilitat. Les estades a la zona de cria s'espaien. Les tornades sempre es fan acompanyades pels adults. A partir de la segona setmana de vol augmenta el temps que els joves passen fora de la zona de cria. Es comencen a observar estades dels pares sols i, també dels joves. També és habitual observar que després d'una estada separats, adults i joves es reagrupen ràpidament. Durant la tercera setmana els pares fan un ús habitual de la zona de cria mentre que els joves, no. A posta de sol solen reagrupar-se i arriben tots plegats reproduint els comportaments típics de dormidor. Fins a la segona setmana els cinc joves dormen a la cotxera. A la tercera setmana només en dormen quatre. També, durant la tercera setmana els pares intenten engegar els joves amb persecucions contínues i amb crits d'alarma per impedir que emprin la zona de cria com a dormidor. Seguirament la femella ha començat a posar la segona posta. El 10-VII solament un jove segueix emprant la cotxera com a dormidor a pesar de la insistència dels pares per evitar-ho. La segona posta és de 4 ous i 1 nial de la primera posta. El 18-VII desclou l'ou del primer poll, tres dies després s'ob-

serva un total de 4 polls. El 31-VII i durant aquests dies, les temperatures són molt elevades, els polls se situen a la volada del niu (comportament no observat amb anterioritat). Es troba un poll al terra després de sentir els crits d'alarma dels adults. El poll es retorna al niu. Són els primers moments on els adults fan petits descansos a posadors habituals. Durant aquests 14 dies de manera continuada i sense descansar han alimentat els polls des de la sortida del sol fins entrada la fosca. Durant aquestes dues setmanes no s'han observat visites del joves de la primera posta llevat d'un dia en concret on 2 joves fan entrades i sortides durant un breu període de temps. El jove que empra el dormidor com a niu ho segueix fent a pesar dels intents dels adults per impedir-ho. El 3-VIII es troben restes de part d'una ala d'un exemplar. Els polls no es troben al niu. Al vespre sols dorm un adult. A partir d'aquest dia no s'observa ni a l'altre adult ni els polls ni el jove que empra la zona com a dormidor. L'adult continuarà emprant la cotxera com a dormidor i seguirà mostrant un grau alt de fidelitat a la zona, fent estades llargues que s'aniran espaiant a mesura que passin les setmanes, fins que durant la segona setmana de setembre se l'observi per darrera vegada (MOL).

Salobrar de Campos. 4 ex. agafant fang per al niu l'11-V (JMO/Observation).

Pas postnupcial, primeres concentracions premigratòries el 27-VIII (200 ex.) a les basses de Magaluf (GRP/eBird), el 2-IX (200 ex.) a les basses de Son Navata (Felanitx)(MTA/eBird), el 4-IX (200 ex.) al prat de Sant Jordi (Palma) (MCM/eBird), el 21-IX (180 ex.) a sa Barrala (Campos)(MAC-CST/eBird), i el 26-IX amb 1.000 ex. a s'Albufera (RES, VIC, PNAM). Darreres cites el 26-XI amb 2 ex. a la torre d'en Pau (Palma) (MAC/eBird), el 5-XI (11 ex.) a s'Albufera (PNAM), i el 3-XI (1 ex.) al cap Blanc (RMY/Observation).

Cap de ses Salines, Santanyí. Pas actiu, exemplars sortint a la mar cap al S, amb 690 ex. des del 13-VIII fins al 2-XI (GORA; JMO/Observation).

Dragonera: Pas prenupcial, almenys present entre el 2-IV (4 ex.) i el 12-IV (3 ex.) (JMO/Observation).

Menorca: basses de Lluriac, es Mercadal. 1 ex. el 12-I (CAU).
S'Algar, Sant Lluís. 1 ex. el 26-I (MEN).
Santa Marianna, Maó. 1 ex. el 29-I (PIR).
Es Mercadal, 4 parelles reproductores dins el nucli urbà (COL).
Sa Muntanyeta, Maó. 1 ex. el 15-XI (PIR).
Llucmaçanes, Maó. 1 ex. el 21-XI (GRI).
Prat de Son Bou, Alaior. 1 ex. el 22-XI (CAU).

Eivissa: Prenupcial, primera cita el 3-II amb 5 ex. a ses Feixes (VZZ/eBird).

Postnupcial, darrer registre el 16-X amb 300 ex. a ses Salines (Sant Josep) (SEP/eBird).

Formentera: 17 ex. el 3-IV a la platja des Trucadors (MTF/Observation).

***Delichon urbicum*.** Cabot, vinjolita (ME), oronella de cul blanc (EI).
Avi3n com3n. Common House Martin

Estatus: reproductor abundant (MA) i moderat (ME-EI). Hivernant rar (MA-ME), Migrant abundant (MA-ME-EI-FO-CA), i escàs (DR).

Selecci3: reproducci3 i fenologia.

COL3NIES REPRODUCTORES	NIUS OCUPATS	% Mitjana / Nius mitjana / n= anys	NIUS NO OCUPATS	PER ALTRES ESPECIES
ALC3DIA	47	+16,5 %/ 40 _{nus} / n=3	8	2 <i>P.domesticus</i>
BANYALBUFAR	120	+9,5 %/ 110 _{nus} / n=10	8	-
CAMPOS	119	+24,4 % / 96 _{nus} / n=9	5	-
FELANITX	24	-66,8 %/ 72 _{nus} / n=9	8	2 <i>P.domesticus</i>
INCA	170	+15,7 % / 147 _{nus} / n=7	-	-
PALMA - Son Dameto	15	+20,0 %/ 13 _{nus} / n=8	1	-
PALMA - Son Rapinya	66	+40,1 % / 47 _{nus} / n=8	0	2 <i>P.domesticus</i>
PALMA - Son Xigala	232	-5,0 % / 244 _{nus} / n=9	40	1 <i>P.domesticus</i>
PUIGPUNYENT	107	+4,9 % / 102 _{nus} / n=3	2	3 <i>P.domesticus</i>
SANTA PONÇA	40	-11,6 % / 45 _{nus} / n=13	16	1 <i>P.domesticus</i>
SES SALINES	40	-38,1 % / 65 _{nus} / n=8	6	4 <i>P.domesticus</i>
SINEU	28	-50,5 % / 57 _{nus} / n=8	31	1 <i>P.domesticus</i>
Σ MALLORCA n= 12	1.008		115	16 <i>P.domesticus</i>

Mallorca: Pres3ncia hivernal, el 20-I amb 2 ex. al golf de Santa Ponça (Calvià) (BAZ, PAM, MOU).

Son Bosc, Muro. Un registre aïllat d'1 ex. el 14-XII (HIN-LOP/eBird).

Pas prenupcial, primers registres el 2-II amb 1 ex. al prat de Maristany (Alc3dia) (SOL/eBird), el 6-II (1 ex.) al golf de Son Quint (Palma) (MAC/eBird), l'11-II (2 ex.) a s'Albufera, i el 19-II (4 ex.) a s'Albufera (RES, VIC, PNAM, RNSA).

Talaia d'Albercutx, Pollença. S'han vist en migraci3 **64** ex. des del 16-III fins al 24-IV (GORA).

Un m3xim de 200 ex. el 24-IV a la bassa de Can Guidet (TSL/Observation).

Nidificaci3. Enguany almenys s'han recomptat **1.008** parelles reproductores a l'illa, repartides entre 12 col3nies, fet que suposa un increment del +6,0 % respecte a la mitjana (690 nus / n= 12) (LOP).

Alc3dia. La col3nia reproductora consta de 47 nus ocupats (cinc m3s que l'any anterior), fet que suposa un increment del +16,5 % respecte a la mitjana (40 nus / n= 3), no hi

- ha nius no ocupats, i 2 ocupats per *Passer domesticus*. Hi ha un habitatge en què els nius que tenen a la façana disposen d'uns protectors contra els excrements (MAC, LOP).
- Banyalbufar. La colònia reproductora consta de 120 nius ocupats, fet que suposa un increment del +9,5 % respecte a la mitjana (110 nius / $n=10$), i 8 nius no ocupats (LCL).
- Barranc de Biniraix, Sóller. Petita colònia a una paret de damunt el camí el 28-V (FIO).
- Campos. La colònia reproductora consta de 119 nius ocupats, fet que suposa un increment del +24,4 % respecte a la mitjana (96 nius / $n=9$), i 5 nius no ocupats (MAS, LOP).
- Felanitx. La colònia reproductora consta de 24 nius ocupats, fet que suposa una forta disminució del -66,8 % respecte a la mitjana (72 nius / $n=98$), 10 nius no ocupats, i 2 nius ocupats per *Passer domesticus* (MAS, LOP).
- Inca. La colònia reproductora consta de 170 nius ocupats, fet que suposa un augment del 15,7 % respecte a la mitjana (147 nius / $n=7$) (LUQ).
- Palma. Es controlen quatre colònies:
- Bons Aires. Presència a la colònia a partir del 17-III amb 2 ex. (SUA). Nius ocupats a partir del 2-IV, i polls de l'11-V (SAS).
- Son Dameto. La colònia reproductora consta de 15 nius ocupats, fet que suposa un lleuger augment del 20,0 % respecte a la mitjana (13 nius / $n=8$), i 1 niu no ocupat (VIA).
- Son Rapinya. La colònia reproductora consta de 66 nius ocupats, fet que suposa un augment del 40,1 % respecte a la mitjana (47 nius / $n=8$), cap niu no ocupat, i 2 nius ocupats per *Passer domesticus* (PAM, VDE).
- Son Xigala. La colònia reproductora consta de **232** nius ocupats, fet que suposa una lleugera disminució del -5,0 % respecte a la mitjana (244 nius / $n=9$), i 40 nius no ocupats. Aquesta és la colònia més gran a Balears, té problemes greus amb els veïnats (MLL, GAS, LOP).
- Puigpunyent. La colònia reproductora consta de 107 nius ocupats, fet que suposa un augment del +4,9 % respecte a la mitjana (102 nius / $n=3$), aquest augment és degut al fet que s'han inclòs nous nius per tot el nucli urbà, i 13 ocupats per *Passer domesticus* (GZL; MAC, LOP).
- Santa Ponça, Calvià. La colònia reproductora consta de 40 nius ocupats, fet que suposa una disminució del 11,6 % respecte a la mitjana (45 nius / $n=13$), i 16 nius no ocupats (SAE, MLL, LOP).
- Ses Salines. La colònia reproductora consta de 40 nius ocupats, fet que suposa una disminució del -38,1 % respecte a la mitjana (65 nius / $n=8$), 6 nius no ocupats, i 4 nius ocupats per *Passer domesticus* (MAS, LOP).

Sineu. La colònia reproductora consta de 28 nius ocupats, fet que suposa una disminució del -50,5 % respecte a la mitjana (57 nius / $n = 8$), 31 nius no ocupats, i 1 niu ocupat per *Passer domesticus*. Aquesta colònia no deixa de disminuir el nombre de nius ocupats des de l'any 2017 (125 nius ocupats), creiem que és per l'acció dels veïnats (MAC, LOP). Les colònies reproductores, a causa de la brutor que produeix, s'enfronten a la destrucció dels seus nius per part de l'home en determinats edificis tant privats com públics, actuació desafortunada considerada com una "mesura higiènica", desconeixent la seva il·legalitat (N. de l'ed.).

Pas postnupcial, darreres cites el 10-XI (2 ex.) a sa Barrala (Campos) (MAC-CST/eBird), el 3-XI (8 ex.) a Banyalbufar (BAU), el 25-X (1 ex.) a es Capdellà (Calvià) (TIM/eBird), Cap de ses Salines, Santanyí. Pas actiu, exemplars sortint a la mar cap al S, amb 99 ex. des del 6-X fins al 24-X (GORA; JMO/Observation).

Dragonera: Pas prenupcial, 7 ex. el 2-IV (JMO/Observation).

Menorca: basses de Lluriach, es Mercadal. 1 ex. el 20-I, cita molt primària (CRT).

Es Mercadal. 2 ex. el 7-X (COL).

Eivissa: Prenupcial, primers registres el 24-III amb 10 ex. al cap Llentrisca (BSS/Observation).

Postnupcial, darrer registre el 5-X amb 10 ex. a Santa Eulària (MSN/Observation).

Cecropis rufula (abans *Cecropis daurica*). Oronella coa-rogenca, oronella daurada (ME). Golondrina daurica. Red-rumped Swallow

Estatus: migrant escàs (MA-EI) i rar (ME-FO-CA-DR). Cria esporàdica 2007, 2011 i 2014 (MA) i 2011, 2017 i 2018 (ME), i 2019 (EI).

Selecció: reproducció, fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: Pas prenupcial, primers registres el 12-III amb 2 ex. a la bassa de Can Guidet (Palma) (ZMR/eBird), el 17-IV (1 ex.) a l'Albufereta (BAZ), i el 19-IV 1 sol individu entre un grup mixt de 40 *Hirundo rustica* i *Riparia* aturats a una reixeta a s'Albufera (ART, MUÑ).

Darrer registre el 29-V a s'Albufera (2 ex.) (RES, VIC, PNAM) i a Can Guidet (1 ex.) (JMO/Observation). Un màxim de 4 ex. a la bassa de Can Guidet el 23-IV (BAZ/eBird) i a s'Albufera el 28-V (PNAM).

Pas postnupcial, darrera cita el 8-VIII amb 3 ex. Darrer registre el 2-X amb 2 ex., ambdós a s'Albufera (RES, VIC, PNAM).

Eivissa: Pas prenupcial, primers registres el 26-III amb 1 ex. a ses Feixes al prat de ses Monges (SEP, ESR).

Cettia cetti. Rossinyol bord. Ruiseñor bastardo. Cetti's Warbler

Estatus: reproductor i sedentari abundant (MA-ME) i escàs (EI). Migrant rar (FO-CA).

Selecció: reproducció, i possibles noves localitats de nidificació.

Mallorca: Punta de n'Amer, Sant Llorenç. Escoltats 2 ex. el 12-I (GON), i el 19-V amb 2 ex. cantant (EKK/Observation).
Golf d'Alcanada, Alcúdia. Sentit 1 ex. el 13-III (GON).
Vall d'Orient, Bunyola. Sentit 1 ex. a prop de Orient, pel torrent el 20-III (GON).

s'Albufera. Canta tot l'any. Abundància extraordinària de mascles cantant al llarg del camí de s'Amarador-camí d'en Pep. Es comptabilitzen 49 individus al llarg d'un transecte de 2,0 km (canyar amb canals amb aigua dolça) (IKA=24,5), duració 1:08 h, el 10-IV (HIN-LOP/eBird).

Menorca: Santa Madrona, Maó. Primer juvenil capturat per a anellament el 7-VII (GRI).

Formentera: Hivernada, 1 ex. el 29-I al camí des Brols (SEP). Primera cita com a hivernant a l'illa (N. de l'ed.).

Aegithalos caudatus. Senyoreta, coaric (MA). Mito. Long-tailed Tit

Estatus: reproductor i sedentari escàs (MA).

Selecció: reproducció, noves localitats, i grups familiars.

Mallorca: Coll de Son Camps, Calvià. Un grup familiar de 10 ex. el 13-V (VIA/eBird).

Calvià. Un grup familiar de 8 ex. entre Peguera i cala Fornells el 14-VI (SOL/eBird).

Golf de Son Quint, Palma. 4 ex. el 31-V, 8 ex. el 27-XI (MAC/eBird).

Es Capdellà, Calvià. 6 ex. a l'abeurador de ca nostra el 30-VII (SOL/eBird), un grup de 7 ex. al jardí el 20-XI (TIM/eBird).

Finca de Galatzó, Calvià. Un màxim de 5 ex. el 23-X (CST/eBird).

Esporles. Un grup mixt de 4 ex. amb 4 *Regulus ignicapilla* el 3-XI (BAC, GRD).

Bunyola. 8 ex. al camí de sa Coma Gran el 7-XII (MMA).

Phylloscopus sibilatrix. Ull de bou siulador, ull de bou xiulaire (ME), mosquiter siulador (FO). Mosquitero silbador. Wood Warbler

Estatus: migrant moderat (MA-FO-CA) i escàs (ME-EI-DR).

Selecció: fenologia.

Mallorca: Pas prenupcial, primeres cites el 26-III amb 1 ex. al bosc de Bellver (Palma) (HDS/eBird), el 4-IV amb 1 ex. a s'Albufera i Felanitx (RES, VIC, PNAM; JMO/Observation), el 7-IV (1 ex.) a Felanitx (JMO/Observation), i el 15-IV (1 ex.) al puig de sa Tudossa (Artà) (BLB/Observation).

Darrer registres, el 28-IV (1 ex.) a Can Guidet Vell (Palma), a la vall de Bóquer (Pollença) (TSL-HKS/Observation), i a la taia d'Albercutx (2 ex.) (GORA), el 27-IV (1 ex.) a Felanitx i a s'Evangèlica (Andratx) (JMO/Observation; BAZ).

Pas prenupcial, el 29-VIII amb 1 ex. a l'Albufereta (RES, VIC, RNSA).

Cabrera: Pas prenupcial, el 26-IV amb 1 ex. (TSL/Observation).

Dragonera: Pas prenupcial, almenys present entre el 12-IV amb 1 ex. (JMO/Observation) i fins al 21-IV amb 1 ex. (DPT/Observation).

Menorca: Prenupcial. Hort d'es Lluïsser (Alaior), 2 ex. el 7-IV (CAU). Punta Prima, Sant Lluís. 1 ex. el 19-IV (PIR).

Eivissa: Pas prenupcial, almenys present entre el 20-IV amb 1 ex. a Sant Joan, i darrer el 24-IV amb 8 ex. a ses Salines (Sant Josep) (SDW/Observation).

Phylloscopus bonelli. Ull de bou pàl·lid, mosquiter pàl·lid (FO). Mosquitero papialbo. Western Bonelli's Warbler

Estatus: migrant moderat (EI), i escàs (MA-ME-FO-CA-DR).

Selecció: fenologia.

Mallorca: Pas prenupcial, primeres cites el 18-IV (1 ex.) a s'Albufera (RES/eBird), el 24-IV (1 ex.) a Son Pax (Palma) (MMA), el 25-IV (1 ex.) a Son Flor (Calvià) i al golf de Son Quint (Palma) (BEN-MAC/eBird).

Darrer registre el 6-V (1 ex.) a Galatzó (Calvià) (SOL/eBird) i a Felanitx (JMO/Observation), el 5-V (1 ex.) a Parc dels Pins (Port de Pollença) (MAC-CST/eBird), i el 4-V (1 ex.) a Can Vairet (Calvià) (NIC/eBird).

Cabrera: Pas prenupcial, almenys present entre el 16-V amb 1 ex., i el 19-V (1 ex.) (LPV-RES/eBird).

Menorca: Hort d'es Lluïsser, Alaior. 1 ex. el 3-IV (CAU). Càmping de Son Bou, Alaior. 2 ex. el 3-V (PIR).

Eivissa: Pas prenupcial, almenys present entre el 30-IV amb 1 ex. a Can Guerro (Sant Josep) (SEP), i el 30-V (1 ex.) a Roca Llisa (SHN/eBird).

Formentera: Pas prenupcial, 2 ex. el 3-IV a la Mola (MTF/Observation).

Phylloscopus humei. Ull de bou de Hume. Mosquitero de Hume. Hume's Leaf Warbler

Estatus: divagant (CA). *Selecció*: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Phylloscopus inornatus. Ull de bou cellard, ull de bou de dues retxes (MA), ull de bou billistat (ME). Mosquitero bilistado. Yellow-browed Warbler

Estatus: migrant rar (MA-ME-EI-CA-DR).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: Pas postnupcial, el 2-XI amb 1 ex. a Gotmar (Pollença), i des del 4 al 9-XI amb 1 ex. al Parc BIT (Palma).

Eivissa: ses Salines, Sant Josep. Un grup de 3 ex. l'1-XI, i 2 ex. el 3-XI.
Per a més informació d'aquests registres homologats, vegeu-ne l'informe del Comitè de Rareses de Balears.

***Phylloscopus proregulus*.** Ull de bou reietó. Mosquitero de Pallas. Pallas's Leaf Warbler

Estatus: divagant (MA). **Selecció:** tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

***Phylloscopus schwarzi*.** Ull de bou de Schwarz. Mosquitero de Schwarz. Radde's Warbler

Estatus: divagant (CA-DR). **Selecció:** tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

***Phylloscopus fuscatus*.** Ull de bou fosc. Mosquitero sombrío. Dusky Warbler

Estatus: divagant (ME).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: depuradora de Formentor, Pollença. 1 ex. el 19-X.

Per a més informació d'aquests registres homologats, vegeu-ne l'informe del Comitè de Rareses de Balears.

***Phylloscopus trochilus*.** Ull de bou de passa, ull de bou gros (MA-EI), mosquiter gros (FO). Mosquitero musical. Willow Warbler

Estatus: migrant abundant.

Selecció: fenologia.

Mallorca: Pas prenupcial, primeres cites el 21-III amb 4 ex. a Ariant (Pollença) (GON), el 22-III amb 1 ex. a l'Albufereta (RES, VIC, RNSA), el 27-III (1 ex.) al bosc de la serra de la Coma (Pollença) (ATK/Observation), i el 28-III (1 ex.) a s'Albufera (RES, VIC, PNAM).

Darrers registres el 27-V amb 1 ex. a Alcúdia (CLF), el 14-V (1 ex.) a s'Albufera (PNAM), i el 4-V (2 ex.) al cap de Formentor (Pollença) (HKS/Observation).

Pas postnupcial, primers registres el 20-VIII amb 1 ex. a s'Evangèlica (Andratx) (BAZ) i a la vall de Bóquer (Pollença) (MDR-BRY/eBird), i el 21-VIII (1 ex.) a Galatzó (Calvià) (SOL/eBird).

Darreres cites el 5-XI amb 1 ex. a s'Albufera (BAU), el 3-XI (1 ex.) al cap de ses Salines (Santanyí) (RMY/Observation), i el 16-X (1 ex.) a Son Pax (Palma) (MMA).

Un màxim de 8 ex. el 18-IX a les basses de Binissalem (MOU-PAM/eBird).

Presència hivernal, 1 ex. el 24-XI i 6-XII a l'Albufereta (MAC-CST-LOP/eBird), i l'1-XII (1 ex.) al prat de Sant Jordi (Palma) (MAC/eBird). Aquest migrant que hiverna al Sahel retarda molt la seva escala (N. de l'ed.).

Cabrera: Pas prenupcial, 3 ex. el 26-IV (TSL/Observation).

Pas postnupcial, 12 ex. el 15-IX (MOU-PAM/eBird).

Dragonera: Pas prenupcial, almenys present entre el 2-IV (9 ex.) i el 4-V (1 ex.) (JMO/Observation).

Pas postnupcial, almenys present entre el 15-IX (4 ex.) fins al 18-IX (1 ex.) (JMO/Observation).

Menorca: Pas prenupcial, primera cita el 18-III amb 1 ex. a Biniarroi (Alaior) (PIR). Darrera el 27-IV (1 ex.) a Sant Lluís (BLB/Observation).

Pas postnupcial, 1 ex. el 16-VIII l'Hort d'es Lluïsser (Alaior) (CAU).

Son Bou, Alaior. 1 ex. el 26-X (PIR).

Aire: (Sant Lluís). Pas prenupcial, 784 exemplars capturats per a anellament entre l'1-IV fins al 15-V. Una tendència negativa del **-43,4** % per al període 1995-2024 (mitjana = 1.383,7; n = 40.128). Un màxim de 230 captures durant la pentada de l'1-V fins al 5-V (AIRE).

Eivissa: Pas prenupcial, almenys present entre el 6-IV amb 1 ex., i el 22-IV amb 1 ex., ambdós a ses Salines (Sant Josep) (SDW/Observation).

Pas postnupcial, almenys present entre el 19-VIII amb 1 ex. a ses Salines (DMZ), i el 12-IX (1 ex.) a Sant Antoni (RTR/Observation).

Formentera: Pas prenupcial, el 3-IV amb 5 ex. a l'estany Pudent i 3 ex. a la Mola (MTF/Observation).

Pas postnupcial, el 25-VIII amb 1 ex., i el 14-IX amb 12 ex. ambdós a l'estany Pudent (SEP/eBird).

Phylloscopus collybita. Ull de bou, mosquiter (FO). Mosquitero común. Common Chiffchaff

Estatus: estival no reproductor rar (MA). Hivernant abundant, i escàs (DR). Migrant abundant (MA-ME-FO), moderat (EI-DR), escàs (CA). Cria esporàdica 2008 i 2009 (MA).

Selecció: fenologia i subspècies.

Mallorca: Hivernada, un màxim de 60 ex. a Son Bosc (Muro) el 2-I i el 31-XII (MAC-RES-CST/eBird) i al prat de Maristany (Alcúdia) el 30-I (MAC/eBird).

Pas prenupcial, darreres cites amb 1 ex. l'11-V a s'Albufera i el 5-V a l'Albufereta (RES, VIC, PNAM, RNSA), el 4-V (1 ex.) al cap de Formentor (HKS/Observation) i a la vall de Bóquer (Pollença) (VSV/Observation).

Presència primaveral-estiu. Embassament de Cúber (Escorca) amb 3 mascles territorials l'1-V (BEN-MAC-CST/eBird) i 1 ex. cantant el 10-V (MJS/Observation).

Can Guidet, Palma. 1 ex. cantant el 4-V (HKS/Observation).

S'Evangèlica, Andratx. 1 ex. canta tot el matí l'11-V (BAZ).

Font des Noguer, Escorca. Sentit 1 ex. al pinar-alzinar devora l'àrea recreativa l'1-VI (MUN).

Felanitx. 1 ex. cantant el 6-VI, niu ocupat el 12-VII amb 1 adult i 1 jove (JMO/Observation).

Pas postnupcial, primeres cites, el 13-IX amb 1 ex. a l'Albufeireta (RES, VIC, RNSA), el 26-IX (1 ex.) a la finca de Galatzó (Calvià) (MUN), i el 3-X (1 ex.) a Ariant (Pollença) (GON).

Menorca: Presència primavera-estiu. Poliesportiu d'Alaior, 1 ex. és observat cantant recurrentment entre el 19-V fins al 26-V (CAU, VLN).

Alforí de Dalt, Ciutadella. És capturada per a anellament 1 femella amb placa incobatriu el 23-VI (GRI).

Eivissa: Prenupcial, darrer registre el 3-IV amb 1 ex. a Sant Joan (SDW/Observation).

Postnupcial, primera cita el 25-X amb 2 ex. a Santa Eulària (ODS/Observation). Un màxim de 100 ex. a ses Salines l'1-XI (SDW/eBird).

Formentera: Pas prenupcial, 3 ex. el 3-IV a l'estany Pudent (MTF/Observation).

Phylloscopus collybita tristis. Ull de bou siberià, mosquiter siberià (FO). Mosquitero común siberiano. Common Chiffchaff.

Estatus: accidental (MA-ME-CA).

Selecció: tots els registres rebuts.

Aire: (Sant Lluís). Es captura per a anellament 1 adult de la subespècie *tristis* el 18-IV i el 21-IV se'n captura 1 d'adult.

Per a més informació d'aquests registres homologats, vegeu-ne l'informe del Comitè de Rareses de Balears.

Phylloscopus ibericus. Ull de bou ibèric. Mosquitero ibérico. Iberian Chiffchaff

Estatus: migrant escàs (MA-ME-CA), rar (EI-FO).

Selecció: tots els registres rebuts.

Dragonera: Pas prenupcial, 1 ex. cantant el 12-IV (JMO/Observation), primera cita per a l'illa (N. de l'ed.).

Phylloscopus trochiloides. Ull de bou verdós. Mosquitero verdoso. Greenish Warbler

Estatus: accidental (ME). **Selecció:** tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Phylloscopus borealis. Ull de bou boreal. Mosquitero boreal. Arctic Warbler
Estatus: accidental (MA). *Selecció:* tots els registres rebuts.
 Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Acrocephalus arundinaceus. Buscarla grossa, rossinyol gros (MA-EI-FO), tord de prat (ME). Carricero tordal. Great Reed Warbler
Estatus: reproductor moderat (MA) i escàs (ME). Hivernant rar (MA). Migrant moderat (MA), escàs (ME-EI-CA), i rar (FO-DR).
Selecció: reproducció i fenologia, tots els registres a FO.
Mallorca: Pas prenupcial, primers registres el 15-II amb 1 ex. (vist i escoltat) a ses basses de Magaluf (Calvià) cita molt primerenca (MCM/eBird), el 22-III amb 1 ex. cantant al prat de Maristany (Alcúdia) (TOM/eBird), el 23-III (1 ex.) a l'Albufera (RES, VIC, PNAM), i el 25-III (1 ex. cantant) a ses basses de Binissalem (RES/eBird).
Pas postnupcial, darrer registre el 12-IX amb 1 ex. a s'Albufera, i el 29-VIII (1 ex.) a l'Albufereta (RES, VIC, PNAM, RNSA),
Eivissa: Pas prenupcial, 1 ex. el 29-IV a ses Feixes al prat de ses Monges (SEP).

Acrocephalus melanopogon. Buscarla mostatxuda, boscarla mostatxuda (MA-ME-EI). Carricerín real. Moustached Warbler
Estatus: reproductor i sedentari abundant (MA) i escàs (ME). Hivernant rar (EI). Migrant escàs (MA).
Selecció: reproducció.
Mallorca: s'Albufera. Primers cants a partir del 7-II (RES, VIC, PNAM).
Menorca: Golf de Son Parc, es Mercadal. 1 ex. el 30-X i el 26-XI (PIR).

Acrocephalus paludicola. Buscarla d'aigua, boscarla d'aigua (MA-ME). Carricerín cejudo. Aquatic Warbler
Estatus: accidental (MA-ME). *Selecció:* tots els registres rebuts.
 Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Acrocephalus schoenobaenus. Buscarla dels joncs, boscarla (MA-EI-FO), boscarla dels joncs (ME). Carricerín comú. Sedge Warbler
Estatus: migrant escàs, i rar (DR).
Selecció: fenologia.
Mallorca: Pas prenupcial, primer registre el 27-III amb 3 mascles cantant, i darrera cita el 4-V amb 1 ex., ambdós a s'Albufera (RES, VIC, PNAM/eBird).
 Can Cullerassa, Pollença. 1 mascle cantant el 4-VI (RES/eBird), cita molt tardana (N. de l'ed.).
Eivissa: Pas prenupcial, present entre el 30-III amb 2 ex. (SEP/eBird), i el 6-V amb 1 ex. (SDW/Observation), ambdós a ses Feixes (Vila).

Acrocephalus dumetorum. Boscarla de Blyth. Carricero de Blyth. Blyth's Reed Warbler

Estatus: accidental (CA). *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Acrocephalus scirpaceus. Buscarla de canyar, boscarla de canyet (MA-EI-FO), boscarla de canyís (ME). Carricero común. Eurasi-an Reed Warbler

Estatus: reproductor moderat (MA-ME-EI), i rar (FO). Migrant abundant (MA), moderat (ME-EI-FO-CA), i escàs (DR).

Selecció: reproducció i fenologia.

Mallorca: Pas prenupcial, primeres cites el 27-III (1 ex.) i entrada forta el 28-IV ambdós a s'Albufera (RES, VIC, PNAM).

Pas postnupcial, darrers registres el 25-X amb 1 ex. sentit a Son Pax (Palma) (MMA), el 4-X amb 2 ex. a s'Albufera, l'11-IX amb 4 ex. a l'Albufereta (RES, VIC, PNAM, RNSA), i el 7-IX (7 ex.) a ses basses de Son Navata (Felanitx) (JMO/Observation).

Dragonera: pas postnupcial, 1 ex. el 16-IX (JMO/Observation).

Menorca: Pas postnupcial. Son Bou (Alaior), 2 ex. el 16-IX (CRT). Son Boter, Alaior. 1 ex. el 5-XI (PIR; ALL/eBird).

Aire: (Sant Lluís). Pas prenupcial, 13 ex. capturats per a anellament entre l'1-IV fins al 15-V. Una tendència negativa del **-50,8 %** per al període 1995-2024 (mitjana= 26,4; n= 776). Un màxim de 6 captures durant la pentada del 6-V fins al 10-V (AIRE).

Eivissa: Pas prenupcial, primer registre el 16-IV amb 1 ex. cantant a ses Feixes (Vila) (SDW/Observation).

Reproducció, ses Feixes (Eivissa), 1 adult alimentant 2 polls coa-curt l'1-VIII (SEP/eBird).

Formentera: 1 ex. el 16-VI a l'estany Pudent (SDW/Observation).

Acrocephalus palustris. Buscarla menjamoscards, boscarla menjamoscards (MA). Carricero poliglota. Marsh Warbler

Estatus: accidental (CA). *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Iduna caligata (abans *Hippolais caligata*). Busqueta asiàtica, bosqueta asiàtica (MA). Zarcero escita. Booted Warbler

Estatus: accidental (CA-DR). *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de la SEO.

Iduna opaca (abans *Hippolais opaca*). Busqueta pàl·lida, bosqueta pàl·lida (MA-ME-EI-FO). Zarcero bereber. Western Olivaceous Warbler

Estatus: migrant rar (MA-ME-FO-CA-DR). *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Hippolais polyglotta. Busqueta, bosqueta (MA-ME-EI-FO). Zarcero común. Melodious Warbler

Estatus: migrant moderat, i escàs (DR).

Selecció: fenologia.

Mallorca: Pas prenupcial, tan sol dues cites l'11-V amb 1 ex. a s'Evangèlica (Andratx) (BAZ), i el 12-V (1 ex.) al pla des Blanquer de Maria (MJS/Observation).

Pas postnupcial, una única cita el 25-X amb 2 ex. junts vistos caçant insectes dins d'un garrover a Son Pax (Palma) (MMA).

Cabrera: Pas prenupcial, almenys present entre el 16-V (1 ex.) i el 19-V (1 ex.) (LPV-RES/eBird).

Eivissa: Pas prenupcial, present entre el 28-IV amb 1 ex. a Can Tomàs Sant Antoni (YAR/eBird), i el 29-V amb 1 ex. cantant a Sant Joan (SDW/Observation).

Hippolais icterina. Busqueta icterina, bosqueta grossa (MA-EI-FO), bosqueta icterina (ME). Zarcero icterino. Icterine Warbler

Estatus: migrant moderat, i escàs (DR). *Selecció:* fenologia.

Cap registre rebut.

Locustella luscinioides. Boscaler. Buscarla unicolor. Savi's Warbler

Estatus: reproductor rar (MA). Migrant rar (ME-EI).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: s'Albufera. Primera cita el 12-IV amb un mascle cantant al camí d'en Pep (SOL-LOP/eBird, GORA), i darrera el 12-VI amb 1 ex. cantant (RES, VIC, PNAM). Enguany s'estima que hi ha criat **1** parella (RES, VIC, PNAM; GORA).

Locustella naevia. Boscaler pintat, boscarlet pintat gros (MA-EI-FO), boscaler pintat gros (ME). Buscarla pintoja. Common Grasshopper Warbler

Estatus: migrant escàs, i rar (DR).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: pas prenupcial, present entre el 16-IV amb 1 mascle cantant a s'Albufera (RES, VIC, PNAM; DNL/eBird), i el 14-V (1 cantant) a Gotmar (Port de Pollença) (KRR/eBird). Talaia d'Albercutx, Pollença. Gravat 1 mascle cantant a les 6:12 h el 7-V (RES/NFC).

Eivissa: Pas prenupcial, escoltat 1 ex. el 30-IV a Buscastell (Sant Antoni) (YAR).

Cisticola juncidis. Butxaqueta, brusac (MA), butxac (ME). Buitrón. Zitting Cisticola

- Estatus:** reproductor i sedentari abundant (MA), moderat (ME-EI), i rar (FO). Migrant rar (DR).
- Selecció:** reproducció.
- Mallorca:** s'Albufera. Primers cants a partir del 29-II (RES, VIC, PNAM). Observació de joves a partir del 7-VII (VDN/Observation). Es Blanquer de Maria. 2 adults amb menjar al bec el 6-VI (LOP). Basses de Magaluf, Calvià. 3 polls recent volats l'11-VIII (GRP/eBird).
- Eivissa:** 1 ex. portant material al niu el 24-IV a ses Salines (Sant Josep) (MSB/eBird).

***Sylvia atricapilla*.** Busqueret de capell, enganyapastors de capell (EI). Curruca capilotada. Eurasian Blackcap

- Estatus:** reproductor i sedentari abundant (MA), moderat (ME) i rar (EI). Hivernant abundant (MA-EI), moderat (ME-FO), i escàs (CA-DR). Migrant abundant.
- Selecció:** reproducció i fenologia.
- Mallorca:** s'Albufera. Primers cants a partir del 17-II (THS/Observation).
- Dragonera:** (Andratx). Prenupcial, darrera cita el 12-IV amb 1 ex. (JMO/Observation). Postnupcial, primer registre el 15-IX amb 4 ex. (JMO/Observation).
- Menorca:** Santa Madrona, Maó. Primer juvenil capturat per a anellament el 7-VII (GRI).
- Eivissa:** Reproducció, primer mascle cantant el 23-III a Sant Antoni (BSS/Observation).

***Sylvia borin*.** Busqueret gros, busqueret mosquiter (MA-ME-FO), enganyapastors mosquiter (EI). Curruca mosquitera. Garden Warbler

- Estatus:** migrant abundant, i moderat (DR).
- Selecció:** fenologia.
- Mallorca:** Pas prenupcial, primers registres el 23-IV amb 1 ex. a l'Albufereta, el 28-IV amb 1 ex. a s'Albufera (RES, VIC, RNSA, PNAM), i el 29-IV (1 ex.) a Felanitx (JMO/Observation). Darreres cites l'11-V a l'Albufereta amb 1 ex. (RNSA; BXT/Observation) i a s'Evangèlica (Andratx) amb 2 ex. (BAZ). Pas postnupcial, primeres cites el 19-VIII (1 ex.) a Galatzó (Calvià) (SOL/eBird), el 7-IX (4 ex.) a s'Evangèlica (BAZ/eBird), i el 10-IX amb 2 ex. a s'Albufera (PNAM). Darrers registres el 9-XI (1 ex.) a Gotmar (Pollença) (MAC-CST/eBird), el 19-X (2 ex.) a ses cases de Cala Murta (SCH/Observation), i el 15-X (1 ex.) a sa Marina Gran de Santanyí (JMO/Observation).

- Cabrera:** Pas prenupcial, almenys present entre el 30-IV amb 6 ex. fins al 8-VI (1 ex.) (JMO/Observation; NVR/eBird). Un màxim de 8 ex. el 19-V (RES/eBird).
- Menorca:** Pas postnupcial. Son Bou (Alaior), 1 ex. el 20-IX (PIR). Vergers de Sant Joan, Maó. 2 ex. el 23-IX (PIR).
- Aire:** (Sant Lluís). Pas prenupcial, 44 ex. capturats per a anellament entre l'1-IV fins al 15-V. Una tendència negativa del **-64,4** % per al període 1995-2024 (mitjana= 87,1; n= 2.525). Un màxim de 12 captures durant la pentada del 6-V fins al 12-V (AIRE).
- Eivissa:** Pas prenupcial, almenys present entre el 10-V amb 1 ex. i el 23-V (1 ex.) ambdós a Sant Joan (SDW/Observation).

Curruca nisoria (abans *Sylvia nisoria*). Busqueret esparverenc, busqueret falcó-tortor (MA-FO). Curruca gavilana. Barred Warbler
Estatus: migrant rar (MA-ME-FO-CA). **Selecció:** tots els registres rebuts. Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Curruca curruca (abans *Sylvia curruca*). Busqueret xerraire. Curruca zarcerilla. Lesser Whitethroat
Estatus: migrant rar (MA-ME-FO-CA-DR).
Selecció: tots els registres rebuts.
Aire: (Sant Lluís). **1** ex. de 2n any calendari és capturat per a anellament el 20-IV.
 Per a més informació d'aquests registres homologats, vegeu-ne l'informe del Comitè de Rareses de Balears.

Curruca hortensis (abans *Sylvia hortensis*). Busqueret emmascarat, enganyapastors emmascarat (EI). Curruca mirlona. Western Orphean Warbler
Estatus: migrant escàs (ME) i rar (MA-EI-FO-CA-DR). **Selecció:** tots els registres rebuts.
 Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Curruca ruppeli (abans *Sylvia ruppeli*). Busqueret de Rüppell. Curruca de Rüppell. Rüppell's Warbler
Estatus: accidental (CA). **Selecció:** tots els registres rebuts.
 Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Curruca melanocephala (abans *Sylvia melanocephala*). Busqueret de capnegre, enganyapastors de cap negre (EI), ganyet de cap negre (FO). Curruca cabecinegra. Sardinian Warbler
Estatus: reproductor i sedentari abundant, i moderat (FO-DR). Hivernant escàs (MA). Migrant escàs (MA-ME).
Selecció: reproducció.

Mallorca: Reproducció. Primers cants a partir del 19-II a la vall de Bóquer (Pollença) (THS/Observation), polls del 20-IV fins al 28-VI a s'Albufera (RES, VIC, PNAM), i joves des del 3-VI fins al 4-VII a s'Albufera i Albufereta (PNAM; TOM/eBird).

Dragonera: 8 ex. entre ells un jove el 28-V (TOM/eBird).

Menorca: Algondaret Nou, Maó. Primer juvenil capturat per a anellament el 31-V (MEN).

Eivissa: Primers cants a partir del 20-III a Sant Josep (BSS/Observation), polls del 10-VI al camí des Fornàs (GAB/eBird).

Formentera: un màxim de 18 ex. a la platja des Trucadors el 3-IV (MTF/Observation).

Curruca iberiae (abans *Sylvia cantillans iberiae*). Busqueret de garriga, busqueret garriguer (MA-EI-FO). Curruca carrasqueña occidental. Western Subalpine Warbler

Estatus: Migrant moderat, i escàs (DR).

Selecció: fenologia.

Mallorca: Pas prenupcial, primeres cites el 2-IV (1 ex.) a ses basses de Magaluf (Calvià) (HIN/eBird), i el 19-IV (1 ex.) a Son Real (Santa Margalida) (BGN/Observation).

Darrers registres el 4-V (2 mascles) al cap de Formentor (Pollença) (HKS/Observation), i el 2-V (1 ex.) a s'Albufera (VSV/Observation).

Pas postnupcial, el 17-IX (1 ex.) a Mortitx (Escorca) (MAC/eBird).

Cabrera: Pas prenupcial, mascle de segon any el 19-V (RES/eBird).

Dragonera: Postnupcial, almenys present entre el 16-IX (1 mascle) i el 18-IX (1 jove) (JMO/Observation).

Aire: (Sant Lluís). 9 ex. capturats per a anellament entre els dies 7 (1 ex.) i 10-IV (4 ex.) (CRV/eBird).

Eivissa: Pas prenupcial, present entre el 2-IV (1 ex.) a Can n'Andreu (Sant Antoni) (SEP), i el 30-IV (1 ex.) a Buscastell (Sant Antoni) (YAR).

Curruca subalpina (abans *Sylvia cantillans moltonii*). Busqueret de garriga tirrènica, busqueret garriguer tirrènica (MA-EI-FO). Curruca tirrènica. Moltoni's Warbler

Estatus: reproductor moderat (MA), i escàs (CA). Migrant moderat, i escàs (DR). Cria esporàdica 2004 (ME).

Selecció: reproducció i fenologia.

Mallorca: Prenupcial, primeres cites el 30-III (2 ex.) al cap de Formentor (Pollença) (KRG/Observation), el 2-IV (1 ex.) a Cas Saboner (Calvià) (SCH/Observation), i el 3-IV (2 ex.) a la talaia de Son Jaumell (Capdepera) (GAU/eBird).

Embassament de Cúber, Escorca. Primers cants a partir del 19-IV amb 2 mascles (NLS/eBird), observació de polls a partir del 15-VI (SOL/eBird), i joves del 14-VII (HRT/eBird).

Postnupcial, darrera cita el 2-VIII amb un grup familiar de 4 ex. a l'embassament de Cúber (MAC-CST/eBird).

Cabrera: Primera arribada el 26-IV amb 2 mascles (TSL/Observation).

Aire: (Sant Lluís). 5 ex. capturats per a anellament entre els dies 12 (1 ex.) i 13-IV (4 ex.) (CRV/eBird).

Eivissa: Nidificació. Torrent de Buscastell (Sant Antoni), mascle reclamant aprop del Broll el 7-VI, és el segon any consecutiu que apareix en aquest lloc (SEP), mascle i femella al Broll el 9-VI (SDW/eBird), femella alimentant 2 joves coa-curts al torrent el 25-VI, i 1 ex. al torrent el 4-VII (SEP). Es confirma per primera vegada la cria a l'illa (N. de l'ed.).

Curruca subalpina/cantillans (abans del canvi taxonòmic). Busqueret de garriga, busqueret garriguer (MA-EI-FO). Curruca de Moltoni/Curruca carrasqueña. Moltoni's Warbler/

Aire: (Sant Lluís). Pas prenupcial, per al tractament de dades conjuntes, les espècies dels diferents taxons reconeguts actualment com a *Curruca subalpina*, *Curruca iberiae* i *Curruca cantillans* s'agrupen en aquest apartat. 44 ex. capturats per a anellament entre l'1-IV i 15-V. Una tendència negativa del **-38,8** % per al període 1995-2024 (mitjana = 71,9; n = 2.085). Un màxim de 13 captures durant la pentada de l'1-IV fins al 5-IV (AIRE).

Curruca cantillans (abans *Sylvia cantillans cantillans/albistriata*). Busqueret de garriga, busqueret garriguer (MA-EI-FO). Curruca carrasqueña oriental. Eastern Subalpine Warbler

Estatus: accidental. **Selecció:** tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Curruca cantillans albistriata (abans *Sylvia cantillans albistriata*). Busqueret de garriga, busqueret garriguer (MA-EI-FO). Curruca carrasqueña oriental. Eastern Subalpine Warbler

Estatus: accidental (ME-FO-CA).

Selecció: tots els registres rebuts.

Aire: (Sant Lluís). És capturat 1 ex. de 2n any calendari el 14-IV i 1 ex. de 2n any calendari el 15-IV.

Per a més informació d'aquests registres homologats, vegeu-ne l'informe del Comitè de Rareses de Balears.

Curruca communis (abans *Sylvia communis*). Busqueret de batzer, enganyapastors (EI). Curruca zarcera. Common Whitethroat

Estatus: migrant abundant (MA-ME-FO-CA), moderat (EI), i escàs (DR).
Selecció: fenologia.

Mallorca: Pas prenupcial, primer registre el 14-IV (1 ex.) a l'Albufereta, el 19-IV (1 ex.) a s'Albufera (RES, VIC, RNSA, PNAM), i el 28-IV al far de Formentor (Pollença) amb 1 ex. (BAZ, PAM) i a la vall de Bóquer (Pollença) amb 1 mascle (HKS/Observation).

Darrera cita el 13-VI (1 ex.) a l'Albufereta (GVR/Observation), el 3-V (4 ex.) al parc dels Pins (Port de Pollença) (RES/eBird), i l'1-V (2 ex.) a s'Albufera (PNAM).

Pas postnupcial, primeres cites el 18 i 22-VIII (1 ex.) a s'Evangèlica (Andratx) (BAZ).

Cabrera: Pas prenupcial, almenys present entre el 16-IV (1 mascle) (VIC) fins al 19-V (3 ex.), amb un màxim de 10 ex. el 30-IV (JMO/Observation).

Dragonera: Pas prenupcial, el 3 i 12-IV (1 ex.) (JMO/Observation).

Aire: (Sant Lluís). Pas prenupcial, 74 ex. capturats per a anellament entre l'1-IV fins al 15-V. Una tendència negativa del **-45,1** % per al període 1995-2024 (mitjana= 134,8; n= 3.909). Un màxim de 26 captures durant la pentada de l'1-V fins al 5-V (AIRE).

Eivissa: Pas prenupcial, almenys present entre el 30-IV (1 ex.) a Can Tomàs (Sant Antoni) (YAR), i el 18-V (1 ex.) a ses Salines (Sant Josep) (SDW/Observation).

Curruca conspicillata (abans *Sylvia conspicillata*). Busqueret trenca-mates, busqueret carritxer (MA-EI-FO). Curruca tomillera. Spectacled Warbler

Estatus: reproductor escàs (ME) i rar (MA). Migrant escàs (ME-EI) i rar (MA-FO-CA-DR).

Selecció: reproducció i fenologia.

Cap registre rebut.

Curruca sarda (abans *Sylvia sarda*). Busqueret sard. Curruca sarda. Marmora's Warbler

Estatus: migrant rar (ME-CA). *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Curruca undata (abans *Sylvia undata*). Busqueret roig, busqueret roig coallarg (MA-FO), enganyapastors roig coallarg (EI). Curruca rabilarga. Dartford Warbler

Estatus: reproductor i sedentari moderat (ME) i escàs (MA). Hivernant moderat (MA-EI) i escàs (ME-CA). Migrant escàs, i rar (CA-DR).

Selecció: fenologia, i reproducció.

Mallorca: el 16-XII amb 1 jove al Salobrar de Campos (RES/eBird).
Eivissa: Hivernada, present a partir del 18-XI amb 1 ex. reclamant a ses Salines (Sant Josep) (SEP/eBird).

Curruca balearica (abans *Sylvia balearica*). Busqueret coallarg, xorrec (MA), enganyapastors coallarga (EI), ganyet (FO). Curruca balear. Balearic Warbler

Estatus: reproductor i sedentari abundant (MA-EI), i moderat (FO-CA-DR). Extingit com a reproductor (ME).

Selecció: reproducció i tots els registres rebuts a ME.

Mallorca: península de Formentor, Pollença. 1 jove el 3-VI (TOM/eBird), i 3 joves el 17-VII al far (HRT/eBird).

Cabrera: un grup familiar amb 4 ex. cercant i menjant insectes sobre fonollasses (*Daucus carota*) a l'illot na Pobra el 20-VI (MMA).

Dragonera: (Andratx). 1 adult i 2 joves el 3-VII (TOM/eBird)

Regulus ignicapilla. Reietó cellabanc (ME), reiet (MA-EI-FO). Reyzeuelo listado. Common Firecrest

Estatus: reproductor i sedentari abundant (MA-EI), moderat (ME), escàs (FO), i rar (CA). Hivernant moderat (CA), i escàs (MA). Migrant escàs (MA-ME-FO). Accidental (DR).

Selecció: reproducció, fenologia i dades d'interès.

Mallorca: Calvià. Un màxim de 13 ex. el 16-V al camí de Son Pillo (BEN/eBird).

Cabrera: 1 ex. el 3-XII (JMO/Observation).

Dragonera: 1 ex. el 18-IV. Almenys present entre el 16 (1 ex.) i el 20-IX (3 ex.) (JMO/Observation).

Eivissa: observació de joves a partir del 15-VI al camí de cap Falcó (Sant Josep) (GUI/eBird).

Formentera: observador de joves a partir del 25-V a es Pujols (SEP/eBird).

Regulus regulus. Reietó d'hivern, reietó (MA-ME-EI-FO). Reyzeuelo sencillo. Goldcrest

Estatus: hivernant moderat (ME) i escàs (MA-EI-CA-DR). Migrant moderat (ME), escàs (MA-FO-DR), i rar (CA).

Selecció: fenologia.

Mallorca: Prenupcial, darreres cites el 6-III amb 1 ex. a l'Albufereta (RES, VIC, RNSA), el 2-III (1 ex.) a Escorca (BAU), i el 23-II (1 ex.) al parc dels Pins (Port de Pollença) (TSS/eBird).

Postnupcial, primers registres el 30-X amb 1 ex. a Ariant (Pollença) (GON) i 2 ex. a l'embassament de Cúber (Escorca) (INN/eBird), i l'1-XI (2 ex.) a Galatzó (Calvià) (GRP/eBird).

Dragonera: Pas prenupcial, el 3-II amb 1 ex. (JMO/Observation).

Menorca: Binifamís, Alaior. 1 ex. el 20-IX (VEG, VLN).

Eivissa: Postnupcial, primera cita el 24-X amb 3 ex. a els Amunts (SDW/Observation).

Troglodytes troglodytes. Passaforadí, salvatget (ME), satgeta (EI). Chochín. Eurasian Wren

Estatus: reproductor i sedentari abundant (MA), moderat (EI), i escàs (DR). Hivernant escàs (ME), i rar (CA). Migrant escàs (ME), i rar (FO).

Selecció: reproducció i dades d'interès.

Eivissa: primers cants el 20-IV amb 1 mascle a es Amunts (SDW/Observation).

Tichodroma muraria. Pela-roques. Treparriscos. Wallcreeper

Estatus: accidental (MA-ME-FO-CA-DR). **Selecció:** tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Pastor roseus (abans *Sturnus roseus*). Estornell rosat. Estornino rosado. Rosy Starling

Estatus: accidental (MA-CA). **Selecció:** tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Sturnus vulgaris. Estornell, tornell (EI). Estornino pinto. Common Starling

Estatus: reproductor i sedentari escàs (MA). Hivernant abundant (MA-ME-EI-DR), moderat (FO), i escàs (CA). Migrant abundant (MA-ME-DR) i moderat (EI-FO-CA).

Selecció: reproducció, fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: s'Albufera. Màxims mensuals a la colgada, i en parèntesis nidificants. Observació de joves a partir de l'11-VI (RES, VIC, PNAM; MAC/eBird; GGL/Observation).

Albufereta, Pollença. Màxims mensuals a la colgada, i en parèntesis nidificants (RES, VIC, RNSA).

Dates	I	II	30*III	IV	V	22-VI	VII	20*VIII	IX	X	XI	XII
Albufera	50.000	5.000	150/7*	0	(2)	(100) J	(300) J	(100)	200	1.000	1 M	1 M
Albufereta	10	18	7	0	0	(6)	0	3*	+	+	+	+

Eivissa: Prenupcial, darrera cita el 21-I amb 1 ex. a Santa Eulària (SDW/Observation).

Presència estival, 4 ex. el 6-VII a Can Illetas (San Josep) (DVR).

Postnupcial, primer registre el 30-IX amb 1 ex. a Santa Eulària (DKK/Observation). Un màxim de 80 ex. el 4-X a Sant Josep (PRG).

Sturnus unicolor. Estornell negre. Estornino negro. Spotless Starling
Estatus: reproductor i sedentari escàs (MA-ME-EI). Migrant rar (CA). Accidental (FO).

Selecció: reproducció, fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: Albufereta. Un màxim de 25 ex. el 4-II (RES, VIC, RNSA). Can Cullerassa, Pollença. Probable nidificació amb 10 ex. el 23-III (BEN-HIN-MAC/eBird). Prat de Sant Jordi, Palma. Probable nidificació amb 11 ex. el 21-III (MAC/eBird). Polígon de Son Rossinyol, Palma. 2 ex. entrant i sortint del niu en un pal elèctric el 10-IV (SAE/eBird). Sa Barrala, Campos. Probable nidificació amb 7 ex. el 17-IV (MAC/eBird). Polígon de Som Oms, Palma. Probable nidificació amb 10 ex. el 19-IV, i un grup de 6 ex. el 30-IX (MCM/eBird). Es Secar de Son Sardina, Palma. 4 ex. un d'ell amb menjar al bec el 22-IV (BAZ/eBird). Pla de Vilafranca. Niu en fanal de la depuradora amb 4 ex. un d'ells amb menjar al bec el 29-IV (NIC/eBird). Un grup de 47 joves amb algun adult el 3-VI (NIC/eBird). S'Albufera. Observació de joves a partir del 5-VI. Uns màxims de 38 ex. el 4-VI (RES, VIC, PNAM) i 60 ex. amb adults i joves el 8-VII (GGT/Observation). Son Bosc, Muro. Un màxim de 100 ex. (adults i joves) el 21-VI (KRT/eBird).

Eivissa: ses Salines, Sant Josep. Colònia de nidificació als conreus des Codolar amb almenys 24 ex. (adults i joves) posats en figuera a prop de la torre on nidifiquen el 27-VI (GAB/eBird), i un màxim de 46 ex. l'11-VII (CST/eBird).

Zoothera dauma. Griva daurada. Zorzal Dorado. Scaly Thrush
Estatus: accidental (ME). *Selecció*: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Turdus philomelos. Tord, tord blanc (ME). Zorzal común. Song Thrush
Estatus: hivernant abundant. Migrant abundant.
Selecció: fenologia i dades d'interès.
Mallorca: Pas prenupcial, darrers registres el 30-V amb 1 ex. a Felanitx (JMO/Observation), el 23-IV (1 ex.) a l'Albufereta (RES, VIC, RNSA), i el 20-IV (1 ex.) a Son Real (Santa Margalida) (BNG/Observation).
Uns màxims de 185 ex. han vingut a la beurada al llarg del matí a sa Comuna de Bunyola el 3-I (CES/eBird), i 105 ex. a la vall d'Orient (Bunyola) el 4-I (BEN-MAC/eBird) i a Galatzó (Calvià) el 19-I (SOL/eBird).

Presència a l'estiu. 1 ex. a l'abeurador de ca nostra els dies 24, 25-VI i 10-VIII a es Capdellà (Calvià)(SOL/eBird).

Pas postnupcial, primeres cites el 29-IX escoltats 2 ex. a Son Moragues (Valldemossa) (GON), el 4-X a s'Albufera (2 ex.) i a l'Albufereta (1 ex.) (RES, VIC, PNAM, RNSA), i el 5-X (1 ex.) a Felanitx (JMO/Observation).

Un màxim de 1.380 ex. censats a les hores de fosc absolut. A la posta de sol i clarejar, altres 105 ex. més, que no se sumen per possibles repeticions d'exemplars sedimentats a Can Bauma (Alcúdia) el 18-X (RES/NFC).

Escoltes d'exemplars en vol nocturn al vespre, durant 12:00 h/n, **8.556** ex. des del 10-X al 14-XI a tres localitats: Can Bauma (Alcúdia), Serral de ses Monges (Inca), i cap de Formentor (Pollença) (RES/NFC).

Gravats en pas nocturn	10-X	11-X	12-X	13-X	18-X	19-X	22-X	23-X	24-X	25-X	31-X	1-XI	5-XI	6-XI	7-XI	8-XI	9-XI	13-XI	14-XI
Can Bauma	286	103	208	218	1380	203	338	1355	518	346	1165	201	305	229	229	228	210	116	147
Serral	-	-	168	-	-	358	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Formentor	-	-	-	-	-	245	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Cabrera: Postnupcial, 120 ex. el 20-X (BAZ-SCH/eBird).

Menorca: Pas postnupcial, 1 ex. l'1-X a les Salines de Mongofre (Maó) (PIR).

Eivissa: Pas prenupcial, darrera cita el 24-III (1 ex.) a Sant Antoni (BSS/Observation).

Pas postnupcial, primer registre el 5-X (varis ex.) a Can Parentona (Sant Antoni) (MAR).

Formentera: Pas prenupcial, 1 ex. el 3-IV a la Mola (MTF/Observation).

***Turdus viscivorus*.** Grívia, tord rei (ME), tord grívia (EI), grívia (FO). Zorzal charlo. Mistle Thrush

Estatus: hivernant moderat (MA-EI) i escàs (ME-CA). Migrant moderat (MA) i escàs (ME-EI-FO-CA-DR).

Selecció: fenologia.

Mallorca: Hivernada, darreres cites el 29-I amb 17 ex. a Son Fortesa (Puigpunyent) (BEN-SOL/eBird), el 7-I amb 2 ex. a s'Albufera (RES, VIC, PNAM), i el 3-I (1 ex.) a s'Evangèlica (Andratx) (BAZ).

Un màxim de 50 ex. venen en grups d'entre 5 i 10 ex. a la beurada al llarg del matí a sa Comuna de Bunyola el 2-I (CES/eBird).

Pas postnupcial, primers registres el 5-X amb 1 ex. a Felanitx (JMO/Observation), el 14-X (1 ex.) a s'Evangèlica (BAZ), i el 20-X un grup de 19 ex. al cap de ses Salines (CST-QUI/eBird).

Un màxim de 42 ex. al cap de ses Salines el 2-XI (JMO/Observation).

Cabrera: Postnupcial, primera cita el 20-X amb 14 ex. (BAZ-SCH/eBird).

Menorca: hivernada, Golf de Son Parc (es Mercadal), 1 ex. el 9-I i 2 ex. a partir del 6-XII fins al final de l'hivern (PIR).

Eivissa: Prenupcial, darrera cita el 16-II amb 1 ex. a Sant Joan (SDW/Observation).

Postnupcial, primera cita el 20-X amb 1 ex. de primer any a un conreu de ses Salines (SDW/Observation). Un màxim d'un grup de 13 ex. al pla de Sant Mateu l'1-XII (CST/eBird).

***Turdus iliacus*.** Tord cellard, tord d'ala roja (ME). Zorzal alirrojo. Redwing
Estatus: hivernant escàs (MA-ME-EI) i rar (FO-CA). Migrant escàs (MA-ME-EI), i rar (FO-CA-DR).

Selecció: fenologia.

Mallorca: hivernada, un màxim de 12 ex. venen al llarg del matí, fins a 5 aus al mateix temps a la beurada de sa Comuna de Bunyola el 3-I (CES/eBird).

Pas prenupcial, darrers registres el 5-IV amb 1 ex. gravat a les 23:05 h al Serral de ses Monges (Inca) (RES/NFC), i el 20-II (1 ex.) a Galatzó (Calvià) (SOL/eBird).

Pas postnupcial, primers registres el 18-X amb 1 ex. gravat a les 5:59 h a Can Bauma (Alcúdia) (RES/NFC), el 19-X (1 ex.) al cap de Formentor (Pollença) (RES/eBird), i el 21-X (1 ex.) a Felanitx (JMO/Observation).

Escoltes d'exemplars en vol nocturn al vespre, durant 12:00 h/n, **50** ex. des del 18-X al 28-XI a tres localitats: Can Bauma (Alcúdia), Serral de ses Monges (Inca), i al pinar des Trenc (Campos) (RES/NFC).

Gravats en pas nocturn	18-X	23-X	24-X	25-X	31-X	1-XI	5-XI	6-XI	7-XI	8-XI	9-XI	13-XI	14-XI	15-XI	28-XI
Can Bauma	1	4	2	1	8	2	3	3	5	6	-	1	7	1	-
Serral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	-	1	-
Pinar Trenc	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1

Cabrera: Pas postnupcial, el 20-X amb 2 ex. (BAZ-SCH/eBird), i el 25-X amb 1 ex. (RES/eBird).

hivernada, un màxim de 2 ex. el 3-XII (JMO/Observation).

Menorca: Hort d'es Lluïsser, Alaïor. 1 adult és capturat per a anellament el 4-I (CAU, ESC, MEN, VEG, VLN)

Golf de Son Parc, es Mercadal. 1 ex. el 21-XII (PIR).

Eivissa: Pas prenupcial, darrera cita el 25-I amb 1 ex. a Sant Joan (SDW/Observation).

Pas postnupcial, primer registre el 24-X amb 1 ex. reclamant a Sant Joan (SDW/Observation).

Turdus merula. Mèrlera, tord negre (ME-FO). Mirlo común. Common Blackbird

Estatus: reproductor i sedentari abundant (MA-EI), moderat (ME), escàs (DR), i rar (FO-CA). Hivernant moderat (MA-ME-EI) i escàs (FO-CA). Migrant moderat, i rar (CA).

Selecció: reproducció i dades d'interès.

Mallorca: s'Albufera. Observació de joves a partir del 20-V (RES, VIC, PNM). Reproducció. Construcció de nius del 16-II a Palma (SAS) fins al 10-III a sa Cabaneta (HIN/eBird), observació de polls a partir del 21-III al bosc de Bellver (Palma) (NIC/eBird) fins al 18-VI al port de Pollença (LMT/Observation), i joves del 2-IV a Palma (SAS) fins al 14-VIII a la Gola (Port de Pollença) (CTOG, TOM/eBird).

Dragonera: observació de polls nounats el 5-IV i 12-IV (JMO/Observation).

Turdus pilaris. Tord burell. Zorzal real. Fieldfare

Estatus: hivernant escàs (MA-ME-EI), i rar (CA). Migrant escàs (MA-ME-EI) i rar (FO-DR).

Selecció: fenologia i dades d'interès.

Mallorca: Hivernada, darreres cites el 15-II amb 1 ex. a s'Albufera (RES, VIC, PNM), i el 21-I amb 1 ex. a Mortitx (Escorca) (BEN-MAC/eBird).

Pas postnupcial, primera cita el 27-X amb 1 ex. a s'Albufera (PNM).

Cabrera: 4 ex. el 23-I (VIC).

Turdus torquatus. Tord flassader, tord de collaret (ME). Mirlo capiblanco. Ring Ouzel

Estatus: hivernant moderat (MA) i escàs (EI-CA) i rar (ME-DR). Migrant moderat (MA), escàs (ME-EI-FO-CA), i rar (DR).

Selecció: fenologia i dades d'interès.

Mallorca: hivernada, un màxim de 3 ex. al puig de Cura (Algaida) el 4-I (BEN-MAC/eBird).

Pas prenupcial, darrera cita el 14-III amb 1 ex. a Ariant (Pollença) (GON).

Pas postnupcial, primers registres el 19-X amb 4 ex. gravats a les 06:45 h/1 ex., 07:24 h/1, 07:35 h/2 aus. Se les veu entrar del mar (1 mascle adult i 1 jove), a partir d'aquell moment se senten sovint, però són les mateixes aus que han sedimentat a la zona al cap de Formentor (Pollença). El 19-X amb 1 ex. gravat a les 04:30 h al Serral de ses Monges (Inca) (RES/NFC), i el 23-X (1 ex.) al embassament de Cúber (EWS/Observation).

Pas postnupcial, primera cita el 20-X amb 8 ex. (BAZ-SCH/eBird).

Menorca: Golf de Son Parc, es Mercadal. 1 mascle el 24-III (CAU, VEG, VLN).

Eivissa: Pas postnupcial, primera cita el 20-X amb 1 ex. a Buscastell (Sant Antoni) (ESR, DMZ).

Formentera: Pas prenupcial, darrera cita el 17-III amb 1 ex. reclamant a la Mola (SEP) i a es Pujols (GUI/eBird).

Cercotrichas galactotes. Coadreta. Alzacola. Rufous-tailed Scrub Robin
Estatus: migrant rar. *Selecció*: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Muscicapa striata striata. Papamosques, matamosques (MA), menja-mosques (ME). Papamoscas gris. Spotted Flycatcher

Estatus: migrant abundant (MA-EI-FO), moderat (ME-CA), i escàs (DR).

Selecció: fenologia.

Mallorca: Pas prenupcial, primera cita el 21-IV amb 1 ex. a s'Evangèlica (Andratx) (BAZ), el 23-IV (1 ex.) a l'Albufereta (BNG/Observation), i el 24-IV a Son Pax (Palma) amb 1 ex. (MMA) i a Esporles amb 2 ex. (BAU).

Darrers registres el 4-V amb 1 ex. a l'Albufereta (RES, VIC, RNSA) i a Can Vairet (NIC/eBird), i el 30-IV (1 ex.) a Can Cullerassa (Pollença) (NIC/eBird).

Pas postnupcial, primers registres el 8-IX (1 ex.) a sa Marina Gran de Santanyí (JMO/Observation), el 14-IX amb 1 ex. a la bassa de Can Guidet (ZMR/eBird), i el 25-IX (1 ex.) a prop de ses Cases de Cala Murta (Pollença) (GON). Darrera cita el 28-IX (1 ex.) a s'Evangèlica (Andratx) (BAZ/eBird).

Cabrera: Pas prenupcial, almenys present des del 30-IV (1 ex.) fins al 17-V (9 ex.) (JMO/Observation; RES/eBird).

Dragonera: Pas prenupcial, almenys present des del 4-V amb 1 ex. fins al 15-V amb 2 ex. (JMO/Observation; NIC/eBird).

Pas postnupcial, almenys present des del 16-IX (1 ex.) fins al 18-IX (1 ex.) (JMO/Observation).

Menorca: Pas prenupcial, primeres cites el 18-IV amb 1 ex. al camí de Tramuntana (es Mercadal) (PIR), i el 20-IV (1 ex.) a es Mercadal (BLB/Observation).

Pas postnupcial, darrera cita el 25-XI amb 1 ex. al Parc Rubió i Tudurí (Maó) (PIR).

Aire: (Sant Lluís). Pas prenupcial, 79 ex. capturats per a anellament entre l'1-IV fins al 15-V (AIRE).

Eivissa: Pas prenupcial, 1 ex. el 30-IV al Port d'es Torrent (FLY/eBird).
Pas postnupcial, primera cita el 2-IX (1 ex.) al N de Sant Joan (RTR/Observation). Darrera el 5-X (2 ex.) al pla de Sant Mateu (SEP/eBird).

Muscicapa striata/thyrrenica (abans del canvi taxonòmic). Papamosques, matamosques (MA), menjamosques (ME). Papamoscas gris / Papamoscas mediterraneo . Spotted Flycatcher / Mediterranean Flycatcher

Estatus: reproductor abundant (MA-EI), moderat (ME-FO-CA), i escàs (DR). Migrant abundant (MA-EI), moderat (ME-FO), i escàs (DR).

Selecció: fenologia.

Mallorca: Prenupcial, primers registres el 18-IV (1 ex.) a Ariant (Pollença) (GON), i el 28-IV amb 7 ex. gravats en vol nocturn el primer a les 04:04 h i l'últim a les 06:21 h a la talaia d'Albercutx (Pollença) (RES/NFC).

Aire: (Sant Lluís). Pas prenupcial, 116 exemplars capturats per a anellament entre l'1-IV fins al 15-V. Una tendència positiva del **49** % per al període 1995-2024 (mitjana= 77,8; n= 2.257). Un màxim de 44 captures durant la pentada del 26-IV fins al 30-IV (AIRE).

Eivissa: Prenupcial, primera cita el 23-IV (1 ex.) al camí des Fornàs (Sant Antoni)(MAR).

Postnupcial, darrer registre el 26-IX (2 ex.) a Sant Joan (VDM/Observation).

Muscicapa tyrrenica balearica. Papamosques, matamosques (MA), menjamosques (ME). Papamoscas balear. Mediterranean Flycatcher

Estatus: reproductor abundant (MA-EI), moderat (ME-FO), i escàs (CA-DR). Migrant moderat (CA), i escàs (DR).

Selecció: reproducció, fenologia.

Mallorca: Prenupcial, primeres cites el 16-IV (1 ex.) a Felanitx (JMO/Observation), el 17-IV amb 1 ex. a Sencelles (MOU), el 20-IV a Son Moragues (Valldemossa) amb 2 ex. (GON) i a Mortitx (Escorca) amb 8 ex. (BAZ), el 21-IV (1 ex.) a Esporles (BAC, GRD), i el 23-IV amb 2 ex. a l'Albufereta (RES, VIC, RNSA).

Reproducció, exemplar amb material al bec per a la construcció del niu el 14-V al camí de Muleta (Sóller) (FIO), i segona posta el 15-VII a Santa Maria (BUS). Observació de polls volanders a partir del 2-VI a s'Albufera (CST/eBird) fins al 19-VIII a Galatzó (Calvià) (SOL/eBird), joves del 20-V al Port de Pollença (KRR/eBird) fins al 14-VII a Andratx (MUT).

Postnupcial, darrers el 4-XI amb 1 ex. al Parc BIT (Palma) (MAC-CST/eBird), el 2-XI (1 ex.) al cap de ses Salines (Santanyí) (JMO/Observation), i el 17-X amb 1 ex. a l'Albufereta (RES, VIC, RNSA).

Dragonera: Prenupcial, primera cita el 22-IV amb 10 ex. (JMO/Observation).

- Aire:** (Sant Lluís). Pas prenupcial, 116 ex. capturats per a anellament entre l'1-IV fins al 15-V (AIRE).
- Eivissa:** Prenupcial, primera cita el 15-VI amb 4 ex. al camí cap Falcó (Sant Josep) (GUI/eBird).
Santa Eulària. Observació de joves a partir del 7-VIII (BKX/Observation).
Pas postnupcial, darrera cita el 3-IX amb 10 ex. a Sant Joan (RTR/Observation).
- Formentera:** 2 ex. el 23-VI a la Mola (MUN).

***Muscicapa tyrrenica tyrrenica*.** (abans *Muscicapa striata tyrrenica*) Papamosques, matamosques mediterrani (MA), menjamosques (ME). Papamoscas gris mediterráneo. Mediterranean Flycatcher

- Estatus:** accidental (ME).
- Selecció:** tots els registres rebuts.
- Aire:** (Sant Lluís). Pas prenupcial, 2 ex. capturats per a anellament entre l'1-IV fins al 15-V.
- Registre pendent d'homologació pel Comitè de Rareses de la SEO.

***Erithacus rubecula*.** Rupit, ropit (MA-ME), gavatxet roig (EI), fredolai (FO). Petirrojo. European Robin

- Estatus:** reproductor i sedentari rar (MA). Hivernant abundant. Migrant abundant.
- Selecció:** reproducció, fenologia.
- Mallorca:** Pas prenupcial, darreres cites el 5-V amb 4 ex. al parc dels Pins (Port de Pollença) (MAC-CST/eBird), el 25-IV amb 1 ex. al golf de Son Quint (Palma) (MAC/eBird), el 24-IV amb 2 ex. a l'Albufereta, i el 29-III amb 1 ex. a s'Albufera (RES, VIC, RNSA, PNAM), i el 24-III amb 2 ex. a Esporles (BAC, GRD).
Presència primavera-estiu: Esporles, sentit 1 ex. el 5-V al bosc de Son Tries i el 1-VI al barranc de Can Girà (GRD).
Son Moragues, Valldemossa. Escoltats 2 ex. el 19-V (GON).
Polígon de Llevant, Palma. Escoltat des del 27-V (1 ex.) fins al 22-VIII (2 ex.) (ZMR/eBird).
Camí de Maristella, Esporles. Exemplar cantant el 8-VI (FIO).
Son Pax, Palma. Escoltat des del 9-VI (1 ex.) fins al 30-VII (2 ex.), amb un màxim de 3 ex. reclamant els dies 13-VI, 15 i 24-VII (MMA).
Camí al Castell d'Alaró. Exemplar cantant a prop del restaurant es Verger el 18-VI (FIO).
Pas postnupcial, primeres cites el 22-VIII amb 1 ex. a sa Coma d'en Vidal (Estellencs), el 18-IX (1 ex.) a Ariant (Pollença) (GON), el 30-IX (1 ex.) a l'Albufereta (RES, VIC, RNSA),
- Cabrera:** Pas prenupcial, 1 ex. el 17-IV (VIC).

Pas postnupcial, 1 ex. el 15-IX (MUN, PAM, SOL, MOU).

Dragonera: Pas prenupcial, darrera cita el 6-IV amb 1 ex. (JMO/Observation).

Menorca: Pas prenupcial, darrera cita el 2-V amb 1 ex. a Son Parc (es Mercadal) (CAU).

Eivissa: Pas prenupcial, darrer ex. el 20-III al pàrquing de l'aeroport (Sant Josep) (PRG).

Presència primaveral-estival: 1 ex. al passeig Marítim de Vila el 9-V (SEP).

Ses Feixes, Vila. A les basses, 1 ex. surt volant en direcció al passeig Marítim el 19-VII (SEP/eBird).

Pas postnupcial, primeres cites el 20-IX amb 1 ex. a es Broll de Buscastell (YAR).

Formentera: Pas prenupcial, 1 ex. el 14-III a punta Prima (PRG).

Luscinia megarhynchos. Rossinyol. Ruiseñor común. Common Nighthingale

Estatus: reproductor abundant (MA), moderat (ME) i escàs (EI). Migrant abundant (MA-EI-FO), moderat (ME), i escàs (CA-DR).

Selecció: reproducció i fenologia.

Mallorca: Pas prenupcial, primeres cites l'1-IV amb 1 ex. a s'Albufera (RES, VIC, PNAM), el 4-IV amb 4 ex. a Ariant (Pollença) (GON), el 5-IV 1 ex. cantant a Esporles (GRD), i el 6-IV amb 1 ex. cantant a Son Pax (Palma) (MMA).

Reproducció. Observació de joves a partir del 5-VII a Escorca (GGL/Observation).

Pas postnupcial, darrer registre el 23-IX amb 1 ex. a s'Albufera (RES, VIC, PNAM) i a Felanitx (JMO/Observation), i el 17-IX amb 1 ex. a l'Albufereta (RES, VIC, RNSA).

Dragonera: Pas prenupcial, 3 ex. el 3-IV (JMO/Observation).

Menorca: Pas postnupcial, primeres cites el 10-IX (5 ex.) al camí Punta Rotja (CRT), i el 15-IX amb 1 ex. a Son Bou (Alaior) (PIR). Darrer registre el 21-IX (10 ex.) a cala Galdana (BSH/eBird).

Aire: (Sant Lluís). Pas prenupcial, 68 ex. capturats per a anellament entre l'1-IV fins al 15-V. Una tendència negativa del **-35,4 %** per al període 1995-2024 (mitjana= 102,1; n= 2.962). Un màxim de 21 captures durant la pentada de l'1-V fins al 5-V (AIRE).

Luscinia svecica. Blaveta. Pechiazul. Bluethroat

Estatus: hivernant moderat (MA) i escàs (ME-EI). Migrant escàs (MA-ME-EI) i rar (FO-CA).

Selecció: fenologia.

Mallorca: Pas prenupcial, darrera cita el 7-IV amb 1 ex. a Son Bosc (Muro) (HIN-LOP/eBird), i el 12-III (1 ex.) a la depuradora s'Albufera (BAU).

Pas postnupcial, primers registres el 5-IX (1 ex.) al Salobrar de Campos (RES/eBird), l'11-IX (1 ex.) a l'Albufereta, i el 15-IX (1 ex.) a s'Albufera (RES, VIC, RNSA, PNAM).

Un màxim de 5 ex. a es Ras en s'Albufera el 4-XI (MON).

Cabrera: Postnupcial, 1 ex. el 15-IX (MUN, PAM, SOL, MOU).

Menorca: Vergers de Sant Joan, Maó. 1 ex. el 22-I i el 21-X (PIR).

Santa Marianna, Maó. 1 ex. el 29-I (PIR).

Golf de Son Parc, es Mercadal. 2 ex. el 30-X (PIR).

Eivissa: Hivernada, primera observació el 19-XI amb 1 ex. a ses Feixes (Vila) (SDW/Observation).

Tarsiger cyanurus. Coablava. Ruiseñor coliazul. Red-flanked Bluetail

Estatus: accidental (MA). *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Ficedula hypoleuca. Papamosques negre, matamosques negre (MA-FO), menjamosques negre (ME). Papamoscas cerrojillo. European Pied Flycatcher

Estatus: migrant abundant (MA-ME) i moderat (EI-FO-CA-DR). Cria esporàdica el 1993 (MA).

Selecció: fenologia.

Mallorca: Pas prenupcial, primeres cites el 31-III (1 ex.) a s'Albufera (SCH/Observation), l'1-IV amb 1 femella a s'Albufera (RES, VIC, PNAM), el 10-IV amb 2 ex. a Son Real (Santa Margalida) (BSF/Observation), i l'11-IV amb 1 mascle a Ariant (Pollença) (GON).

Un màxim de 12 ex. a es Banc d'Eivissa (Calvià) el 29-IV (BYW/eBird).

Darrers registres el 8-V amb 6 ex. (4♂, 2♀) a la depuradora d'Ariany (ZMR/eBird), el 7-V amb 1 mascle a Palma (VDE), el 6-V (2 ex.) a s'Albufera (PNAM).

Pas postnupcial, primers registres el 2-VII amb 3 ex. al Salobrar de Campos, el 4-VII (1 ex.) al camí dels Estanys III (ses Salines) (VDW/Observation), el 18-VIII (1 ex.) a s'Evangèlica (Andratx) (BAZ, BAN), i el 21-VIII (2 ex.) a Ariant (Pollença) (GON).

Uns màxims de 24 ex. a l'Albufereta el 10-IX (ADD/eBird) i a sa Marina Gran (Santanyí) el 15-IX (RES/eBird), i 12 ex. a la vall de Bóquer (Pollença) l'11-IX (ADD/eBird).

Darreres cites el 4-X amb 1 ex. a l'Albufereta (RES, VIC, RNSA), el 26-IX (1 ex.) a Galatzó (Calvià) (MUN), i el 25-IX (2 ex.) a prop de cala Figuera de Formentor (GON).

Cabrera: Pas prenupcial, almenys present entre el 13-IV (6 ex.) i fins al 30-IV (4 ex.) (CRG/eBird; JMO/Observation).

Pas postnupcial, 5 ex. el 15-IX (MOU-PAM/eBird).

Dragonera: Pas prenupcial, almenys present entre el 12-IV (3 ex.) i fins al 4-V (1 femella) (RES/eBird).

Pas postnupcial, almenys present entre el 14-IX (20 ex.) (TOM/eBird), i fins al 18-IX (1 ex.) (JMO/Observation).

Menorca: Pas prenupcial, 1 ex. el 19-IV a Punta Prima (Sant Lluís) (PIR).

Pas postnupcial, present entre el 10-IX a Son Bou (Alaior) amb 1 ex. (PIR) i el camí a Punta Rotja amb 5 ex. (CRT), i el 21-IX amb 10 ex. a cala Galdana-barranc d'Algendar (BSH/eBird).

Aire: Sant Lluís. Pas prenupcial, 114 ex. capturats per a anellament entre l'1-IV fins al 15-V. Una tendència positiva del **26,4** % per al període 1995-2024 (mitjana = 90,2; n = 2.616). Un màxim de 29 captures durant la pentada del 26-IV fins al 30-IV (AIRE).

Eivissa: Pas prenupcial, primer registre el 14-IV amb 1 ex. a Sant Agustí des Vedrà (YAR) i a Xarraca (Sant Joan) (SDW/Observation). Darrera cita el 7-V amb 2 ex. a Santa Eulària (ODS/Observation) i 1 ex. a Sant Joan (SDW/Observation).

Pas postnupcial, primera cita el 4-VII amb 1 ex. a Santa Eulària (ODS/Observation). Darrera el 14-IX (1 ex.) a Can Tomàs (Sant Antoni) (YAR).

***Ficedula hypoleuca iberiae*.** Papamosques negre, matamosques negre (MA). Papamoscas cerrojillo. European Pied Flycatcher

Estatus: migrant rar (MA).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: Pas prenupcial, almenys present entre el 25-IV (**1** mascle) a Felanitx, i fins al 30-IV (**1** mascle) a l'Albufereta (TSL/Observation).

Eivissa: Pas prenupcial, el 7-V amb **2** ex. a Santa Eulària (ODS/Observation).

Pas postnupcial, el 4-VII amb **1** ex. a Santa Eulària (ODS/Observation).

***Ficedula albicollis*.** Papamosques de collar, menjamosques de collar (MA-ME-EI-FO). Papamoscas collarino. Collared Flycatcher

Estatus: migrant rar.

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: **1** mascle al coll des Vidriers (Capdepera) el 23-IV.

Cabrera: **2** ex. el 13 i 17-IV.

Dragonera: **1** mascle el 6-IV i **1** ex. el 20-IV, i **1** femella el 4-V.

Menorca: Parc Rubió i Tudurí, Maó. **1** mascle el 15-IV.

Es Castell, **1** mascle el 15-IV.

Aire: (Sant Lluís). Pas prenupcial, s'anellen **11** ex. el 15-IV, dels quals 5 són femelles adultes, 2 femelles de 2n any, 3 mas-

cles adults i 1 mascle de 2º any. En tota la campanya, de l'1-IV al 15-V s'han capturat 13 ex. per a anellament.

Eivissa: ses Salines, Sant Josep. 1 mascle de 2n any el 21-IV. Per a més informació d'aquests registres homologats, vegeu-ne l'informe del Comitè de Rareses de Balears.

***Ficedula semitorquata*.** Menjamosques de mig collar. Papamoscas semicollarino. Semicollared Flycatcher

Estatus: accidental (CA). *Selecció:* tots els registres rebuts. Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

***Ficedula parva*.** Papamosques menut, menjamosques barba-roja (MA), menjamosques menut (ME). Papamoscas papirojo. Red-breasted Flycatcher

Estatus: migrant rar (MA-ME-CA-DR). *Selecció:* tots els registres rebuts. Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

***Phoenicurus ochruros*.** Coa-roja de barraca, coa-roja (EI). Colirrojo tizón. Black Redstart

Estatus: hivernant abundant (MA-EI-DR) i moderat (ME-FO-CA). Migrant abundant (MA-CA-DR) i moderat (ME-EI-FO).

Selecció: fenologia.

Mallorca: Hivernada, un màxim de 75 ex. a Mortitx (Escorca) el 21-I (BEN-MAC/eBird).

Pas prenupcial, darrers registres el 17-V (1 ex.) a l'embassament de Cúber (Escorca) (DMG/eBird), i l'11-IV (1 ex.) a Ariant (Pollença) (GON),

Pas postnupcial, primeres cites el 19-X (1 ex.) a Felanitx (JMO/Observation), el 20-X (2 ex.) a s'Albufera (RES, VIC, PNAM), i el 23-X amb 30 ex. a Galatzó (Calvià) (CST/eBird).

Cabrera: Pas prenupcial, 1 mascle el 17-IV (VIC).

Pas postnupcial, almenys present entre el 20-X amb 80 ex. (BAZ-SCH/eBird), i el 25-X amb 100 ex. (RES/eBird).

Eivissa: Pas postnupcial, primera cita el 24-X amb 60 ex. al pla de Sant Mateu. Un màxim de 93 ex. el 6-XI al pla de Corona (SDW/eBird).

***Phoenicurus phoenicurus*.** Coa-roja, coa-roja reial (ME-EI). Colirrojo real. Common Redstart

Estatus: migrant abundant (MA-CA-DR) i moderat (ME-EI-FO).

Selecció: fenologia.

Mallorca: Pas prenupcial, primeres cites el 18-III amb 2 ex. a s'Albufera (RES, VIC, PNAM), el 21-III amb 2 mascles a Ariant (Pollença) (GON), i el 22-III amb 2 ex. a l'Albufereta (RES, VIC, RNSA).

Darrers registres el 19-V (1 ex.) a s'Albufera (CLV/eBird), i el 4-V a la vall de Bóquer (Pollença) amb 3 ex. (VSV/Observation) i a l'Albufereta amb 1 ex. (RES, VIC, RNSA).

Pas postnupcial, primeres cites el 19-VIII amb 1 mascle a Galatzó (Calvià) (SOL/eBird), el 31-VIII (1 femella) a Moritx (Escorca) (TOM/eBird), i el 8-IX (1 femella) a Santanyí (JMO/Observation).

Darrers registres el 2-XI amb 2 ex. (amb *Ph. ochruros* a prop) a sa Marina Gran (Santanyí) (RES/eBird), el 30-X (3 ex.) a Ariant (Pollença) (GON), i el 15-X (1 ex.) a s'Evangelica (Andratx) (BAZ).

Cabrera: Pas prenupcial, almenys present entre el 13-IV amb 10 ex. (CRG/eBird), i el 19-V (5 ex.) (RES/eBird).

Pas postnupcial, almenys present entre el 15-IX amb 1 ex. (MUN, PAM, SOL, MOU), i el 20-X (15 ex.) (BAZ-SCH/eBird).

Dragonera: Pas prenupcial, almenys present entre el 2-IV amb 1 ex. (JMO/Observation), i el 10-VI (1 mascle) (JMO/Observation).

Pas postnupcial, almenys present entre el 15-IX amb 5 ex., i el 20-XI (5 ex.) (JMO/Observation).

Menorca: Golf de Son Parc, es Mercadal. 2 ex. el 24-III (CAU, VEG, VLN). Coves Noves, es Mercadal. 1 ex. el 19-VIII (VLN).

Son Bou, Alaior. 1 ex. el 19-X (PIR).

Aire: Sant Lluís. Pas prenupcial, 147 ex. capturats per a anellament entre l'1-IV fins al 15-V. Una tendència negativa del -30 % per al període 1995-2024 (mitjana= 209,4; n= 6.073). Un màxim de 30 captures durant la pentada de l'1-V fins al 5-V (AIRE).

Eivissa: Pas prenupcial, primeres cites el 19-III amb 1 mascle a cap Llentrisca (Sant Josep), i el 23-III (1 mascle) a Sant Antoni (BSS/Observation). Darrers registres el 19-V amb 1 femella a sa Carroca (Sant Josep) (SEP/eBird), i el 24-IV (1 mascle) a ses Salines (Sant Josep) (PRG).

Pas postnupcial, almenys present entre el 9-IX (1 ex.) al N de Sant Joan (RTR/Observation), i el 24-X (1 mascle) a Sant Antoni (SDW/Observation).

Sa Conillera: (Sant Josep). Pas postnupcial, el 7-IX amb 1 ex. (MAR).

***Phoenicurus moussieri*.** Coa-roja diademada. Colirrojo diademado. Moussier's Redstart

Estatus: accidental (MA-ME-CA). **Selecció:** tots els registres rebuts. Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

***Monticola saxatilis*.** Mèrlera vermella, coa-rojot (MA), tord roquer (EI), merla (FO). Roquero rojo. Moussier's Redstart

Estatus: reproductor rar (MA). Migrant escàs (MA-ME) i rar (EI-FO-CA).

Selecció: reproducció i fenologia.
Mallorca: primera cita el 17-IV amb 1 ex. a Son Pillo (Calvià) (BEN/eBird).

Monticola solitarius. Pàssera, mèrlera blava (ME-EI). Roquero solitario.
 Blue Rock Thrush

Estatus: reproductor i sedentari abundant (MA), moderat (ME-EI) i escàs (FO-CA-DR).

Selecció: reproducció i dades d'interès.

Mallorca: Reproducció, 2 adults aportant menjar al niu a s'Algar (Portocolom) el 12-V (RES/eBird).

Menorca: Punta Nati, Ciutadella. Un màxim de 15 ex. el 3-XI (BSH/eBird).

Saxicola rubetra. Vitrac barba-roig, cagamànecs (MA), vitrac foraster (ME), cagamànecs barba-roja (EI), vitrac barba-roja (FO). Tarabilla norteña. Whinchat

Estatus: migrant abundant (MA), moderat (ME-EI-CA) i escàs (FO-DR). Cria esporàdica (MA).

Selecció: fenologia.

Mallorca: Pas prenupcial, primeres cites l'1-IV amb 1 ex. a s'Albufera, el 13-IV amb 2 ex. a l'Albufereta (RES, VIC, PNAM, RNSA), el 19-IV (1 ex.) a la depuradora s'Albufera amb 1 ex. (ART, MUÑ) i a Son Bosc (Muro) amb 4 ex. (BEN-MAC/eBird).

Darrers registres el 18-V amb 1 femella a Son Real (Santa Margalida) (MCK/eBird), el 13-V (1 ex.) al port de Pollença (KRR/eBird) i es Trenc (Campos) (BXT/eBird), i el 12-V (1 ex.) al pla de Vilafranca (TOM/eBird).

Pas postnupcial, primers registres el 21-VIII (1 ex.) a Ariant (Pollença) (GON), el 26-VIII amb 3 aus de primer any a l'Albufereta (RES/eBird), i el 8-IX (1 ex.) a Santanyí (JMO/Observation).

Darreres cites el 4-XI (1 ex.) a la Gola (Port de Pollença) (CTOG- TOM/eBird), el 13-X (1 ex.) al Salobrar de Campos (JMO/Observation), el 12-X (1 ex.) a Son Serra (Muro) (SCH/Observation).

Cabrera: Pas prenupcial, almenys present entre el 17-IV amb 13 ex. fins al 19-V (3 ex.) (VIC; RES/eBird).

Pas postnupcial, 1 ex. el 15-IX (MUN, PAM, SOL, MOU).

Dragonera: Pas prenupcial, almenys present entre el 5-IV (1 ex.) fins al 15-V (2 ex.) (JMO/Observation; NIC/eBird).

Menorca: Pas prenupcial, el 24-IV amb 1 mascle a ses basses de Lluriac (es Mercadal) (BLB/Observation).

Pas postnupcial, 1 ex. el 26-X a Son Bou (Alaior) (PIR).

Eivissa: Pas prenupcial. Ses Salines (Sant Josep), primera cita el 6-IV amb 1 mascle. Darrer registre el 10-V amb 2 ex. Un màxim de 15 ex. el 29-IV (SDW/Observation).

Pas postnupcial, almenys present entre el 30-VIII amb 1 ex. a ses Salines (SEP) fins al 10-X amb 1 ex. a la depuradora (Sant Josep) (PRG). Un màxim de 4 ex. el 7-IX a ses Salines (SEP/eBird).

Saxicola maurus hemprichii. Vitrac siberià de Hemprich. Tarabilla siberiana de Hemprich. Siberian Stonechat

Cabrera: 1 mascle de primer hivern de la subespècie *hemprichii* el 20-X. Divagant de Sibèria occidental. El registre mencionat està homologat pel Comitè de Rareses de la SEO. Aquesta espècie i subespècie no figurava en aquesta llista, és el primer registre del Comitè a les Balears.

Saxicola rubicola. (abans *Saxicola torquatus rubicola*). Vitrac, cagamànecs (EI). Tarabilla común. European Stonechat

Estatus: reproductor i sedentari abundant (MA-ME-EI). Hivernant moderat (MA) i escàs (ME-FO-CA-DR). Migrant moderat (MA-EI) i escàs (ME-FO-CA-DR).

Selecció: reproducció i fenologia.

Mallorca: Reproducció. Construcció de nius a partir del 21-II a Felanitx i el 20-III al prat de Sant Jordi (Palma) (JMO/Observation), fins al 9-IV a la vall Verda (Calvià) (BEN/eBird).

Observació d'adults amb menjar al bec a partir del 5-III a Son Pax (Palma) (MMA), 9-III al Salobrar de Campos (LOP-MAC/eBird), i 14-IV a la vall de Bóquer (Pollença) (NLS/eBird), fins al 13-V al torrent de Son Bauló (Santa Margalida) (MCK/eBird). Observació de polls fins al 14-VI a la depuradora de Binissalem (RES/eBird).

Observació de joves a partir del 16-IV al golf de Son Quint (Palma) (MAC/eBird), el 17-IV a Son Pillo (Calvià) (BEN/eBird), i el 18-IV a sa Cabaneta (HIN/eBird) fins al 18-VIII a Santa Ponça (Calvià) (DGZ/Observation).

Basses de Magaluf, Calvià. Enguany hi han criat 3 parelles a zona humida i 3 parelles més als voltants. Construcció de nius a partir del 20-IV, polls el 3-IV, i joves el 10-IV (BEN/eBird).

S'Albufera. Observació de polls a partir del 20-IV, joves des del 8-V fins al 8-IX (RES, VIC, PNAM; BTT/Observation).

Albufereta. Observació de joves a partir del 15-IV fins al 23-VI (BEN-MAC/eBird; RES, VIC, RNSA).

Cabrera: Pas postnupcial, el 20-X amb 5 ex. (BAZ-SCH/eBird).

Menorca: Son Saura del Nord, es Mercadal. 1 ex. el 24-III (CAU, VEG, VLN).

Camí de sa Boval, Maó. 1 ex. el 27-III (PIR).

Punta Grossa, es Mercadal. 1 ex. el 17-VIII (CAU).

Eivissa: Reproducció, primers cants el 21-III amb 1 mascle a Sant Antoni (BSS/Observation). Observació de joves a partir del 28-IV a ses Salines (Sant Josep) (SDW/Observation), polls de segones postes el 5-VI a ses Salines (GAB/eBird).

Oenanthe oenanthe. Coablanca, primavera (MA), culblanc (ME). Collalba gris. Northern Wheatear

Estatus: reproductor escàs (MA) i rar (EI). Migrant abundant (MA), moderat (ME-EI-FO-CA), i escàs (DR).

Selecció: reproducció, fenologia i dades d'interès.

Mallorca: Pas prenupcial, primeres cites el 21-III amb 4 ex. a Ariant (Pollença) (GON), el 30-III amb 2 ex. a Maria (BAZ), i l'1-IV amb 1 femella a s'Albufera (RES, VIC, PNAM).

Talaia d'Albercutx, Pollença. S'han vist en migració **3** ex. el 27-IV (GORA).

Darrers registres el 15-V (1 ex.) al PN de Mondragó (AMG), el 12-V (1 ex.) al vall de Bóquer (Pollença) (KST/Observation), i l'11-V (1 ex.) al Salobrar de Campos (JMO/Observation).

Reproducció. Puig Major (Escorca), 1 mascle territorial al cim des Penyal des Migdia (1.400 m) el 2-VI (AMG).

Puig Tomir, Escorca. 2 ex. cantant el 15-VI (BAZ).

Pas postnupcial, primers registres el 2-VIII amb 1 ex. al camí de Can Pastilla (Palma) (MCM/eBird), el 28-VIII amb 2 ex. a Ariant (Pollença) (GON), i el 29-VIII amb 1 ex. a l'Albufereita (RES, VIC, PNAM).

Cap de ses Salines, Santanyí. Pas actiu, **16** ex. sortint a la mar cap al S, des del 4-IX (1 ex.) i el 29-IX (15 ex.) (GORA).

Darreres cites el 2-XI amb 1 ex. a Maria de la Salut (HNR/eBird), el 2-XI amb 2 ex. a sa Marina Gran (Santanyí) (RES/eBird), i el 26-X amb 1 ex. a s'Albufera (PNAM).

Uns màxims de 39 ex. (20 al mateix redol) al pla de Vilafranca el 4-X, 24 ex. a sa Marina Gran (Santanyí) el 29-IX, 21 ex. a es Blanquer de Maria el 20-IX (RES/eBird), i 12 ex. al cap Blanc (Llucmajor) el 30-IX (NIC/eBird).

Cabrera: Pas prenupcial, 1 ex. el 26-IV (TSL/Observation).

Pas postnupcial, 1 ex. el 15-IX (MUN, PAM, SOL, MOU).

Dragonera: pas prenupcial, el 17-IV amb 1 femella (JMO/Observation).

Menorca: Pas prenupcial, primera cita el 13-V amb 1 ex. al cap Negre (LMR/Observation). Darrer registre el 22-V amb 3 ex. a Punta Prima (Sant Lluís) (BAZ/eBird).

Pas postnupcial, primera cita el 22-IX amb 15 ex. (ALL/eBird), i un màxim de **25** ex. el 5-X (NCH/eBird). Darrer registre el 26-X amb 1 femella (JMO/Observation). Tots els registres a Punta Nati (Ciutadella).

Eivissa: Pas prenupcial, primer registre el 12-III amb 1 mascle a ses Salines (PRG), i el 22-III amb 1 ex. a Sant Antoni (BSS/Ob-

servation). Darrer el 26-VI amb 1 ex. a ses Salines (PRG). Un màxim de 27 ex. al pla de Sant Mateu (SDW/Observation).

Pas postnupcial, almenys present entre el 31-VIII amb 3 ex. a l'aeroport, i fins al 18-X amb 3 ex. a ses Salines (YAR). Un màxim de 15 ex. a Sant Joan el 13-IX (RTR/Observation).

Formentera: Pas prenupcial, el 4-V amb **15** ex. juntes a un petit camp al Moli Vell de la Mola (YAR).

Oenanthe oenanthe leucorhoa. Coablanca, primavera (MA), culblanc (ME). Collalba gris. Northern Wheatear

Estatus: Migrant rar (MA-ME-EI-FO-CA).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: Felanitx. **1** mascle el 2-V (JMO/Observation).

Oenanthe isabellina. Coablanca pàl·lida. Collalba isabel. Isabelline Wheatear

Estatus: accidental (MA-ME-CA). *Selecció*: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Oenanthe deserti. Coablanca del desert. Collalba desértica. Desert Wheatear

Estatus: accidental (FO). *Selecció*: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses

Oenanthe hispanica. Coablanca ros, coablanca rossa (MA-EI-FO), culblanc roig (ME). Collalba rubia occidental. Western Black-eared Wheatear

Estatus: migrant escàs, i rar (DR).

Selecció: fenologia i subespècies.

Mallorca: Pas prenupcial, 1 ex. l'1-IV a les basses de Magaluf (Calvià) (GRP-BEN-MAC/eBird). 2 ex. (♂, ♀) el 4-V a ses cases de Bóquer (Pollença) (VSV/Observation).

Cabrera: Pas prenupcial, 2 mascles el 16-IV (VIC).

Eivissa: Pas prenupcial, 1 mascle el 2-IV a l'aeroport (Sant Josep) (PRG).

Oenanthe melanoleuca (abans *Oenanthe hispanica melanoleuca*). Coablanca ros, coablanca rossa oriental (MA-EI-FO), culblanc roig (ME). Collalba rubia oriental. Eastern Black-eared Wheatear

Estatus: accidental (CA). *Selecció*: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Oenanthe leucura. Mèrlera coablanca, mèl·lera coablanca (MA), culblanc negre (ME). Collalba negra. Black Wheatear

Estatus: accidental (CA). *Selecció*: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Petronia petronia. Gorrió roquer, gorrió berberisc (MA), pardal roquer (ME), teulat liri (EI-FO). Gorrión chillón. Rock Sparrow

Estatus: reproductor i sedentari moderat (EI-FO) i escàs (MA). Accidental (ME-CA). Falta informació.

Selecció: reproducció, noves localitats, i dades d'interès.

Mallorca: Marina Gran, Santanyí. Uns màxims de 6 ex. el 16-II (MAC/eBird) i 10 ex. el 8-IX (BAZ/eBird), 3 ex. el 15-X (JMO/Observation), i 6 ex. el 17-XI (MON).

Cap Blanc, Lluçmajor. Primers cants el 22-II amb 1 ex. reclamant en vol (SOL-BEN/eBird). Uns màxims de 5 adults en àrea de cria el 25-III, 18 ex. en àrea de cria el 18-IX, i 4 ex. el 18-XI (NIC/eBird).

Cap de ses Salines. Pas actiu, 3 ex. al freu de Cabrera l'11-IX (MON).

Eivissa: Pla de Sant Mateu. Un màxim de 55 ex. a ses figueres de prop del cementeri el 31-III, i 40 ex. el 1-XII (CST/eBird).

Formentera: La Mola. 2 ex. el 3-IV (MTF/Observation).

Migjorn, 1 ex. el 16-VI (SDW/Observation).

Passer montanus. Gorrió barraquer, pardal barraquer (ME), teulat gal·tanegre (EI). Gorrión molinero. Eurasian Tree Sparrow

Estatus: reproductor i sedentari moderat (MA) i escàs (EI). Migrant escàs (CA-DR), i rar (MA-ME).

Selecció: reproducció, fenologia i tots els registres a ME.

Mallorca: Sa Cabaneta, Marratxí. 2 ex. sortint de la paret de pedra d'una casa el 29-III (HIN/eBird).

Centre de Recuperació de Fauna Silvestre, ingressat 1 poll procedent de Sencelles el 15-V, posteriorment mor (COFIB, Conselleria d'Agricultura, Pesca i Medi Natural).

Felanitx. 3 joves acabats de sortir del niu el 21-V (JMO/Observation).

Uns màxims d'un grup de 40 ex. al prat de Sant Jordi (Palma) el 15-III (BAZ/eBird), 32 ex. al Parc BIT (Palma) el 14-IX (NIC-NCL/eBird), i un grup de 14 ex. a es Blanquer de Maria el 5-XII (RES/eBird).

Passer hispaniolensis. Gorrió de passa, gorrió foraster (MA). Gorrión moruno. Spanish Sparrow

Estatus: accidental (MA-CA). **Selecció:** tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Passer domesticus. Gorrió teulader, teulader (MA), pardal (ME), teulat (EI-FO). Gorrión común. House Sparrow

Estatus: reproductor i sedentari abundant, escàs (CA), i rar (DR).

Selecció: reproducció i dades d'interès.

Mallorca: Reproducció. Observació de polls fins al 23-VII a Palma (TSK/eBird), el 17-VI a s'Albufera (GAB/eBird), i el 21-V al port de Pollença (KRR/eBird). Joves a partir del 24-III a la vall de Colonya (Pollença) (TOM/eBird), el 20-IV a Gotmar (Pollença) (BEN-MAC/eBird), el 4-VI a s'Albufera, i el 24-VII a l'Albufereta (RES, VIC, PNAM, RNSA), fins al 14-VIII a La Gola (Port de Pollença) (CTOG-TOM/eBird).

Uns màxims de 305 ex. en diversos grups a Can Vairet (Calvià) el 16-I (BEN/eBird), 220 ex. en diversos grups a l'Albufereta el 6-II (RES/eBird), i 220 ex. a ses basses de Magaluf (Calvià) el 10-IV (BEN/eBird).

Cabrera: 1 ex. el 15-IX (MUN, PAM, SOL, MOU).

Dragonera: 1 ex. el 6-IV (JMO/Observation).

Eivissa: observació de joves a partir del 13-V a Ca n'Andreu (Sant Mateu) (SEP/eBird).

Camí des Fornàs, Vila. Un màxim de 64 ex. el 10-VI (GAB/eBird).

Montifringilla nivalis. Gorrió d'ala blanca, pardal d'ala blanca (ME). Gorrión alpino. White-winged Snowfinch

Estatus: hivernant rar (MA-ME-EI-FO-CA). Migrant rar (DR). **Selecció:** tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Estrilda astrild. Bec de corall. Pico de coral. Common Waxbill

Estatus: reproductor i sedentari rar (MA-EI). **Selecció:** reproducció. Cap registre rebut.

Prunella collaris. Xalambri de muntanya. Acentor alpino. Alpine Accentor

Estatus: hivernant escàs (MA-ME-EI), i rar (CA). Migrant escàs (MA) i rar (EI-DR).

Selecció: fenologia i distribució geogràfica.

Mallorca: Pas prenupcial, única cita d'1 ex. al cap de Formentor (Pollença) el 3-V (VDS/Observation).

Menorca: El Toro, es Mercadal. Un grup de 7 ex. el 7-XI (PIR).

Prunella modularis. Xalambri. Acentor común. Dunnock

Estatus: hivernant moderat (MA-ME-EI), i escàs (CA-DR). Migrant moderat (MA-ME) i escàs (EI-FO-CA-DR).

Selecció: fenologia.

Mallorca: hivernada, darrers registres el 6-II amb 1 ex. a l'Albufereta (RES, VIC, RNSA), el 29-I amb 1 ex. sentit al puig d'Arboçaret (Son Servera) (GON), el 28-I (1 ex.) a s'Evangelica (Andratx) (BAZ), i el 12-I escoltat 1 ex. per la zona dunar a la punta de n'Amer (Sant Llorenç) (GON).

Pas postnupcial, primeres cites el 19-IX amb 1 ex. a l'Albufereta, el 24-X amb 1 ex. a Ariant (Pollença) (GON), el 2-XI (1 ex.) al cap de ses Salines (Santanyi), i el 25-XI (1 ex.) a Felanitx (JMO/Observation).

Eivissa: Hivernada, 1 ex. el 29-XII al N de Sant Joan (SDW/Observation).

Motacilla flava. Xàtxero groc, titina groga (MA-EI-FO), titeta groga (ME). Lavandera boyera. Western Yellow Wagtail

Estatus: reproductor moderat (MA-EI) i rar (FO). Migrant abundant (MA-EI), moderat (ME-FO), i escàs (CA-DR).

Selecció: reproducció, fenologia, subespècies i dades d'interès.

Mallorca: Pas prenupcial, primers registres el 23-II amb 1 ex. al PN de Mondragó (AMG), el 3-III amb 1 ex. a s'Albufera (RES, VIC, PNAM), el 6-III (2 ex.) al prat de Sant Jordi (Palma) (GLT), i el 7-III a l'Albufereta (RES, VIC, RNSA).

Un màxim de **150** ex. tots junts després de la pluja als joncs al Blanquer de Maria el 29-IV (SCW/eBird).

Darreres cites el 16-V amb 6 ex. a Ariant (Pollença) (GON), el 4-V (1 ex.) al cap de Formentor (Pollença), el 3-V (4 ex.) a Mortitx (Escorca) (HKS/Observation), i el 2-V (1 ex.) a Son Real (Santa Margalida) (VTR/Observation).

Talaia d'Albercutx, Pollença. Escoltes d'exemplars en vol nocturn al vespre, **14** ex. el 6-V a les 06:27 h (grupet, FC14), 06:34 h (grupet, FC38), 06:40 h (2 aus, FC16), 06:48 h (FC2), 06:57 h (FC8) (RES/NFC).

Pas postnupcial, primera cita l'11-IX amb 1 ex. al far de Formentor (Pollença) (GON), l'11-IX amb 16 ex. a Can Trujillo (Calvià) (GRP/eBird), el 14-IX amb 3 ex. a la bassa de Can Guidet (ZMR/eBird), el 18-IX amb 1 ex. a Ariant (Pollença) (GON) també 30 ex. a ses basses de Son Navata (Felanitx) (MTA/eBird), i el 22-IX amb un grup de 28 ex. la majoria joves a sa Barrala (Campos) (LOP-MAC- CST/eBird).

Un màxim de 60 ex. al Salobrar de Campos el 22-IX (CST/eBird).

Darrers registres el 17-X amb 30 ex. amb les blanques a sa Barrala (Campos) (BAZ/eBird), el 13-X amb 2 ex. a Esporles (BAU), el 12-X (1 ex.) al port Pollença (SCH/Observation), i el 10-X amb 1 ex. a Ariant (Pollença) (GON).

Cabrera: Pas postnupcial, 1 ex. el 15-IX (MUN, PAM, SOL, MOU).

Dragonera: Pas prenupcial, almenys present entre el 4-IV (1 ex.) i el 22-IV (4 ex.) (JMO/Observation).

Pas postnupcial, el 15-IX amb 2 ex., i el 20-IX amb 1 ex. (JMO/Observation).

Menorca: Pas prenupcial, primera cita el 3-IV amb 5 ex. a d'Addaia (BLD/Observation). Darrer registre el 22-V (1 mascle) a ses basses de Lluriac (es Mercadal) (OVV/Observation).

Pas postnupcial, 3 ex. el 10-IX a Son Bou (Alaior) (PIR).

Eivissa: Pas prenupcial, primera cita el 16-II amb 1 ex. a ses Feixes (SEP). Un màxim de 200 ex. al dormidor de ses Salines el 29-IV (GAB/eBird).

Pas postnupcial, darrer registre el 9-XI amb 1 ex. a ses Salines (SEP, SET).

Motacilla flava cinereocapilla. Xàtxero groc, titina groga (MA-EI-FO), titeta groga (ME). Lavandera boyera. Western Yellow Wagtail

Estatus: migrant abundant (MA-EI), moderat (ME-FO), i rar (CA). Cria esporàdica 2008 (MA).

Selecció: reproducció, i fenologia.

Mallorca: Pas prenupcial, primera cita el 10-III amb 1 ex. a la depuradora de s'Albufera (BEN-HIN-LOP-MAC/eBird), el 22-III amb 1 mascle cantant al Salobrar de Campos (LNS/Observation), i el 24-III amb 1 ex. al prat de Sant Jordi (Palma) (BEN-MAC/eBird).

Darrer registre l'1-V amb 1 ex. al Salobrar de Campos (CST/eBird).

Eivissa: Pas prenupcial, present entre el 10-III amb 1 mascle a ses Feixes (DMS-MÑZ/eBird), i el 6-IV amb 1 mascle a ses Salines (SDW/Observation).

Motacilla flava flava. Xàtxero groc, titina groga (MA-EI-FO), titeta groga (ME). Lavandera boyera. Western Yellow Wagtail

Estatus: migrant abundant (MA-EI), moderat (ME-FO), i escàs (CA-DR).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: Pas prenupcial, primer registre el 24-IV amb 9 ex. al prat de Sant Jordi (Palma) (TSL/Observation), el 28-IV amb 4 ex. a la vall de Bóquer (Pollença) (HKS/Observation). Darrer el 28-IV amb 1 mascle a la bassa de Can Guidet (Palma) (TSL/Observation).

Eivissa: Pas prenupcial, 12 ex. el 6-IV a ses Salines (SDW/Observation).

Motacilla flava flavissima. Xàtxero groc, titina groga (MA-EI-FO), titeta groga (ME). Lavandera boyera. Western Yellow Wagtail

Estatus: migrant abundant (MA-EI), moderat (ME-FO), i rar (CA-DR).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: Pas prenupcial, l'1-IV amb 1 ex. a la bassa de Can Guidet (Palma) (BEN-MAC/eBird), i l'11-IX amb 3 ex. a l'Albufereta (Pollença) (MIL/eBird).

Eivissa: Pas prenupcial, present entre el 3-IV amb 4 ex. (PRG), i el 7-IV amb 1 mascle (SDW/Observation), ambdós a ses Salines.

Motacilla flava iberiae. Xàtxero groc, titina groga (MA-EI-FO), titeta groga (ME). Lavandera boyera. Western Yellow Wagtail

Estatus: reproductor moderat (MA-EI) i rar (FO). Migrant abundant (MA-EI), moderat (ME-FO), i escàs (CA-DR).

Selecció: reproducció, i fenologia.

Mallorca: Reproducció. S'Albufera. Primera cita el 15-IV amb 1 ex. (BKR/Observation). Observació de joves a partir del 14-VI fins al 4-VIII (RES, VIC, PNAM; TOM/eBird).

Albufereta. Primera cita el 16-IV amb 1 ex. (BKR/Observation), adults amb menjar al bec a partir del 20-VI (LMT/Observation).

Prat de Sant Jordi, Palma. Primera cita el 20-III amb 2 ex. (JMO/Observation),

Pla de Vilafranca. Primera cita el 26-IV amb 5 ex. (3 ♂) (TSL/Observation). Un màxim de 23 ex. el 3-VI (NIC/eBird).

Es Salobrar, Campos. Nidificant, primera cita el 29-IV amb 3 ex. (2 ♂) (TSL/Observation), observació de joves a partir del 24-VII (JMO/Observation),

Blanquer de Maria. Nidificant, adults amb ceba a partir del 21-V (DRS/Observation).

Menorca: Pas prenupcial, 1 ex. el 7-III a ses basses de Lluriac (es Mercadal) (PIR), i 5 ex. el 3-IV a d'Addaia (BLD/Observation).

Eivissa: prenupcial, primera cita el 6-IV amb 1 ex. a ses Salines (Sant Josep) (SDW/Observation).

Formentera: estany Pudent, 1 ex. el 15 i 16-VI (SDW/Observation).

Motacilla flava thunbergi. Xàtxero groc, titina groga (MA-EI-FO), titeta groga (ME). Lavandera boyera. Western Yellow Wagtail

Estatus: migrant abundant (MA-EI), moderat (ME-FO), i escàs (CA).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: Pas prenupcial, primeres cites el 19-IV (1 ex.) a s'Albufera (BNG/Observation), el 24-IV (3 ex.) a l'Albufereta, el 25-IV (2 ex.) a ses basses de Magaluf (Calvià) (BEN/eBird), i el 27-IV (1 ex.) a Galatzó (Calvià) (CST/eBird).

Darrers registres el 4-V (1 ex.) a l'Albufereta (FJJ/eBird), el 2-V (1 ex.) a Son Real (Santa Margalida) (VTR/Observation), i el 29-IV (3 ex.) al Blanquer de Maria (SCW/eBird).

Cabrera: Pas prenupcial, el 18-V amb 1 mascle, i el 19-V amb 2 mascles (RES/eBird).

Pas postnupcial, el 15-IX amb 1 ex. (MUN, PAM, SOL, MOU).

Menorca: Son Bou, Alaior. 20 ex. pasturant entre unes vaques l'1-V (CAU, VLN).

Eivissa: Pas prenupcial, almenys present entre el 24-IV amb 2 ex. a l'aeroport, i el 7-V amb 3 ex. al pla de Sant Mateu (SDW/eBird).

Motacilla flava feldegg. Xàtxero groc, titina groga (MA-EI-FO), titeta groga (ME). Lavandera boyera balcànica. Western Yellow Wagtail

Estatus: accidental (MA). *Selecció:* tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Motacilla citreola. Xàtxero citrí, titina citrina (MA), titeta citrina (ME). Lavandera cetrina. Citrine Wagtail

Estatus: accidental (MA-ME). *Selecció:* tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Motacilla tschutschensis. Xàtxero de Txukotka. Lavandera de Chukotka. Eastern Yellow Wagtail

Mallorca: **1** ex. el 20-XII al prat de Sant Jordi (Palma).
Registres pendents d'homologació pel Comitè de Rareses de la SEO/BirdLife. Aquesta és una au divagant de l'Est d'Àsia, es reproduïx a la tundra àrtica des d'Alaska fins a l'est de Rússia. Per hivernar es desplaça al sud-est asiàtic. Aquesta espècie no figura en aquesta llista de l'AOB. Si hi és acceptada, serà el primer registre del comitè a Balears.

Motacilla cinerea. Xàtxero cendrós, titina cendrosa (MA-FO), titeta torrentera (ME), titina de la Mare de Déu (EI). Lavandera cascadeña. Grey Wagtail

Estatus: hivernant moderat (MA), escàs (ME-EI), i rar (FO-CA-DR).
Migrant moderat (MA), escàs (ME-EI), i rar (FO-CA-DR).

Selecció: fenologia.

Mallorca: hivernada, darrers registres el 22-III amb 1 ex. a l'Albufereta (RES, VIC, RNSA), el 3-III amb 1 ex. a Portopetro (Santanyí) (MON), i el 22-II (1 ex.) a Cala Major (Palma) (MUT),
Pas postnupcial, primeres cites el 8-IX amb 1 ex. a s'Albufera (RES, VIC, PNAM), el 29-IX amb 1 ex. a Esporles (GRD), el 2-X amb un grup 9 ex. a sa Riera (Palma) (CST/eBird), i el 13-X (1 ex.) a Felanitx (JMO/Observation).

Cap de ses Salines (camps interiors). Escoltes d'exemplars en vol nocturn al vespre, **4** ex. el 29-IX a les 07:41 h (NFC11), 07:44 h (NFC8), 07:56 h (NFC16), 08:02 h (NFC15) (RES/NFC).

Menorca: Hort d'es Lluïsser, Alaïor. 1 ex. el 27-IX (VLN).

Eivissa: Hivernada, darrer registre el 21-I amb 1 ex. a Sant Joan (SDW/Observation).

Pas postnupcial, present entre el 13-X amb 1 adult a l'aeroport (ODS/Observation), i el 18-X amb 1 ex. a Sant Joan (SDW/Observation).

Motacilla alba. Xàtxero, titina blanca (MA), titeta blanca (ME), titina (EI), titineta (FO). Lavandera blanca. White Wagtail

Estatus: hivernant abundant, i rar (CA-DR). Migrant abundant, i rar (CA-DR).

Selecció: fenologia, subespècies i dormidors.

Mallorca: Hivernada, uns màxims de **425** ex. a Can Vairet (Calvià) el 16-I, 270 ex. al pla de Vilafranca el 8-I, 245 ex. a sa Barcala (Campos) el 20-I, 120 ex. a es Blanquer de Maria el 18-I, 26 ex. a la bassa de Can Guidet (Palma) el 9-I, i 4 ex. al port d'Andratx el 4-I (BEN-MAC-RES-ZMR/eBird; BAZ).

Pas prenupcial, darrers registres el 4-V amb 1 ex. a s'Albufera (VDS/Observation), el 30-IV (1 ex.) a la bassa de Can Guidet (Palma) (BEN-MAC-ZMR/eBird) i també a Can Cullerassa (Pollença) (CRH/eBird), i el 24-IV (1 ex.) a l'Albufereta (RES, VIC, RNSA).

Presència primaveral, 1 ex. el 15-VII a s'Arracó (Andratx) (MUT).

Pas postnupcial, primeres cites el 11-IX amb 2 ex. a s'Albufera (RES, VIC, PNAM), el 10-X (1 ex.) a Felanitx (JMO/Observation), i el 15-X amb 96 ex. al port de Palma (ZMR/eBird).

Darrers registres el 2-XI amb 17 ex. al cap de ses Salines (Santanyi) (JMO/Observation), el 30-X amb 30 ex. a Ariant (Pollença) (GON), i el 24-X amb 3 ex. al canal de Cabrera (MON).

Hivernada, uns màxims de **400** ex. al Portopí (Palma) el 19-XI (ZMR/eBird), 250 ex. al Blanquer de Maria el 24-XI (RES/eBird), 70 ex. a ses basses de Magaluf (Calvià) el 2-XII (GRP/eBird), 15 ex. a sa bassa de can Guidet (Palma) el 3-XII (BAU), 52 ex. al prat de Sant Jordi (Palma) el 4-XII (ZMR/eBird), i 90 ex. a l'Albufereta el 20-XII (RES/eBird).

Menorca: Salines de Mongofre, Maó. 1 ex. el 19-IV (PIR).

Alaior, 1 ex. el 20-V (CAU).

Sa Muntanyeta, Maó. 1 ex. el 10-X (PIR).

Basses de Lluriac, es Mercadal. 60 ex. el 18-XII (BAZ/eBird).

Eivissa: Pas prenupcial, darrera cita el 9-VI amb 1 ex. a ses Feixes (SEP/eBird).

Pas postnupcial, primer registre el 13-X amb 3 ex. a l'aeroport (ODS/Observation).

Motacilla alba yarrellii. Xàtxero, titina blanca endolada (MA), titeta blanca (ME), titina (EI), titineta (FO). Lavandera blanca. White Wagtail

Estatus: hivernant rar. Migrant rar.

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: Hivernada, **1** ex. a es Blanquer de Maria el 25-I (RES/eBird).

Albufereta, Pollença. **1** ex. el 4-XII (RES/eBird).
Lluc, Escorca. **1** ex. el 31-XII (RGZ/Observation).

Anthus richardi. Titina grossa, titina de Richard (MA), titeta grossa (ME).
Bisbita de Richard. Richard's Pipit

Estatus: hivernant rar (MA), Migrant rar (MA-ME).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: **1** ex. em passa volant just per damunt, molt baixet, reclamant amb insistència, el relocalitza a un grup d'aloses i titines comunes el 12-X a sa Barrala (Campos).

Per a més informació d'aquests registres homologats, vegeu-ne l'informe del Comitè de Rareses de Balears.

Anthus campestris. Titina d'estiu, verola (MA), titeta d'estiu (ME), titina borda des camp (EI), titina (FO). Bisbita campestre. Tawny Pipit

Estatus: reproductor moderat (MA-ME) i escàs (EI-FO). Migrant moderat (MA-ME-FO), escàs (EI-CA), i rar (DR).

Selecció: reproducció i fenologia.

Mallorca: Pas prenupcial, primeres cites el 4-IV amb 1 ex. a Son Real (Santa Margalida) (SCH/Observation), el 15-IV (1 ex.) a Son Serra (Santa Margalida) (BLB/Observation), el 19-IV (1 ex.) a s'Albufera (RES, VIC, PNAM), i el 20-IV (1 ex.) a l'ataleia d'Albercutx (Pollença) (GORA).

Pas postnupcial, darrer registre el 22-IX amb 1 ex. a l'Albufereta (RES, VIC, RNSA), l'11-IX amb 1 ex. al canal de Cabrera (cap de ses Salines) (MON), i el 8-IX amb 8 ex. a Santanyí (JMO/Observation).

Menorca: Pas prenupcial, primeres cites el 24-III amb 1 ex. a Son Sau-ra del Nord (es Mercadal) (CAU, VEG, VLN), i el 27-III amb 1 ex. al camí de sa Boval (Maó) (PIR).

Pas postnupcial, darrer registre el 23-IX amb 1 ex. a Llucmaçanes (Maó) (GRI).

Eivissa: Prenupcial, primera cita el 4-IV amb 1 ex. a ses Salines (Sant Josep) (PRG).

Anthus pratensis. Titina sorda, titeta sorda (ME), titina borda (EI). Bisbita común. Meadow Pipit

Estatus: hivernant abundant, escàs (CA), i rar (DR). Migrant abundant (MA-ME), moderat (EI), escàs (CA), i rar (FO-DR).

Selecció: fenologia, màxims i dormidors.

Mallorca: Hivernada, uns màxims de **265** ex. a sa Barrala (Campos) el 3-I (SOL-BEN/eBird), 180 ex. al Blanquer de Maria el 13-I (RES/eBird), 116 ex. al pla de Vilafranca el 19-I (GRC/eBird), 93 ex. al vall d'Orient (Bunyola) el 28-I (RES/eBird), 75 ex. a l'Albufereta l'11-II (BEN-HIN- LOP-MAC/eBird), 52 ex. al

prat de Sant Jordi (Palma) el 4-I (BEN-MAC/eBird), i 40 ex. a Son Sales (Marratxí) el 28-I (GON).

Pas prenupcial, darreres cites el 4-V amb 1 ex. al cap de Formentor (Pollença) (HKS/Observation), el 18-IV (1 ex.) a Ariant (Pollença) (GON), el 13-IV amb 4 ex. a l'atalaia d'Albercutx (Pollença) (GORA), i el 3-IV amb 19 ex. al pla de Llenaire (Pollença) (SCH/Observation).

Pas postnupcial, primers registres el 6-IX amb 1 ex. al Blanquer de Maria (MON), el 13-X (4 ex.) a la serra de la Punta (Pollença) (SCH/Observation), i també 18 ex. al Salobrar de Campos, i el 15-X amb 6 ex. al cap de ses Salines (Santanyí) (JMO/Observation).

Hivernada, uns màxims de 110 ex. a sa Barrala el 28-XI, i 75 ex. al pla de Vilafranca el 15-XI (RES/eBird).

Dragonera: prenupcial, 1 ex. el 2-IV (JMO/Observation).

Menorca: Lluçmaçanes, Maó. 5 ex. el 29-X (GRI).

Eivissa: Pas prenupcial, darrera cita el 13-IV amb 5 ex. a Sant Antoni (SDW/Observation).

Pas postnupcial, primers registres el 28-X amb 10 ex. a ses Salines (Sant Josep) (BKX/Observation). Un màxim de 100 ex. a ses Salines (SDW/eBird).

Hivernada, un màxim de 88 ex. al camí des Fornàs (Vila) el 17-XII (GAB/eBird).

Formentera: Pas prenupcial, 1 ex. el 3-IV a la Mola (MTF/Observation).

Anthus trivialis. Titina d'arbre, titina dels arbres (MA-EI-FO), titeta d'arbre (ME). Bisbita arbóreo. Tree Pipit

Estatus: migrant moderat, i escàs (DR).

Selecció: fenologia.

Mallorca: Pas prenupcial, primeres cites el 25-III amb 1 ex. a Can Cuillerassa (Pollença) (RES/eBird), el 31-III (1 ex.) a l'Albufereta (KRG/Observation), i el 1-IV amb 1 ex. a s'Albufera (RES, VIC, PNAM).

Talaia d'Albercutx, Pollença. Escoltes d'exemplars en vol nocturn al vespre, **177** ex. des del 4-IV al 1-V, s'indica l'interval horari de pas (RES/NFC).

Gravats Albercutx	4-IV	17-IV	18-IV	18-IV	28-IV	29-IV	29-IV	1-V
Exemplars	8	29	20	15	73	7	15	10
Interval de pas	7:17 - 7:48	7:04 - 7:36	4:11 - 6:10	7:07 - 7:28	1:36 - 2:41	7:01 - 7:03	22:29 - 23:49	6:46 - 7:00

Darreres cites el 16-V amb 1 ex. a l'Albufereta (DRS/Observation), el 15-V (1 ex.) al Salobrar de Campos (LNG/Observation), i el 2-V (3 ex.) a Felanitx (JMO/Observation).

Pas postnupcial, primers registres el 6-IX amb 1 ex. al coll de Pollença a Ariant (Pollença), l'11-IX (1 ex.) al far de Formentor (Pollença) (GON) i també al canal de Cabrera (cap des ses Salines) (MON) i també al pla de Vilafranca (2 ex.), i el 13-IX (1 ex.) a Felanitx (JMO/Observation).

Escoltes d'exemplars en vol nocturn al vespre, **49** ex. des del 29-IX al 28-XI a tres localitats: Cap de ses Salines (Santanyí), Can Bauma (Alcúdia), i al pinar des Trenc (Campos) (RES/NFC).

Gravats	Data	Ex.	Interval horari de pas
Cap Salines	29-IX	15	Estima. Se senten gairebé durant tot el temps: 06:46 (NFC2), 06:51 (NFC8), 07:03 (NFC6), 07:10 (NFC14), 07:26 (NFC2), 07:31 (NFC17), 07:33 (NFC1), 07:37 (NFC38), 07:45 (NFC12), 07:55 (NFC16), 08:01 (NFC3), 08:04 (NFC18). Aus en vol però també algun exemplar posat als arbres propers.
	4-X	22	06:39 (NFC4), 06:55 (grupet, NFC17), 06:57 (NFC1), 06:58 (NFC1), 07:02 (NFC1), 07:08 (almenys 2 aus, NFC11), 07:46 (NFC4), 07:50 (NFC5), 07:54 (2 aus, NFC13), 07:56 (NFC2), 07:58 (NFC4), 07:59 (grupet, NFC34), 08:09 (NFC8)
Can Bauma	23-X	11	Grup gran a les 19:28 (NFC76), 06:36 (NFC1)
Es Trenc	28-XI	1	Reclamant des dels pins a les 07:20

Darreres cites el 28-XI amb 1 ex. gravat reclamant al pinar des Trenc (Campos) a les 7:20 h, el 23-X amb 11 ex. gravats a Can Bauma (Alcúdia) (RES/NFC), i el 15-X (1 ex.) a Santanyí (JMO/Observation).

Cabrera: Pas prenupcial, al menys present entre 17-IV amb 4 ex. (VIC) fins al 26-IV amb 1 ex. (TSL/Observation).

Pas postnupcial, 1 ex. el 15-IX (MUN, PAM, SOL, MOU).

Dragonera: Pas prenupcial, almenys present entre el 19-IV amb 1 ex. fins al 22-IV amb 1 ex. (JMO/Observation).

Menorca: Pas postnupcial, el 29-VIII (1 ex.) a es Canutells (RAE/eBird), 1 ex. el 15-X a Son Bou (Alaior) (PIR).

Eivissa: Pas prenupcial, primeres cites el 29-III amb 1 ex. a Sant Miquel de Balansat (Sant Joan) (MAR), i 1 ex. a ses Feixes (Vila) (CST/eBird). Darrers registres el 7-V amb 1 ex. a Sant Antoni, i el 24-IV amb 1 ex. a ses Salines (Sant Josep) (SDW/Observation).

Anthus hodgsoni. Titina de Hodgson, titina d'esquena olivàcia (MA). Bisbita de Hodgson (ES). Olive-backed Pipit

Estatus: divagant (ME-CA-DR). *Selecció:* tots els registres rebuts. Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Anthus cervinus. Titina gola-roja, titeta gola-roja (ME). Bisbita gorgirrojo. Red-throated Pipit

Estatus: migrant rar (MA-ME-EI-CA-DR).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: Hivernada, **1** ex. a sa Barrala (Campos) el 3 i 8-I (BEN-SOL/eBird).

Can Cullerassa, Pollença. **1** ex. passa reclamant el 18-I (BEN-MAC/eBird).

Pla de Vilafranca. Present entre el 15-XI (**2** ex.) fins al 16-XII (1 ex.) (RES/eBird).

Es Blanquer de Maria. **1** ex. reclamant a la vora de camp acabat de llaurar el 18-XII (RES/eBird).

Pas prenupcial. Primera cita el 18-IV amb 1 ex. reclamant a l'Albufereta (MAC/eBird), el 19 i 29-IV (2 ex. amb plomatge nupcial) a Es Blanquer de Maria (SOL/eBird), el 24-IV amb 2 ex. (♂ ♀) a l'Albufereta (PRN/eBird). Darrera el 30-IV (1 ex.) a s'Albufera (TSL/Observation).

Menorca: Pas postnupcial. 1 ex. el 10-XI al camí de Tramuntana (es Mercadal) (PIR).

Eivissa: Pas postnupcial, present entre el 3-XI amb 1 ex., i el 15-XI amb 1 ex., ambdós a ses Salines (Sant Josep) (SDW/eBird).

Anthus spinoletta. Titina de muntanya, titeta de muntanya (ME). Bisbita ribereño alpino. Water Pipit

Estatus: hivernant moderat (MA) i escàs (ME-EI-FO). Migrant escàs (MA-ME-EI), i rar (CA).

Selecció: fenologia.

Mallorca: Pas prenupcial, darreres cites el 30-III (1 ex.) a s'Albufera, i el 31-III (1 ex.) a l'Albufereta (RES, VIC, PNAM, RNSA).

Pas postnupcial, primers registres el 29-X (1 ex.) a l'Albufereta, i el 1-XI (1 ex.) a s'Albufera (RES, VIC, RNSA, PNAM).

Eivissa: Pas postnupcial, primera cita l'1-XI amb 3 ex. a ses Salines (Sant Josep) (SDW/Observation).

Anthus petrosus. Titina d'aigua. Bisbita ribereño costero. European Rock Pipit

Estatus: accidental (MA). *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Fringilla coelebs. Pinsà. Pinzón vulgar. Common Chaffinch

Estatus: reproductor i sedentari abundant (MA) i moderat (ME). Hivernant abundant (MA-EI), moderat (ME-FO-DR) i escàs (CA). Migrant abundant (MA) i moderat (ME-EI-FO-CA-DR).

Selecció: reproducció, fenologia i subespècies.

Mallorca: Hivernada, un màxim de 30 ex, a Felanitx l'11-I (JMO/Observation).

Pas postnupcial, cap de ses Salines, exemplars en moviment per la costa, amb **222** ex. des del 15-X fins al 4-XI. Màxims diaris: (JMO/Observation).

Dates Postnupcial	15-X	2-XI	4-XI
Exemplars	6	176	40

Dragonera: Pas postnupcial, el 12-IV amb 1 ex. (JMO/Observation).

Pas postnupcial, el 18-IX amb 1 ex. (JMO/Observation).

Fringilla coelebs balearica. Pinsà. Pinzón vulgar. Common Chaffinch

Estatus: reproductor i sedentari abundant (MA) i moderat (ME).

Selecció: reproducció.

Mallorca: Reproducció, primers cants a partir del 20-III al pla de Cúber (Escorca) (PHP/Observation). Adult amb menjar al bec el 16-VI al camí de ses Penyes (Andratx) (BEN/eBird). Femella adulta alimentant poll volander el 14-V al camí de Muleta (Sóller) (FIO).

Fringilla montifringilla. Pinsà mè, pinsà mec (ME). Pinzón real. Brambling

Estatus: hivernant escàs (MA-ME) i rar (EI-FO-CA). Migrant escàs (MA-ME) i rar (CA-DR).

Selecció: fenologia i localitats.

Mallorca: Hivernada, darrera cita el 4-I amb 2 ex. (♂ ♀) al vall d'Orient (Bunyola) (BEN-MAC/eBird).

Pas postnupcial, primera cita el 19-XII amb 1 mascle a sa Comuna (Bunyola) (BAZ).

Menorca: Hivernada, 2 ex. el 28-I a ses basses de Lluriac (es Mercadal) (VLN).

Eivissa: Pas postnupcial, el 4-XI amb 1 ex. a ses Salines (Sant Josep) (VZZ/eBird).

Coccothraustes coccothraustes. Durbec, becgròs (ME). Picogordo. Hawfinch

Estatus: hivernant moderat (MA), escàs (ME) i rar (EI). Migrant escàs (MA-ME-CA-DR) i rar (EI-FO).

Selecció: fenologia, tots els registres a EI-FO, i dades d'interès (sobre quin arbre està posat alimentant-se).

Mallorca: Pas prenupcial, darrer registre el 10-IV (1 ex.) al Rafalbeig (Calvià) (GLT).

Pas postnupcial, 4 ex. el 5-XI a s'Albufera (RES, VIC, PNAM).

Escoltes d'exemplars en vol nocturn al vespre, gravats **177** ex. des del 8-X al 28-XI, gravats a dues localitats: Can Bauma (Alcúdia), i al pinar des Trenc (Campos). S'indica l'interval horari de pas (RES/NFC).

Gravats	8-X	10-X	15-X	17-X	18-X	24-X	1-XI	7-XI	8-XI	14-XI	28-XI
Can Bauma / Ex.	1	1	10	5	4	5	2	7	5	2	-
Es Trenc / Ex.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
Interval de pas / h	Clarejar	2:19	8:03-8:12	7:56	8:08-8:10	8:24-8:26	8:45	7:16-7:20	7:24	7:56	7:20

Hivernada, 2 ex. el 20-XII a s'Albufera (RES, VIC, PNAM).

Cabrera: Pas postnupcial, 14 ex. el 20-X (BAZ-SCH/eBird), i 30 ex. el 25-X (RES/eBird).

Menorca: Son Putxet, Alaior. 4 ex. volant i reclamant el 17-XI (ALL/eBird).

Eivissa: Pas postnupcial, primeres cites el 17-X amb 1 ex. a Sant Joan (SDW/Observation), i el 24-X amb 5 ex. al pla de Sant Mateu (SDW/eBird).

Pyrhula pyrrhula. Pinsà borroner. Camachuelo común. Eurasian Bullfinch

Estatus: hivernant rar (MA-ME). *Selecció*: tots els registres rebuts. Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Bucanetes githagineus. Passerell trompeter, pinsà trompeter (MA-ME). Camachuelo trompetero. Trumpeter Finch

Estatus: accidental (MA-ME-CA).

Selecció: tots els registres rebuts.

Cabrera: **1** ex. el 17-V.

Eivissa: **1** ex. el 30-IV al Port d'es Torrent (Sant Josep).
Per a més informació d'aquests registres homologats, vegeu-ne l'informe del Comitè de Rareses de Balears.

Carpodacus erythrinus. Passerell carminat, pinsà carminat (MA-ME-EI-FO). Camachuelo carminoso. Common Rosefinch

Estatus: migrant rar. *Selecció*: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Chloris chloris (abans *Carduelis chloris*). Verderol. Verderón. European Greenfinch

Estatus: reproductor i sedentari abundant (MA-EI), moderat (ME-CA) i escàs (FO-DR). Hivernant moderat (ME-EI) i escàs (MA). Migrant moderat (ME) i escàs (MA).

Selecció: reproducció i dades d'interès.

- Mallorca:** Reproducció. S'Albufera. Primers cants a partir del 2-II. Observació de joves a partir del 6-V fins al 18-VI (RES, VIC, PNAM).
Albufereta. Observació de joves a partir del 14-IV fins al 23-VI (BEN-MAC/eBird; RES, VIC, RNSA).
Palma. Observació de joves a partir del 21-IV a Bons Aires (SAS).
- Dragonera:** construcció de nius a partir del 2-II, polls el 3-IV (JMO/Observation).
- Menorca:** cala Morell, Ciutadella. 2 adults amb un niu amb polls el 18-VI (VDR/Observation).
- Eivissa:** observació de joves a partir del 13-V amb 4 ex. a Ca n'Andreu (Sant Mateu) (SEP/eBird). Un màxim de 50 ex. a Sant Josep el 6-XI (SDW/Observation).

Linaria cannabina (abans *Carduelis cannabina*). Passerell, llinguer (EI-FO). Pardillo común. Common Linnet

Estatus: reproductor i sedentari abundant (MA-EI), moderat (ME-FO), i escàs (CA-DR). Hivernant moderat (ME) i escàs (MA). Migrant moderat (ME) i escàs (MA-CA).

Selecció: reproducció i dades d'interès.

Mallorca: Reproducció. S'Albufera. Observació de joves a partir del 9-V (RES, VIC, PNAM).

Torrent de Santa Ponça, Calvià. Observació de joves a partir del 16-V (BEN/eBird).

Albufereta, observació de joves a partir del 23-VI (RES, VIC, RNSA).

Hivernada, uns màxims de **825** ex. a es Blanquer de Maria el 31-XII, i 350 ex. al pla de Vilafranca el 15-XI (RES/eBird).

Dragonera: construcció de nius a partir del 14-V (TOM/eBird).

Menorca: Cala Sant Esteve, es Castell. 7 joves el 17-VI (VDR/Observation). De s'Albufera a la Mola. Un màxim de 80 ex. el 27-X (JMO/Observation).

Eivissa: Un màxim de 70 ex. a Sant Joan el 27-X (SDW/Observation).

Acanthis flammea (abans *Carduelis flammea*). Passerell golanegre. Pardillo sizerín. Common Redpoll

Estatus: accidental (ME). **Selecció:** tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Loxia curvirostra. Trencapinyons. Piquituerto. Red Crossbill

Estatus: reproductor i sedentari abundant (MA) i moderat (EI). Hivernant rar (CA-DR). Migrant rar (DR). Accidental (ME-FO).

Selecció: reproducció, subespècies i tots els registres a ME-FO.

Mallorca: Reproducció. Observació de joves a partir de l'1-IV a ses basses de Magaluf (Calvià) (BEN-MAC/eBird), fins al 13-IX a Son Real (Santa margalida) (BTT/Observation).

Dragonera: 4 ex. el 2-II (JMO/Observation).

Carduelis carduelis. Cadenera. Jilguero. European Goldfinch

Estatus: reproductor i sedentari abundant, moderat (FO), i escàs (CA-DR). Hivernant moderat (ME-EI) i escàs (MA-CA). Migrant moderat (ME-EI) i escàs (MA-CA).

Selecció: reproducció i dades d'interès.

Mallorca: Reproducció, Albufereta, observació de joves fins al 23-VI (RES, VIC, RNSA).

S'Albufera. Observació de polls fins al 29-VI (ENL/Observation), i joves a partir de l'11-V fins a l'1-VII (RES, VIC, PNAM).

Palma. 2 ex. s'estaven alimentant d'una bossa de processonària el 20-IV (MUT).

Sa Barrala, Campos. Un grup de 300 ex. el 28-IX (MAC/eBird, CST/eBird).

Menorca: Ciutadella. 5 adults i 12 joves a la plaça dels Pins el 10-VI (VDR/Observation).

Eivissa: Reproducció, primers joves a partir de l'11-V a ses Feixes (Vila) (SEP/eBird).

Un màxim de 100 ex. a Sant Joan el 27-X (SDW/Observation).

Formentera: observació de joves a partir del 26-V a l'estany Pudent (SEP/eBird).

Carduelis citrinella (abans *Serinus citrinella*). Lluçaret (ME), verderol menut (MA). Verderón serrano. Citril Finch

Estatus: accidental (MA-DR). *Selecció*: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Serinus serinus. Gafarró, serí (ME), garrafó (EI). Verdecillo. European Serin

Estatus: reproductor i sedentari abundant (MA-EI-FO), escàs (DR), i rar (CA). Hivernant abundant (EI), escàs (MA-ME), i rar (CA). Migrant escàs (MA-ME-EI-CA).

Selecció: reproducció i dades d'interès.

Mallorca: Reproducció. S'Albufera, primers cants a partir del 21-I, i joves del 11-V (RES, VIC, PNSM). Segona posta amb 1 femella covant el 17-VI (GAB/eBird).

Primers joves a partir del 16-IV al golf de Son Quint (Palma) (MAC/eBird) fins al 27-VII al Parc de la Ribera (Palma) (VDD/Observation).

Albufereta. Primers joves a partir del 2-VI (RES, VIC, RNSA).

Menorca: Pas postnupcial, 1 ex. el 21-X a Punta Prima (Sant Lluís) (PIR).

Eivissa: Reproducció, primers joves a partir del 7-IV a ses Feixes (Vila) (SEP/eBird).

Un màxim de 100 ex. a un conreu de ses Salines (Sant Josep) el 24-IX (VDM/Observation).

Formentera: Pas prenupcial, mar endins, 2 ex. es posen al vaixell en navegació, altres van passar volant cap al N durant més de 20 minuts, el 22-III a unes 45,8 mn al SE de Punta Roja (TYL/eBird).

Spinus spinus (abans *Carduelis spinus*). Lluonet, lleonet (MA-FO), lugru (ME), llogaret (EI). Lúgano. Eurasian Siskin

Estatus: hivernant moderat (MA-EI), escàs (ME-FO), i rar (CA). Migrant moderat (MA) i escàs (ME-EI-FO-CA-DR). Cria esporàdica (MA).

Selecció: fenologia.

Mallorca: Pas prenupcial, darreres cites el 4-V amb 3 ex. al cap de Formentor (Pollença) (HKS/Observation), el 22-IV (1 ex.) a Son Real (Santa Margalida) (GSR-DPR/Observation), i el 18-IV amb 1 femella a Ariant (Pollença) (GON).

Escoltes d'exemplars en vol nocturn al vespre, gravats: 3 ex. ja gairebé de matinada del 3-IV i 1 ex. gairebé de matinada del 4-IV ambdós al Comú de Muró, i el 17-IV amb un grupet de 5 ex. a les 7:15 h a la talaia d'Albercutx (Pollença) (RES/NFC).

Pas postnupcial, primers registres el 10-X amb 1 mascle a s'Evangèlica (Andratx) (BAZ), el 23-X amb 2 ex. a l'Albufereta (SCH/Observation) i també a Felanitx, i el 2-XI (1 ex.) al cap de ses Salines (Santanyí) (JMO/Observation).

Cabrera: Pas postnupcial, 1 ex. el 20-X (BAZ-SCH/eBird).

Dragonera: Hivernada, 8 ex. l'1-II (JMO/Observation).

Menorca: Pas prenupcial. l'1-IV sentit 1 ex. a ses Salines d'Addaia (es Mercadal) (ALL/eBird), i 1 ex. el 24-IV a l'Hort d'es Lluïsser (Alaior) (CAU).

Pas postnupcial. Poliesportiu d'Alaior (Alaior), 1 ex. el 4-X (VLN). Cas urbà de Maó, 1 ex el 29-X (PIR).

Parc Rubió i Tudurí, Maó. 12 ex. el 25-XI (PIR).

Eivissa: Hivernada, uns màxims de 17 a un grup mixt a es Pla de Sant Antoni el 19-I (YAR/eBird).

Pas prenupcial, darreres cites el 12-V amb 1 ex. al pla de Sant Mateu, i el 2-IV amb 1 ex. a Ca n'Andreu (Sant Mateu) (SEP/eBird).

Pas postnupcial, primeres cites el 21-X amb 1 ex. a Sant Joan, i el 24-X amb 1 ex. al pla de Sant Mateu (SDW/Observation-eBird).

Calcarius lapponicus. Hortolà de Lapònia. Escribano lapón. Lapland Longspur

Estatus: accidental (Ma-ME). **Selecció:** tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Plectrophenax nivalis. Hortolà blanc, sit blanc (ME). Escribano nival.

Snow Bunting

Estatus: Hivernant rar (EI), i migrant rar (MA-ME).*Selecció:* tots els registres rebuts.*Mallorca:* es Blanquer de Maria. Present **1** mascle adult des del 13 al 24-I.

Per a més informació d'aquests registres homologats, vegeu-ne l'informe del Comitè de Rareses de Balears.

Emberiza calandra. Sól·lera, súl·lera (ME). Triguero. Corn Bunting*Estatus:* reproductor i sedentari abundant (MA-ME), moderat (EI) i escàs (FO). Migrant escàs (FO-CA), i rar (DR).*Selecció:* reproducció i dades d'interès.*Mallorca:* Hivernada, uns màxims de 83 ex. (d'ells uns 60 ex. alimentant-se en camp llaurat al costat de *A. arvensis* i *A. pratin-sis*) sa Barrala (Campos) el 3-I (BEN/eBird), 55 ex. als afores de Sineu el 16-I (RES/eBird), 46 ex. al pla de Vilafranca el 19-I (GRC/eBird), i 35 ex. a es Blanquer de Maria el 13-I (RES/eBird).

S'Albufera. Un màxim de 50 ex. el 28-XII (RES, VIC, PNAM).

Reproducció. Es Blanquer de Maria, abundància de mascles cantant al llarg d'un transecte de 2,0 km (cultiu principal cereal i parcel·les d'olivera i ametller) es comptabilitzen 32 individus (IKA= 16), el 6-IV (SOL/eBird).Postnupcial, un màxim de 160 ex. a es Blanquer de Maria el 24-VIII i 20-IX (RES/eBird).

Pla de Vilafranca. Un màxim 125 ex. el 15-XI (RES/eBird).

Menorca: Cala Viola, es Mercadal. Un màxim de **100** ex. el 7-IX (CRT).***Emberiza citrinella***. Hortolà groc, sit groc (ME). Escribano cerillo. Ye-

llowhammer

Estatus: hivernant rar (MA). Migrant rar (MA-CA-DR). Accidental (ME-EI).*Selecció:* tots els registres rebuts.*Mallorca:* vall d'Orient, Bunyola. Present **1** mascle el 4-I. I **1** ex. el 13-XI. Son Hortolà (Calvià). **1** mascle el 26-I.

Per a més informació d'aquests registres homologats, vegeu-ne l'informe del Comitè de Rareses de Balears.

Emberiza leucocephalos. Hortolà capblanc. Escribano cabeciblanco.

Pine Bunting

Estatus: accidental (MA). *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Emberiza cia. Hortolà cellard, hortolà negre (MA, EI, FO), sit negre (ME).

Escribano montesino. Rock Bunting

Estatus: hivernant rar (MA-ME-FO). Migrant rar (MA-ME-FO-CA).

Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

***Emberiza hortulana*.** Hortolà. Escribano hortelano. Ortolan Bunting

Estatus: migrant escàs (MA-ME-FO-CA), i rar (EI-DR).

Selecció: fenologia.

Mallorca: Pas prenupcial, el 18-IV amb 1 mascle a Galatzó (Calvià) (SOL/eBird).

Talaia d'Albercutx, Pollença. Escoltes d'exemplars en vol nocturn al vespre, gravats 9 ex.: el 18-IV amb 5 ex., un d'ells ha arribat a emetre notes de cant (04:35 h (NFC5), 04:52 h (NFC2), 05:22 h (NFC2), 05:37 h (NFC1), 05:39 h (NFC2)).

El 26-IV amb 1 ex. (21:47 h (NFC1)).

El 28-IV amb 3 ex. (03:52 h (NFC1), 04:39 h (NFC3), 04:51 h (NFC1)) (RES/NFC).

Cabrera: Pas postnupcial, 1 jove de primer estiu el 15-IX (MUN, PAM, SOL, MOU).

***Emberiza caesia*.** Hortolà cendrós. Escribano ceniciento. Cretzschmar's Bunting

Estatus: accidental (CA). **Selecció:** tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

***Emberiza cirlus*.** Sól-lera boscana, sit de coll negre (ME), hortolà de coll negre (EI-FO). Escribano soteño. Cirl Bunting

Estatus: reproductor i sedentari moderat (MA) i escàs (EI). Accidental (ME-CA-DR).

Selecció: reproducció.

Mallorca: hivernada, uns màxims de **38** ex. el 28-I al vall d'Orient (Bunyola) (RES/eBird), i 20 ex. a Son Fortesa (Puigpunyent) el 29-I (BEN-SOL/eBird).

Reproducció, primers cants el 27-IV a Son Servera (TSL/Observation) i també a Galatzó (Calvià) (CST/eBird). Observació de joves a partir del 8-VI a s'Evangèlica (Andratx) (BAZ/eBird).

Ariant (Pollença). Un grup de 30 ex. el 10-IX (RYD/eBird).

Eivissa: Reproducció, primers cants el 21-III amb 2 ex. a Sant Antoni (BSS/Observation).

***Emberiza pusilla*.** Hortolà menut, hortolà petit (MA-FO), sit petit (ME). Escribano pigmeo. Little Bunting

Estatus: migrant rar (MA-ME-EI-FO-CA). **Selecció:** tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Emberiza rustica. Hortolà rústic. Escribano rústico. Rustic Bunting
Estatus: accidental (ME). *Selecció:* tots els registres rebuts.
 Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Emberiza aureola. Hortolà caranegre. Escribano aureolado. Yellow-breasted Bunting
Estatus: accidental (CA). *Selecció:* tots els registres rebuts.
 Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Emberiza melanocephala. Hortolà capnegre. Escribano cabecinegro. Black-headed Bunting
Estatus: accidental (MA). *Selecció:* tots els registres rebuts.
 Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Emberiza schoeniclus. Hortolà de canyet. Escribano palustre. Common Reed Bunting
Estatus: reproductor i sedentari escàs (MA). Hivernant moderat (MA) i escàs (ME-EI). Migrant moderat (MA), escàs (ME) i rar (EI-FO-CA-DR).
Selecció: reproducció, fenologia, subespècies i màxims a dormidors.
Mallorca: hivernada. S'Albufera, màxims mensuals (RES/eBird).
 Sa Barrala-Salobrar, Campos. Màxims mensuals (BEN-SOL-RES/eBird; JMO/Observation).
 Basses de Magaluf, Calvià. Màxims mensuals (BAZ).
 Albufereta, màxims mensuals (BRC, BAZ).

<i>E. schoeniclus</i>	I	22*II	1*III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Albufera	+	40	+	+	+	+	+	+	+	+	26	40
Barrala-Salobrar	78	7*	0	0	0	0	0	0	0	0	-	1
Magaluf	6	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
Albufereta	-	-	1*	0	0	0	0	0	0	0	-	-

Menorca: Hivernada, 1 ex. el 9-I al golf de Son Parc (es Mercadal) (PIR).
 Son Boter, Alaior. 15 ex. el 22-XI (CAU).
 Son Bou, Alaior. 10 ex. el 10-XII (PIR).
Eivissa: Hivernada, 1 ex. el 19-XI a Santa Eulària des Riu (SDW/Observation).

Emberiza schoeniclus schoeniclus. Hortolà de canyet. Escribano palustre. Common Reed Bunting
Estatus: hivernant moderat (MA) i escàs (ME-EI). Migrant moderat (MA), escàs (ME) i rar (EI-FO-CA-DR).
Selecció: fenologia.
Mallorca: s'Albufera. Un gran grup de 40 ex. el 15-II. Un grup compacte d'unes 40 aus com a mínim, alimentant-se en un camp amb gramínies silvestres, acompanyats d'unes poques tinites i força cadeneres el 9-XII (RES/eBird).

LLISTA COMPLEMENTÀRIA

Els taxons amb la categoria D i E no formen part pròpiament de la llista dels ocells de les Illes Balears.

CATEGORIA D

Pica pica. Garsa. Urraca. Eurasian Magpie

Selecció: tots els registres rebuts.

Menorca: observacions de **1** ex. a Punta Prima (Sant Lluís) el 12-III (HUG) i el 13-III (PIR; MJJ/eBird), al Port de Maó a l'estació naval el 13-XI (BOR), i a Malbúger (Maó) el 22-XI (BCL). Probablement el mateix ex. (N. de l'ed.).

CATEGORIA E

Anser anser var. *domestica*. Oca domestica. Ánsar común. Greylag Goose Paleàrtic.

Mallorca: 1 ex. des de 19-IX a 3-XI a les localitats de Capdepera, Escorca, Llucmajor i Esporles (GRD).

Menorca: Prat de Son Bou, Alaior. 4 ex. el 16-IX (CRT).
Alaior. 1 ex. el 19-IX (TRP/Observation).

Anser cygnoides var. *domestica*. Ánser cisne. Ganso cisne. Swan Goose Paleàrtic oriental

Menorca: Platja de Son Bou, Alaior. **1** ex. associat al canal del prat el 13-XI (MJJ/eBird).

Primera vegada que es veu en llibertat. Aquesta oca és originària d'Àsia oriental. Amb aquesta ja són **97** les espècies introduïdes que es poden veure o s'han observat a Balears.

Coscoroba coscoroba. Cigne coscoraba. Cisne coscoraba. Coscoroba Swan

Neotropical

Mallorca: Present 1 ex. des del 8-IV-2022 fins al 28-XII-2024, al Prat de Maristany (MAC-RES-LOP/eBird).

Cygnus atratus. Cigne negre. Cisne negro. Black Swan Australàsia.

Mallorca: s'Albufera. 1 ex. el 3-I (RES, VIC, PNAM).

Netta peposaca. Chibec peposaca. Pato picaso. Rosy-billed Pochard Neotropical.

Mallorca: Bassa de Can Guidet, Palma. 1 ex. des del 30-IX fins al 15-X (MAC/eBird).

Cairina moschata var. *domestica*. Ànnera muda. Pato criollo doméstico.
Muscovy Duck

Neotropical.

Selecció: reproducció i noves localitats.

Mallorca: Esporles. 22 adults amb 8 pollets mitjans i 12 pollets molt petits l'1-VI (GRD). 32 ex. el 27-VIII, perilla la seva continuïtat perquè degut a les restriccions d'aigua ja no ve cap sobrant d'aigua al torrent (BAU). 38 ex. el 16-XI (BAC, GRD).

Menorca: Prat de Son Bou, Alaior. Un màxim de 12 ex. el 13-XI (MJJ/eBird).

Eivissa: Santa Eulàlia. Present 1 ex. des del 28-I fins al 21-XI (VDV-ODS/Observation).

Aix galericulata. Ànnera mandarina, àneda mandarina (ME). Pato mandarin. Mandarin Duck

Paleàrtic oriental.

Mallorca: Son Reus, Palma. 1 mascle a ses basses el 14-II (ZMR/eBird).

Sibirionetta formosa. Sel·la del Baikal. Cerceta del Baikal. Baikal Teal
Paleàrtic oriental.

Mallorca: Basses de Son Navata, Felanitx. 1 ex. el 2-IX (MTA/eBird).

Primera vegada que es veu en llibertat aquesta sel·la que habita a Sibèria fins a la península de Kamtxatka. Amb aquesta ja són **96** les espècies introduïdes que es poden veure o s'han observat a Balears.

Anas bahamensis. Ànnera de les Bahames. Ánade gargantillo. White-cheeked Pintail.

Neotropical.

Mallorca: Albufereta. el 9-IX amb 1 ex. a Can Cullerassa (RES/eBird).

Prat de Maristany, Alcúdia. 1 ex. l'11-IX (MAC/eBird).

S'Albufera. 1 ex. el 3-I i des del 11-X al 18-XI (RES, VIC, PNAM).

Numida meleagris var. domèstica. Faraona (MA), gallina morisca (ME).
Pintada común. Helmeted Guineafowl

Afrotropical.

Mallorca: Esporles. 1 ex. el 3-XI (GRD/Observation).

Pavo cristatus var. domèstica. Indiot reial, paó reial (ME). Pavo real común. Indian Peafowl

Paleàrtic asiàtic.

Mallorca: s'Albufera. Un màxim de 6 ex. a la depuradora el 5-III (MUN, SOL).

Pelecanus rufescens. Pelicà rosat. Pelicano rosado (ES). (Categoria D, E)
Afrotropical

Menorca: Albufera des Grau, Maó. 2 ex. el 13-I (PNAG). Primera vegada que es veuen 2 ex. Des d'octubre del 2020 ve a la tardor-hivern un exemplar (probablement el mateix) escapat de la col·lecció de Réserve Africaine de Sigean, a la costa Mediterrània de França (LOP).

Aquila chrysaetos. Àguila reial, àguila daurada (ME). Águila real (ES)
Paleàrtic.

Mallorca: s'Albufera. Present 1 femella de gener fins a maig i torna el 3-VII (RES, VIC, PNAM).
Costitx. 1 ex. assetjat per milana reial el 20-III (VEN).
Es Blanquer de Maria. Present 1 adult des del 18-IV (NLS/eBird) fins al 10-X (BZM/Observation).
L'exemplar femella assilvestrat que es veu per Mallorca va fugir d'un cetrer l'any 2004.

Parabuteo unicinctus harrisi. Aligot de Harris. Busardo de Harris.
Harris's Hawk

Neotropical i neàrtic

Mallorca: sa Barrala, Campos. 1 ex. el 3 i 8-I (BEN-SOL/eBird).
Basses de Magaluf, Calvià. 1 ex. el 30-I (HIN-MOU/eBird).
Palma. 1 ex. el 20-IX a l'avinguda Alemanya i plaça del Tub (CST/eBird).

Nymphicus hollandicus. Cacatua de les nimfes. Cacatúa ninfa. Cockatiel
Australasia.

Eivissa: Sant Antoni. 2 ex. a Can Maymó el 7-V (SDW/eBird).

Ara ararauna. Guacamai ararauna. Guacamayo azul y amarillo. Blue-and-yellow macaw

Neotropical.

Eivissa: Sant Joan. 1 ex. al S de Sant Miquel de Balansat el 21-I (SDW/Observation).

Agapornis roseicollis. Agapornis de Namíbia. Inseparable de Namíbia.
Rosy-faced Lovebird

Afrotropical (SW).

Mallorca: Palmanova, Calvià. 6 ex. al carrer de Jardiel Poncela 4, el 2-VI (BLL/eBird).

LLISTA DELS CODIS DELS COL·LABORADORS

Com cada any, el capítol de registres ornitològics és possible gràcies a la inestimable col·laboració de tots els seus participants. En aquesta llista s'inclouen els codis emprats en el text per identificar cadascun dels 1)

321 observadors i 2) 7 institucions d'informació que han aportat registres de 2024 a l'AOB. El sistema de codificació del banc de dades de l'Anuari està format per tres dígits i utilitza com a base les tres primeres lletres del primer cognom de l'observador. En els casos de repeticions s'utilitzen altres lletres del cognom o del nom. En el cas de les institucions, el codi està format per quatre dígits utilitzant les primeres lletres de cada paraula més representativa.

Citau GOB Mallorca. Disponible: <https://citau.gobmallorca.com/> (Consultat: 3 de febrer de 2025, 14:43 h). A cada observador li correspon a l'AOB un codi de tres lletres que figura a la llista d'observadors.

eBird. Laboratori d'Ornitologia de Cornell, Ithaca, Nova York. Disponible: <http://www.ebird.org> . (Consultat: 2 de febrer de 2025, 06:37 h (00:37 EST (NY))). A cada observador li correspon a l'AOB un codi de tres lletres que figura a la llista d'observadors.

Observation. Observation.org, Fundació Observation International i socis locals. Disponible: <https://observation.org/tos/>. (Consultat: 21 de gener de 2025). A cada observador li correspon a l'AOB un codi de tres lletres que figura a la llista d'observadors.

Observadors:

<u>Codi</u>	<u>Nom</u>	<u>Codi</u>	<u>Nom</u>	<u>Codi</u>	<u>Nom</u>
ADD	Nick Addey	BAU	Antoni Bauzá		Lluís Allès
ARS	Raf Aerts	BAN	Alberto Bazán	BOC	Tomeu Bosch
AKK	Phil Akkers	BAZ	Juan José Bazán	BOT	Frans Bot
ALL	Lluís & Bernat Allès	BLL	Jay Beale	BTT	David Botteldoorn
AMG	Jordi Amengual	BKX	Sven Beirincx	BCH	Lucien Brochier
ANG	Marc Anglada	BEN	Gabriel Bernat	BCN	Tracy Buchan
ARL	Luis Arbalejo	BNN	Keith Betton	BUS	Tomàs Busquets
ART	Catalina Artigues	BKR	Rik Beukers	BST	Roberto
ABD	Félix Arribas	BXT	Frederik Bexter		Bustamante
ARR	Ben Arrowsmith	BZM	Jan Bezemer	BZL	Mikolaj Buzala
ATK	Ray Atkinson	BLB	Luke Bilbrough	BYW	David Bywater
BBL	Linda B.	BNG	Bernd Boeing	CLV	Jose Arcadio Calvo
BBR	Rick B.	BGN	Ulla Böing	CAO	Josep Capo
BCL	Esteve Barceló	BLD	Dirk Bollen	CRN	José Manuel
BAC	Margarida Barceló	BML	Tom Bomadil		Cardona
BRC	Nacho Barcia	BOR	Jon Boronat	CAR	Josep Esteve
BRY	Thomas Bareyre	BSF	Frank Bos		Cardona
BRD	Sarah Barnard	BSS	Roely Bos	CRH	Brian Carruthers
BAR	Richard Barnes	BSH	Núria Bosch &	CST	Pau Castell

<u>Codi</u>	<u>Nom</u>	<u>Codi</u>	<u>Nom</u>	<u>Codi</u>	<u>Nom</u>
CTJ	Eugenio Castillejos	EWS	Dirk Eeuwes	HKS	Jordy Houkes
CAU	Sergi Caules	ENL	Ves Engels	HDS	Adam Hudson
CZM	Rommert Cazemier	ERB	David Erban	HUG	Francisco Huguet
CRV	Julia Cervero & Ovidi Alcover & Biel Miquel	ESC	Raül Escandell	HRT	Rober Hurtado
CES	Joan Cesari	EKK	Siegfried Ekkel	INK	Ineke
CTR	Liz Charter	ESR	Jaume Estarellas	INN	Rob Inns
CHT	Andreas Egelund Christensen	ETP	Israel Estopà	ISS	Marcos Isasi
CLF	Rafel Cladera	EVR	Bart Everts	JSB	Jens Jesberg
CLX	Gaëtan Clerbaux	FJJ	Rik & Max Feije	JVN	Arto Juvonen
COL	Damià Coll	FIO	Cristina Fiol	KRR	Bruce & Catherine Kerr
CRG	Martina Corgnati	FSC	Stefan Fischer	KRH	Robin Kirchmair
CRT	Joan Cortés	FLY	Steve Flynn	KLA	Barbara Klahr
CRS	José Luis Cortés	FPM	Rudy Fopma	KST	Paul Koster
COS	Santiago Costa	GMR	Mireia G.	KRT	Robin & Erick Kretzschmar
DMG	David Damgaard	GAU	Mateu Garau	KRG	Jan Ole Kriegs
DVE	Geordie Dave	GAB	Alberto García	LNG	Tim Langerak
DAZ	Carlos Daza	GRC	David García	LMT	Stéphane Lambert
DBB	Robert de Boer	GIA	Elisa García	LMR	Bert Lamers
BYR	Ioa Byrne	GRP	Pablo García	LGH	Nils-Eino Langhelle
DNL	Oscar Danielson	GRI	Óscar García- Febrero	LBN	Steve Lebon
DPT	Kees de Pater	GAR	Pere J. Garcías	LKN	Romeo Liekens
DVR	Hugo de Vergès	GRG	Emili Garriga	LNS	Karin Linders
DOP	Lidia den Oudendammer- Peters	GGS	Bernat Garrigos	LRN	Antoni López- Arenas
DKK	Jeroen Dekker	GAS	Xavier Gassó	LOP	Carles López- Jurado
DVJ	Miguel Ángel Del Viejo	GLT	Jaume Gelabert	LPV	Daniel López- Velasco
DLG	Victor Delgado	GGT	Hannes Giglot	LCL	Francesca Luculano
DPR	Geert Depreitere	GGL	Johan Giglot	LUQ	Antoni Luque
DPY	Bram Depuydt	GMS	Sara Gomes	MIM	Simon M.
DVS	Tony Devenish	GON	Joan Miquel González	MCB	Hilary MacBean
DWT	Barbara DeWitt	GZL	Margarita González	MDR	Nolwenn Madern
DGZ	Juancar Diéguez	GRD	Oscar Gordo	MSN	Peter Maessen
DIE	Pere Lluís Dietrich	GUT	Mabel Gutiérrez	MAC	Josep Manchado
DMZ	Rafa Domínguez	GUI	Ricard Gutiérrez	MAN	Xavier Manzano
DMS	Miguel Domínguez- Santaella	GSR	Filip Goussaert	MJS	Annelies Marijnjs
DRC	Sebastian Draack	GVR	Gert Govaerts	MRZ	Ismael Martínez
DRS	Folkert Draaisma	GWR	John Gowers	MRN	Marilo Martínez
DSS	Scott Dresser	HTT	Michael Hettich	MAR	Oliver Martínez
ECK	HP Eckstein	HIN	Daniel Hinckley	MLL	Victor Martínez Moll
		HNR	Amke Hinrichs	MAS	Francesc Xavier Mas
		HBK	Yves Hoebeke		
		HMR	Bartomeu Homar		

<u>Codi</u>	<u>Nom</u>	<u>Codi</u>	<u>Nom</u>	<u>Codi</u>	<u>Nom</u>
MMA	Rafel Mas	PEO	Sebastià Perelló	SVL	Elvira Silva
MMS	David Massie	PRG	Borja Pérez	TSL	Ted & Maarten C.J. Sluijter
MTM	Neus Matamalas	PTS	Marc Peters	SMT	Barbara Smit
MCT	Paolo Matteucci	PGR	Stefan Pilger	SMH	Ryan Smith
MTA	Antoni Mateu	PIR	Roman Piris	SLN	Nieves Solà
MLG	John Mcloughlin	PLG	Alex Plantinga	SOL	Antoni Soler
MCM	Miguel McMinn	PLD	Emiel Polder	SRL	Juan Sorli
MEN	Xavier Méndez	PSM	Willem Proesmans	SUA	Manuel Suárez
MSB	Marta Mesa	PXL	Mike Puxley	SRV	Ville Suorsa
MCK	Panagiotis Michalakos	QUN	Javi Quintana	TAP	José Manuel Tapia
MIL	Alan Miller	QUI	Susana Quintanilla	TRL	Línea Tero
MCH	Marta Mochales	RAE	Richard Rae	TSK	Jáchym Tesařík
MJJ	Jaime Mojao	RMS	Miquel Ramis	THR	Steve Thorpe
MGH	Anita Monaghan	RSY	Ken Ramsay	TIM	Gregor Tims
MON	Michael Montier	RTF	David Ratcliffe	THS	Eric Thomassen
MOL	Xavier Morell	RES	Maties Rebassa	TOM	Pere Tomas
MRF	Enric Morera	RAB	Sergi Rebassa	TSS	Niklas Torstensson
JMO	Jason Moss	RED	Sergio Redondo	TVR	Tino Tovar
MRP	Pierre Mourier	RJN	Hennie Reijnen	TRP	José Luis Trapero
MUT	Pere Manel Mulet	RSE	Anna Risse	TRI	Rafel Triay
MNT	Bosco G. Muntaner	RGZ	Amador Rodríguez	TRN	Martí Turrión
MUN	Jordi Muntaner	RDW	Willy Rodriguez	TYL	Andrew Tyler
MUÑ	Antoni Muñoz	RMY	C. D. Romy	VDS	Cas van de Giessen
MÑZ	Antonio-Román Muñoz	RRS	Antoni Ros	VDR	Hans van de Laar
MLR	Regi Müller	RSL	Maryam Roselló	VDW	Ben Van de Weyer
MTF	Daniel Musitu	RYL	Malcolm Royal	VDN	Jasper & Vincent van den Noulant
NVR	Mario Navarro	RTR	Evert Ruiter	VDC	Claire van der Aa
NEA	Michael Neale	RMN	Ramón Ruíz	VDG	Jeroen van der Giessen
NMN	Christian Neumann	RYD	Sam Ryde	VDB	Dimitri van der Beken
NCL	Alex Nicoll	SBT	Gabriel Sabater	VDE	Pedro van der Knoop
NIC	Steve Nicoll	SAE	Encarna Sáez	VDM	Robin van der Made
NCH	Ian Nicholson	SLM	Jaume Salamanca	VDD	Richard van der Naald
NLS	Rasmus Due Nielsen	SHZ	Luis Sánchez	VDT	Tim van der Torre
ODS	Jip Oudes	SAS	Alfons Sastre	VDV	Mathieu VDV
OVV	Arjan Ovaa	STS	Emma Scheltens	VDP	Fabienne Vandendorpe
PAB	Félix de Pablo	SHN	Gerd Schön	VSV	Cornelis van Seventer
PHP	Raymond Pahlplatz	SDW	Michiel Schoonderwoerd	VTR	Rob van Trig
PAL	Joan Carles Palerm	SCH	Martin & Mara Schultz		
PAM	Mika Palmer	SHW	Roel Schwartz		
PTK	Kees de Pater	SCW	Michael Schwarz		
PRN	Julie Pearson	SEP	Jordi Serapio		
PNL	Juan Penalva	SET	Tomás Serapio		
		SER	Biel Servera		

<u>Codi</u>	<u>Nom</u>	<u>Codi</u>	<u>Nom</u>	<u>Codi</u>	<u>Nom</u>
VVN	Mark van Veen	VEG	Adria Verger	WTS	Harry Witts
VWG	Marcel van Weeghel	VIA	Carlota Viada	WTT	Christopher Witte
VHT	Nel Vanhout	VIC	Pere Vicens	WNS	Arne Wuensche
VAS	Miguel Vallespir	VLN	Rafel Villalonga	YAR	Ivàn Yarza
VRL	Cristina Varela	WSN	Rob Wassenburg	ZMR	Dani Zamora
VZZ	Elena Vazquez	WLL	Martyn Williams		
VEN	Lalo Ventoso	WTD	Jürgen de Witte		

Institucions i altres:

<u>Codi</u>	<u>Nom</u>
AIRE	Campanya d'anellament prenupcial a l'Illa de l'Aire (Menorca): Santi Catchot, Ioar de Guzmán, Aïda Sabaté, Josu Meléndez, Óscar Garcia, Emili Garriga, Adrià Verger, Rafel Villalonga, Sergi Caules, Júlia Cerveró, Biel Miquel, Ovidi Alcover, Marc Illa, Beth Mejan, Igor Irazusta, Juan Mari Sagredo, Ricard Poch, Richard Barnes, Rober Bustamante, Marta Feliu, Lúdia López, Borja Perez, Lara Abascal, Núria Bosch, i Luís Betanzos.
CTOG	Centre de Turisme Ornitològic La Gola: Pere Tomas
COFIB	Consorci per la Recuperació de Fauna Silvestre de Mallorca.
GORA	Grup d'Observadors de Rapinyaires d'Albercutx: <u>Talaia d'Albercutx i Cap de ses Salines:</u> Gabriel Bernat, Pep Manchado, Daniel Hinckley, Pau Castell, Lalo Ventoso, Susana Quintanilla, Juanjo Bazán, Carlos López-Jurado, Adolfo Ferrero, Antoni Soler, Steve Nicoll, Sebastià Perelló, Antoni López-Arenas, Michael Montier, Geordie Dave, Phil Akkers, David Taylor, Pep Aurel, Nacho Barcia, Dani Zamora, Martin Schultz, Javi Quintana, Patrick Moussa, Pablo Garcia, Juan Penalva. <u>Projecte Boscaler 2024:</u> Carlos López-Jurado, Daniel Hinckley, Josep Manchado, Victor Martínez, Patrick Moussa, i Antoni Soler.
GOBM	Observació d'Aus a Mallorca: <u>Cens acuàtiques zones sud de Mallorca (14.01.2024):</u> Bartolomé Adrover, Josep Amengual, Cati Artigues, Marga Cardona, Pau Castell, Carlos Daza, Pablo Demangel, Unay Demangel, Pere Garcias, Oscar Gordo, Elisabet Guasp, Mabel Gutierrez, Carlos López-Jurado. Josep Manchado,

Andrés Mas, Xe Mas, Neus Matamalas, Toni Mateu, Patrick Moussa, Toni Muñoz, Mika Palmer, Ana María Román, Joan Carles Salom, Josep M. Serra, Manolo Suárez, i Miquel Vara.

Cens de milana a dormidors a Mallorca (13.01.2024): Antoni Fontanet, Antonia Llabrés, Mika Palmer, Emilia Segura, Antoni Soler, Josep Sunyer, Pedro van der Knoop, Pere Vicens, Elisa Garcia, Neus Matamalas, Joan Ramis, Toni Estarelles, Carlota Viada, Toni Muñoz, Patrick Moussa, Jordi Muntaner, Cati Artigues, Xavier Más, Joan Guillelem, Alex Forteza, Manuel Suarez, Catalina Florit, Emanuel Aigbedo, Jason Moss, Daniel Martinez, Pepe Amengual, Jaume Adrover, Bel Joy, Miquel Font, Marga Sastre, Pere Tomàs, Josep Manchado, i Biel Bernat.

MARB **Departament de Medi Ambient i Reserva de Biosfera.**
Consell Insular de Menorca.

RES/NFC **Nocturnal Flight Call.** Mitjançant escoltes d'exemplars en vol nocturn al vespre durant una mitjana de 10 h a la primavera i 12 h a la tardor: Maties Rebassa.

PNAG **Parc Natural de l'Albufera des Grau**

PNAM **Parc Natural de s'Albufera de Mallorca:**

Maties Rebassa, i Pere Vicens.

RAMM **Red d'observació d'Aus i Mamífers Marins:**

Portocolom: Pere Vicens, Neus Matamalas, Tomeu Rosselló, Elisa Miquel, Felipe Robles, i Daniel Martinez.

Port des Canonge: Mika Palmer, Pedro Van der Knoop, Patrick Moussa, Daniel Hinckley, Nieves Boned, Jaume García-Delgado, Pere Lluís Dietrich, i Jordi Muntaner.

RNSA **Reserva Natural de l'Albufereta:**

Maties Rebassa, i Pere Vicens.

SEO **Sociedad Española de Ornitología (SEO/BirdLife)**

BIBLIOGRAFIA

GILL, F, D DONSKER Y P RASMUSSEN (EDS.) 2021. LISTA MUNDIAL DE LAS AVES DEL COI (VERSIÓN 11.1). DOI: 10.14344 / IOC.ML.11.1.

MOUSSA P., MÉNDEZ X., SUÁREZ M., & CARDONA E. Censo de aves invernantes en Baleares, enero 2023. *AOB* 38: 9-27.

PARPAL L., BLASCO P., PUIG M., MAMELI U., SOLÀ J., NEGRE N., MIR, T., i MIOTA, A. 2021. Un o dos graus sí que afecten els polls de falzia *Apus apus*. *COFIB* 2019. *AOB* 35: 78-85.

RESSENYES BIBLIOGRÀFIQUES

Aquesta secció bibliogràfica té l'objectiu de reunir tota la informació dispersa sobre ornitologia balear que apareix publicada en altres revistes i llibres, tant de la nostra comunitat com nacionals o estrangeres, i, d'aquesta manera, fer-la més accessible a qualsevol persona interessada en l'ornitologia balear. Aquest apartat recull ressenyes breus en què es ressalten els principals resultats i s'hi aporten valoracions sobre el contingut de les publicacions rebudes a la biblioteca del GOB.

Un conjunt de col·laboradors realitzen desinteressadament aquestes notes i contribueixen amb el seu esforç a la transmissió d'informació, que podrà tenir una funció en la formació i l'actualització dels coneixements ornitològics dels membres de la nostra associació. Les ressenyes expressen les opinions dels revisors, això vol dir que no reflecteixen necessàriament el parer del GOB. Llista de col·laboradors: Bruguers JARDÍ, Josep MANCHADO, Pere J. GARCÍAS, i Manuel SUÁREZ.

LLIBRES

Birdgirl. Mi familia, las aves y la búsqueda de un futuro mejor

Mya-Rose CRAIG. 2023. Errata Naturae Editores. Madrid. ISBN: 978-84-19158-49-9

Incloure un llibre de literatura en un anuari d'ornitologia pot semblar una gosadia maldestra. Ara bé, no ho és tant si tenim en compte el concepte *anuari* en si mateix, ja que vol dir "guia amb informació útil per a determinades professions o activitats i circumscrita a un any determinat". És per això que, en aquest cas, podem convenir que aquest relat literari, farcit de dades d'interès per a l'observació d'au-cells, bé mereix i justifica aquest honor.

Dit això, cal tenir en compte que *Birdgirl* no és un llibre clàssic de consulta sobre on es poden veure aus, ja que, tot i que s'esmenten països i territoris de tot el planeta, sovint les localitzacions són poc precises. Tampoc és una guia d'identificació, ja que l'autora prioritza l'experiència estètica del mer fet d'observar aus o bé l'eufò-



ria competitiva del *Big Year*, entre d'altres, en comptes de donar dades precises sobre com distingir i reconèixer aus.

Cal tenir present, a més, que l'autora d'aquest relat és força jove, té 22 anys. És d'origen britànic-bangladeshià i va néixer a Somerset, Anglaterra. Ara bé, ni la seva joventut ni el fet de ser dona o la seva condició de minoria ètnica han estat un entrebanc per assolir el rècord d'haver observat més de 5.000 espècies per tots els continents. I com ho ha aconseguit? Doncs això és el que explica en les 317 pàgines del seu llibre.

Aquesta proesa comença quan amb nou dies de vida el seu pare i la seva mare, aficionats a l'ornitologia, la porten a observar aucells, i acaba, si més no en el relat, als 22 anys, quan fa els seus primers passos a la universitat i ja compta amb un bagatge incommensurable que va més enllà de la seva llista d'observació de 5.000 espècimens alats de tot el planeta. Val a dir que en cap moment cita quina llista d'aus del món pren com a referència (exceptuant la del Congrés Ornitològic Internacional (IOC) per a les aus de Colòmbia, Bolívia i el Perú), ni tampoc esmenta cap nom científic de cap espècie. Tot i això, no hi ha dubte sobre les aus que ha vist i que ha afegit en el seu rànquing.

Fins ara hem dit el que no és *Birdgirl*, per no generar falses expectatives. Ara toca exposar el que sí és el relat de Mya-Rose Craig: pura literatura vivencial. Una narrativa fresca i àgil que ens mostra diferents aspectes del creixement maduratiu psicològic d'aquesta alloteta. El llibre retrata a la perfecció

les pors i les inquietuds de l'adolescència, moment en què es conforma el seu raonament abstracte i lògic, fins a assolir la vida adulta. És per això que en un moment del relat exposa: "l'observació d'aus no ha estat mai una afició; no és un passatemps que pugui reprendre o deixar, sinó un fil que recorre l'entramat de la meva existència, tan estretament teixit, que no hi ha manera de treure'l i deixar la resta intacte".

I la vivència sempre parteix de l'acte simple d'observar aus, un "esport d'ultra resistència" que ella considera "sovint mal entès i moltes vegades obsessiu". Ara bé, el mer acte d'observar no només li esperona l'emoció i el plaer estètic. De mica en mica, també porta l'autora a qüestionar-se la cultura mateixa al voltant d'aquest món dels ocells, que no és aliè als prejudicis del patriarcat i de la raça blanca. I encara més, a prendre consciència dels ultratges al medi ambient que, en major o menor mesura, va identificant en els territoris que visita: Sud-Amèrica, Àfrica, l'Antàrtida, Àsia i Austràlia.

La consciència sobre els prejudicis racials i el dany mediambiental porta Mya-Rose Craig a lluitar cada vegada amb més implicació en favor dels drets humans i contra qualsevol forma de racisme. Però també per al medi ambient i contra els abusos i les males pràctiques als territoris. En aquesta línia, Mya-Rose Craig enceta una activitat frenètica d'activista compromesa a les xarxes socials, tot i que amb un resultat ambivalent a causa del racisme i les crítiques que li plouen des de diferents àmbits,

malgrat els èxits. Tanmateix, Craig es manté ferma en els seus principis i prioritza la tasca divulgadora i l'acció política per aconseguir un món millor, fet que li ha valgut un doctorat honoris causa en Ciències per la Universitat de Bristol als 17 anys.

Un dels aspectes més colpidors del llibre és el relat sobre la malaltia mental de la seva mare, que l'acompanya al llarg de tots els viatges d'observació pel món. El que ens evidencia Craig amb les seves paraules és potser un dels aspectes que tots els observadors i observadores sempre hem sabut, potser sense ser-ne conscients, i és que l'observació d'aucells és sanadora.

El seu poder benèfic rau en la sensació de fluïdesa entre cos, ment i ànima quan un es concentra en les aus, ja que els sentits s'amplifiquen i es genera una atracció que ens absorbeix fins al punt que es perd la noció del món i del temps.


En definitiva, un relat alligador, entretingut i molt recomanable, no només per a adults, ja que pot fer despertar consciències sobre l'abast de la nostra activitat, sinó també per als joves (que potser, si el llegeixen, gosaran aixecar el cap dels mòbils per mirar al cel) i, per descomptat, per als joves ornitòlegs que comencen les seves passes en el fascinant món d'observar aucells.- Bruguers JARDÍ.

Vamos a la playa

Ricard GUTIÉRREZ. 2024. Tundra Ediciones

Ricard Gutiérrez és ornitòleg i gestor ambiental —a més d'escriptor i divulgador— i molt estimat a les Illes Balears. I és així per mor que l'autor de *Vamos a la playa* ha demostrat en nombroses ocasions un coneixement profund i una sensibilitat especial per l'avifauna i els ecosistemes litorals i de les zones humides del nostre racó de la Mediterrània.

Ara, però, amb la seva darre-ra publicació *Vamos a la playa* ens proposa una anàlisi diferent, un *passeig* estimulant, polièdric, reflexiu, fins i tot commovedor. L'itinerari va de la ciència a la sociologia, i a l'economia, i pretén deixar al descobert la complexitat de la gestió i conservació de l'avifauna del litoral català i balear, entre d'altres. Però encara més, l'autor també



sacseja consciències i evidencia la ignorància i la manca de sensibilitat de la gran majoria dels éssers humans que vivim en aquests temps de massificació i negacionisme, en què conviuen ciència i ficció, i en què el canvi climàtic ens assetja i ens mostra diàriament la fragilitat del nostre entorn.


Així doncs, el llibre ens convida a recobrar, com deia el socioecòleg Ramon Folch, la *dèria de mirar*: és a dir, a observar no només el fet, sinó també la dimensió del seu impacte en tots els àmbits. El fil d'Ariadna del relat s'enceta amb la precària

situació del picaplatges o tirul·lilo camanegre (*Anarhynchus alexandrinus*); però ressegueix també les estratègies inversemblants de nidificació de la gavina roja (*Ichthyophaga audouinii*) o els esforços de la llambritja menuda (*Sternula albifrons*), entre d'altres. D'aquesta manera, Ricard Gutiérrez ens passeja pel Delta de l'Ebre, el torrent de s'Alga i l'estany Pudent de Formentera, l'illa Encalladora al Cap de Creus, etc., amb un relat àgil, entenedor, i que ens transporta a una nova dimensió del fet lúdic d'anar a la platja.- Bruguers JARDÍ.

El Halcón de Eleonora

Joan MAYOL. 2025. Monografías Zoológicas, Serie Ibérica, Vol. 11. Tundra Ediciones. 251 pàgines.

Ha esta publicat el darrer llibre, fins ara, de Joan Mayol. És una monografia del falcó marí on es recull molta informació dispersa en moltes publicacions però aportant també dades de primera mà, especialment en la migració, obtingudes gràcies al desenvolupament de tecnologia de seguiment via satèl·lit. És un llibre amb un clar objectiu divulgatiu escrit en un estil lleuger però rigorós. És profusament il·lustrat amb fotos de qualitat de falcons, majoritàriament aportades per Sebastià Torrens, però també d'altres fotògrafs. Les fotos no sols són de falcons sinó també de llibres de falconeria, hàbitats diversos, illots i una part de fotos històriques de gran valor documental. Es destaca que hi ha a cada capítol un apartat dedicat a la gent que ha contribuït tant en el coneixement,



investigació i conservació del falcó marí. Així seria a més un homenatge a totes aquestes persones.

El llibre té vuit capítols i una introducció. En la introducció l'autor aborda l'origen del nom del falcó. Eleonora d'Arborea fou una noble catalana que naixé a Molins de Rei. El seu pare era el jutge d'Arborea a l'actual província d'Oristany, a Sardenya, per aquell temps ocupada pels aragonesos però en lluita constant amb pisans i genovesos que volien ocupar l'illa. Després de diverses vicissituds, molt ben explicades en el llibre, Eleonora promulgà el 1395 la Carta de Logu, en llengua sarda, on recollia en el text parts dels drets romà, bizantí i català, que fou vigent fins a 1827 quan esdevingué la unificació italiana. Entre moltes altres disposicions legals la Carta disposava la protecció genèrica dels rapinyaires.

En el primer capítol es tracta d'una manera genèrica l'ordre Falconiformes, però especialment la família Falconidae des del punt de vista morfològic i alimentació. També fa un repàs de les espècies de falcons arreu del món així com a la falconeria citant dos autors ben diversos Frederic II de Hohenstaufen, del segle XII, i Tom J. Cade del XX. En el segon capítol s'aprofundeix en la morfologia, biologia, ecologia i parentius evolutius del falcó marí. En el tercer es desenvolupa amb més detall allò que fa del falcó marí un cas especial, el comportament reproductiu colonial, l'habitat que ocupen a illots i costes espadades i el retard de la nidificació fins a l'agost i el setembre per aprofitar el pas post nupcial dels passeriformes migrants. És al quart capítol

on es relata la vida quotidiana amb molt més detall, com és la cura del plomatge, l'atracció de fonts i punts d'aigua on es congreguen molts d'exemplars en els dies més càlids de la canícula, on nien, quants ous ponen i les relacions entre espècies dels illots i penya-segats a més d'on hiverna, tot inserit en el cicle anual.

La migració es tracta de manera més extensa al cinquè capítol. No sols la migració del falcó sinó que també es fa un resum de la migració de les aus. Aquí és on pràcticament tota la informació és nova. La tecnologia GPS combinada amb la GSM ha permès obtenir unes valuosíssimes dades de com i per on migren. Falcons equipats amb aquests dispositius des de les Canàries, les Balears, Sardenya i Grècia han demostrat sense cap mena de dubte que els falcons migren travessant el Sàhara fins arribar a Àfrica oriental des d'on travessen per diversos punts el canal de Moçambic cap a Madagascar.

El capítol sisè és, al meu parer, el més important quant a la informació. L'autor fa una recopilació de les dades més recents i actualitzades, on ha estat possible, de les colònies a tota l'àrea de distribució. No només fa una enumeració de les colles a cada una d'elles sinó que també analitza la tendència. Malaauradament també dona compte de colònies extingides però també aporta dades de noves. El capítol està profusament il·lustrat amb fotos de moltes illes i illots a més de fotos de les feines de control i les jornades d'estudi. A priori podria semblar un capítol àrid, ple de números, llistats de llocs, molts d'ells impronunciables per nosaltres, però res més enfora de

la realitat. L'autor aquí s'ha esplaiat explicant anècdotes, vivències, de vegades tragèdies, dificultats de tot tipus com si ens estigués relatant una aventura èpica. De lectura àgil i amena el lector es pot fer una idea de tot allò que envolta moltes vegades la investigació científica de camp. Res a veure amb les llargues jornades als museus i laboratoris analitzant dades, mesurant ossos, comparant pells i fent anàlisis d'ADN. Tanmateix ambdues activitats són totalment complementàries i cap d'elles s'entén sense l'altra.

El capítol setè fa una incursió en les relacions evolutives, espècies semblants i adaptació al medi. Hi ha un apartat on l'autor es demana com es va produir un canvi tan dràstic que portà uns petits falcons africans, entomòfags que vivien a la sabana a fer-se migrants i emprendre un viatge que els duria

de Madagascar al mar Mediterrani on ocuparien les costes i els illots i canviarien les dates de nidificació per explotar un recurs únic: les petites aus migrants en el viatge de retorn als quarters d'hivernada a la terra d'on ells venien, Àfrica.

En el darrer capítol, vuitè, es fa un resum de les relacions de l'home i els falcons relatant moltes vivències personals de l'autor amb persones que recol·lectaven polls de falcó i de virot als illots pel consum propi. Afortunadament eren altres temps, si més no, a les nostres illes. Conclou el capítol una anàlisi exhaustiva de les amenaces passades i actuals que acuiten els falcons i acaba amb una pregunta gens retòrica; podrà l'home modificar el seu comportament més agressiu envers del medi ambient, al cap i a la fi comú per a les aus i nosaltres mateixos? - Pere J. GARCÍAS

ARTICLES


The Current High Bird Colonisation Rate in a Major Mediterranean Island is Consistent With a More Intense Past Defaunation Compared to Nearby Mainland

Alejandro MARTÍNEZ-ABRAIN, Maties REBASSA, Jorge CRESPO, i Juan JIMÉNEZ. 2025. *Journal of Biogeography* vol. 52, n.º 1 (Accés Lliure)

El títol es podria traduir com "L'alta tasa actual de colonització d'aus en una illa important del Mediterrani coincidiria amb una depuració passada més intensa en comparació amb el continent proper". És la continuació i en bona part conclusions de publicacions anteriors dels autors tant a la mateixa revista com a *Quercus*, s'analitza la dinàmica que segueix la colonització de noves espècies d'aus nidifi-

cants a l'illa de Mallorca entre els anys 1991 i 2015, és a dir un període prou llarg de 25 anys, comparant-la amb la província d'Alacant, situada al sud-est de la península ibèrica i de característiques geològiques, geogràfiques i biogeogràfiques bastant similars.

Comparant la diferent evolució d'aquestes dues àrees properes i relativament similars, exploren, analitzen i finalment manifesten



la hipòtesi de que la taxa de colonització de noves espècies d'aus a Mallorca ha estat més alta que a Alacant degut a una major desaparició històrica d'espècies a la illa per comparació amb el continent, el que hauria donat com a punt de partida una fauna ornitològica molt més pobre a Mallorca i per tant una major facilitat per l'arribada i assentament de noves espècies reproductores.

Els investigadors han comparat les taxes d'aparició i desaparició d'espècies reproductores a ambdós territoris, amb un resultat prou diferents, ja que al llarg dels 25 anys del període d'estudi, Mallorca ha experimentat l'arribada de 21 noves espècies reproductores sense que s'hagi produït la extinció de cap espècie reproductora; mentre que Alacant ha tingut un balanç molt més modest, ja que només hi ha hagut 8 noves espè-

cies i s'ha perdut una. Aquest contrast tan notable ens està suggerint o indicant que els ecosistemes de Mallorca estan experimentant una re-colonització més ràpida.

El procés a les dues regions ha seguit patrons diferents i a cap de les dues regions ha estat lineal, els investigadors han dividit els 25 anys d'estudi en períodes de 5 anys i per exemple a Alacant es detecta un descens abrupte a partir del 2006-2010 i un estancament posterior final, mentre que a Mallorca només es detecta una desacceleració suau a partir del 2011-2015 en endavant. Per contra, la diversitat taxonòmica de les espècies colonitzadores a nivell de famílies, així com els hàbitats colonitzats han estat molt semblants entre les dues regions estudiades, tot i que les espècies d'un major mida han estat més comunes a Mallorca.

Tot i que al llarg de l'article els autors consideren la possibilitat de que factors com una major disponibilitat d'hàbitats adequats, la diferent pressió humana sobre el territori i fins i tot que els efectes del canvi climàtic puguin estar influïnt de forma important en aquestes diferents taxes de colonització, acaben decantant-se per una altra explicació.

Per tant, els investigadors creuen que l'explicació més raonable i acurada sigui que Mallorca va patir una pèrdua d'espècies molt més severa en el passat, amb una pressió humana i urbanística molt més intensa que Alacant, i que varen quedar nínxols ecològics buits, que són els que ara permeten una recolonització més dinàmica en aquests temps més recents.

En l'apartat de conclusions, l'estudi manifesta que la pèrdua de fauna històrica i accelerada de la illa va crear un "dèficit de biodiversitat", deixant hàbitats desocupats que explica l'actual alt ritme d'arribada de noves espècies. Aquesta idea dona força a la importància de considerar la història ecològica d'un territori, abans d'analitzar els seus processos actuals de colonització i extinció d'espècies

I a més, els autors ens suggereixen que el procés de colonització de Mallorca per noves espècies d'aus no ha finalitzat, i que la illa seguirà guanyant espècies a les properes dècades; fenomen que podria estar relacionat amb la recuperació progressiva d'hàbitats adequats i la menor competència ecològica en comparació amb la península i el continent.

A un article dels mateixos autors, Martínez-Abraín, Crespo, i Rebassa (2023), ja preveïen que tres espècies d'ocells tenien una molt alta probabilitat de colonitzar Mallorca en el futur proper i que 16 espècies més tenien igualment possibilitats de colonitzar la illa en

els següents anys. De fet una de les seves prediccions ja s'ha complert, ja que el flamenc (*Phoenicopterus roseus*) ha criat amb èxit a Mallorca durant els anys 2022, 2023 i 2024.

Finalment l'estudi destaca la importància de fer seguiments de la colonització de noves espècies, especialment a les illes, on la biodiversitat ha estat històricament molt més vulnerable. Comprendre aquests processos pot ser clau i una gran ajuda a l'hora de desenvolupar estratègies i línies de conservació més efectives, especialment en el context actual de transformació i pèrdua del paisatge per les activitats humanes.

En resum, aquest treball aporta l'evidència de que els patrons actuals i recents de colonització de les aus, poden estar influenciats no només per factors ambientals contemporanis i presents, sino també per situacions i moments històrics de "defaunació" o pèrdua de fauna prèvia. El que confirmaria la importància d'adoptar visions a llarg termini en els estudis de biogeografia i conservació d'espècies i espais.-
Josep MANCHADO

Lo que el anillamiento nos enseñó. Supervivientes

Juan ARIZAGA. 2025. Sociedad de Ciencias Aranzadi. Donostia (Accés Lliure a www.ring.eus)

El marcatge científic d'aus és un mètode d'estudi poc conegut encara a nivell general, tot i que ja fa anys que està molt estès en tots els àmbits d'investigació ornitològica. Per a contribuir a un millor coneixement de la importància d'aquest procediment la Sociedad de Ciencias Aranzadi ha elaborat aquest document sobre algunes de les

coses que podem aprendre amb la individualització dels exemplars i la recuperació dels animals anellats. El document comença amb explicacions generals sobre l'anellament i algunes de les preguntes que ens ajuda a respondre, per passar després a exemples pràctics enfocats a temes de supervivència d'individus de diferents espècies.



Amb un llenguatge senzill, l'autor ens va contant històries d'ocells marcats dels quals s'han pogut esbrinar dades molt interessants sobre la longevitat de cada un d'ells i, en alguns casos, altre informa-

ció com desplaçaments, parelles o nombre de polls que han tengut durant la seva vida.

D'entrada la d'una gran albatros de Laysan *Phoebastria immutabilis* que ha superat ja els 73 anys de vida i continua reproduint-se a la seva colònia de cria a l'atol·ló de Midway i la qual se calcula que ha tengut entre 30 i 36 polls durant la seva llarga vida. I així fins a 10 relats, exemples d'espècies i vides molt diferents per acabar amb la d'un gamarús *Strix aluco* que se va amollar a Àlaba després de passar per un centre de recuperació i 21 anys després se va trobar només l'anella al bosc.

El document posa èmfasi en la necessitat d'obtenir informació científica per destinar-la a la conservació i en l'interès del marcatge científic com una eina per aconseguir-ho i pretén incentivar la participació de les persones amb el report de qualsevol recuperació d'una au anellada.- Manuel SUÁREZ

ANNEX I: RESUM METEOROLÒGIC

EL TEMPS A LES ILLES BALEARS DURANT L'ANY 2024

Delegació de l'Agència Estatal de Meteorologia a les Illes Balears

L'any 2024, amb una anomalia mitjana respecte als valors normals de 0,9 °C, va ser un any extremadament càlid, el tercer més càlid des de que es tenen registres després dels anys 2022 i 2023 que van ser els més càlids. Els mesos més càlids foren febrer i novembre amb anomalies de 2,1 °C i 2,3 °C respectivament.

Les temperatures més altes de l'estiu es produïren al juliol. A Mallorca, la temperatura més alta es va registrar a sa Pobla el dia 30 i va ser de 42,5 °C. Durant l'estiu hi va haver tres onades de calor, la primera entre els dies 18 i 20 de juliol, la segona entre el 28 de juliol i 1 d'agost i la tercera entre el 7 i 12 d'agost.

Les temperatures mínimes més altes foren: a Mallorca 28,9 °C a la serra d'Alfàbia el dia 1 d'agost (rècord absolut); a Eivissa a la Central Tèrmica amb 28,0 °C el dia 31 de juliol; 26,3 °C a Formentera el dia 8 d'agost i a Menorca, 26,0 °C a Estància ses Penyes (Maó) el 3 d'agost. Hi ha hagut més nits tropicals (temperatura mínima superior a 20 °C) que el normal: a l'Aeroport de Palma n'hi ha hagut 53 sent el normal 26, al d'Eivissa 88 sent el normal 74 i al de Menorca 67, sent el normal 58.

Les temperatures més baixes de l'any s'enregistraren a Mallorca el dia 22 de gener, amb - 3.0 °C a Son Torrella (Escorca). A les Pitiüses, -0.5 °C a Sant Joan de Labritja el dia 8 de gener i, a Menorca, -0,3 °C a Estància

ses Penyes (Maó) el dia 9 de gener.

En quant a precipitacions, l'any ha estat normal, es van recollir un promig de 551 l/m² amb una anomalia positiva del 1 %. Per illes, les anomalies han estat del -2 % a Menorca, del 3 % a Mallorca i del -12 % a Eivissa. El mes més plujós en termes relatius va ser agost amb una anomalia de la precipitació de + 216 % (va ploure més del triple del que és habitual).

El lloc on va ploure més va ser a Son Torrella (Escorca, Mallorca) amb 1.251 l/m², tot i així un 7 % per davall dels valors normals. A Menorca, el lloc amb més pluja va ser es Mercadal amb 718 l/m² i una anomalia del 23 % ; a Eivissa, a Sant Joan de Labritja amb 502 l/m² i una anomalia del -5 % i Formentera 233 l/m² amb -27 % d'anomalia.

S'han enregistrat 11 dies amb neu quan el normal és 9.

Hi va haver 7 rissagues majors o iguals de 70 cm al Port de Ciutadella (Menorca), quan el normal es que n'hi hagi 4 o 5, la més gran fou el 19 de juny amb 140 cm.

L'any 2024 ha estat, en general, lleugerament ventós a les illes. A l'Aeroport de Palma hi ha hagut 41 dies de vent fort (dia amb ràfegues majors de 50 km/h), quan el normal és 33; al de Menorca n'hi ha hagut 68, que és el normal i, al de Eivissa, 59 sent el normal 43. La ràfega més forta de l'any va ser la de 152 km/h a la serra d'Alfàbia el dia 7 de desembre.

Gener: Amb una temperatura mitjana de 12,2 °C i una anomalia de 1,7 °C, va ser, en promig, un mes molt càlid a les Balears, el segon més càlid des de 1961, amb anomalies mitjanes a Eivissa de 2,0 °C, a Mallorca de 1,8 °C, a Formentera de 1,6 °C i a Menorca de 1,2 °C. Les temperatures més altes van ser: 26,7 °C a Sant Joan de Labritja (Eivissa) el dia 25; 25,1 °C a Sineu (Mallorca) el dia 26; 22,7 °C a la Mola (Menorca) el dia 24 i, a Formentera, 21,4 °C el dia 25.

Les temperatures més baixes del mes es produïren el dia 8 a Menorca i les Pitiüses i foren les següents: 0,9 °C a cala Galdana (Ciutadella); -0,5 °C a Sant Joan de Labritja i 4,5 °C a Formentera. A Mallorca -3,0 °C a Son Torrella (Escorca) el dia 22.

En quant a precipitacions, gener va ser en general un mes humit a les Balears. En promig, va ploure 66,8 l/m², un 22 % més del que és normal.

A Mallorca i Menorca va ser humit. Va ploure un 32 % més de l'habitual a Mallorca i un 34 % més a Menorca.

A Eivissa i Formentera el mes va ser sec. Va ploure un 72 % i un 40 % menys. Les precipitacions màximes diàries del mes foren: a Mallorca, 86,4 l/m² a Son Torrella (Escorca) el dia 11; a Menorca, 58,8 l/m² a Ciutadella el dia 5; a Eivissa, 15,1 l/m² a Sant Vicent el dia 19 i, a Formentera, 16,5 l/m² a Can Vicenç den Xumeu el dia 10. Hi va haver 3 dies amb neu a Mallorca (quan el normal és que n'hi hagi 3 o 4), la cota més baixa es va produir el dia 11, en que va nevar fins als 1.100 metres.

El dia 1 es va veure una màniga marina des de Santanyí.

Pel que fa al vent, el mes va ser normal a l'arxipèlag. La ràfega màxima va ser de 102 km/h del

WSW registrada el dia 17 a la serra d'Alfàbia.

Febrer: Va ser un mes molt càlid a tot l'arxipèlag amb una temperatura mitjana de 12,6 °C i una anomalia mitjana de 2,1 °C. Va ser el cinquè febrer més càlid des de 1961, empatat amb 2021. Per illes, les anomalies varen ser: 2,2 °C a Mallorca i Eivissa, i 1,7 °C a Menorca i Formentera.

Les temperatures més altes foren: 24,3 °C a Artà (Mallorca) el dia 14; 23,9 °C a Sant Joan de Labritja (Eivissa) el dia 22; amb 20,8 °C a la Mola de Maó (Menorca) el dia 14 i 20,6 °C a Formentera el dia 20.

Les temperatures més baixes foren les següents: -1,1 °C a Son Torrella (Escorca) el dia 1; amb 1,4 °C a Sant Joan de Labritja el dia 1; i amb 2,1 °C a cala Galdana el dia 25 i 5,8 °C a Formentera el dia 1.

Pel que fa a les precipitacions, febrer de 2024 va ser, en general, un mes normal a les Balears. En promig, va ploure 39,3 l/m², un 12 % menys del normal. El mes va ser normal a totes les illes excepte a Eivissa que va ser sec i va ploure un 69 % menys del normal. Les precipitacions màximes diàries van ser: a Mallorca, 84,2 l/m² a Son Torrella (Escorca) el dia 28; a Menorca, 47,0 l/m² a es Migjorn Gran el dia 27; a Formentera, 12,3 l/m² a Can Vicenç den Xumeu el dia 26 i a Eivissa, 7,8 l/m² a Santa Gertrudis el dia 26. Durant aquest mes hi va haver dos dies de neu a Mallorca, per sobre dels 1.100 m, quan el normal són 3. També hi va haver dos dies de precipitació amb calabruix a Mallorca i un a Formentera.

En quant al vent, el mes de febrer va ser ventós a tot l'arxipèlag. La ràfega més forta fou de 106 km/h del NNW a la serra d'Alfàbia el dia 10.

Març: Amb una temperatura mitjana de 13,9 °C i una anomalia de 1,5 °C, va ser un mes molt càlid a les Balears, el segon més càlid des de 1961. Va ser molt càlid a totes les illes, excepte a Formentera que va ser càlid. Les anomalies varen ser les següents: a Eivissa 1,9 °C; a Mallorca i Menorca, 1,5 °C i a Formentera, 0,7 °C.

Les temperatures màximes més altes es van registrar a Mallorca i Menorca el dia 22 i van ser: 27,1 °C a Campos i 23,4 °C a cala Galdana. El dia 18 es van registrar 26,5 °C a Sant Joan de Labritja i 22,0 °C a Formentera.

Les temperatures mínimes més baixes van ser les següents: -1,6 °C a Son Torrella (Escorca) el dia 7; 1,0 °C a Sant Joan de Labritja el dia 13; 3,1 °C a cala Galdana (Ciutadella, Menorca) el dia 6, i 6,0 °C a Formentera el dia 14.

Pel que fa a les precipitacions, març de 2024 va ser, en general, un mes humit a les Balears. En promig, va ploure 48,3 l/m², un 46 % més del normal. Per illes, el mes va ser humit a totes, excepte a Menorca que va ser sec. A Mallorca va ploure un 64 % més del normal, a Formentera un 26 % més, a Eivissa un 5 % més i a Menorca un 37 % menys.

Les precipitacions màximes diàries van ser: a Mallorca, 41,6 l/m² a Son Torrella (Escorca) el dia 1; a Menorca, 15,4 l/m² al monte Toro el dia 9; a Eivissa, 16,4 l/m² a Sant Mateu el dia 9, i a Formentera, 12,1 l/m² a Can Vicenç den Xumeu també dia 9.

Va haver-hi un dia de neu a Mallorca per sobre els 1.100 m, que és el normal per a un mes de març a Mallorca. També hi va haver 3 dies amb calabruix a Mallorca.

Pel que fa al vent, el mes de Març va ser molt ventós a l'arxipèlag. La ràfega màxima de vent va ser de 117 km/h del Nord, registrada a la serra d'Alfàbia el dia 3.

Abril: Amb una temperatura mitjana de 15,3 °C i una anomalia de 0,8 °C, va ser un mes molt càlid a les Balears. Va ser molt càlid a totes les illes, excepte a Formentera que va ser normal. Les anomalies van ser: a Mallorca, 0,8 °C; a Eivissa, 0,7 °C; a Menorca, 0,6 °C, i a Formentera, 0,0 °C.

Les temperatures màximes més altes es van registrar el dia 6 a Mallorca, 33,4 °C a s'Albufera (Muro) (rècord, amb dades des de 1987); a Eivissa, 31,9 °C a Sant Joan de Labritja, i a Menorca; 28,8 °C a es Mercadal. El dia 7 es va registrar la temperatura màxima a Formentera, 26,0 °C. També es va batre rècord de temperatura màxima alta a Portopí (Palma), 28.9 °C (amb dades des de 1978).

Les temperatures mínimes més baixes van ser les següents: a Mallorca, -1,1 °C a Son Torrella (Escorca) el dia 20; a Eivissa, 2,3 °C a Sant Joan de Labritja el dia 20; a Menorca, 4,0 °C a cala Galdana (Ciutadella) el dia 23; i a Formentera, 7,9 °C el dia 24. Les temperatures mínimes més altes es van registrar el dia 7 i van ser: 23,1 °C a Sant Elm (Mallorca), 18,4 °C a Sant Joan de Labritja; 17,5 °C a Formentera, i 17,3 °C a es Mercadal. A Lluc, també el dia 7, la temperatura mínima va ser 20,7 °C, mai abans s'havia registrat una nit tropical al mes d'abril (amb dades des de 1943).

Pel que fa a les precipitacions, abril de 2024 va ser, en general, un mes humit a les Balears. En promig,

va ploure 43,0 l/m², un 8 % més de l'habitual.

Per illes, el mes va ser normal a Mallorca, humit a Menorca i molt humit a Eivissa i Formentera, amb anomalies del -12 %, 40 %, 130 % i 146 % respectivament. Les precipitacions màximes diàries van ser: a Menorca, 52,0 l/m² a ses Casetes Velles (Fornells) el dia 29; a Eivissa, 43,8 l/m² a Sant Vicent el dia 22; a Mallorca, 41,2 l/m² al Molí den Leu (Artà) el dia 29, i a Formentera 30,2 l/m² a Can Vicenç den Xumeu el dia 29. A Mallorca, hi va haver 2 dies de neu, per sobre dels 1.400 m, quan el normal per a un mes d'abril és que hi hagi neu un pic cada dos anys. Hi va haver dos dies amb calabruix.

Pel que fa al vent, el mes d'abril va ser normal a Menorca i poc ventós a la resta de les illes. La ràfega màxima de vent es van registrar el dia 11 a Mallorca amb 96 km/h, direcció nord al far de Capdepera.

Va haver-hi una rissaga de 130 cm al Port de Ciutadella.

Maig: Aquest mes va ser un mes càlid a les Balears amb una temperatura mitjana de 18,6 °C i una anomalia de 0,5 °C. A totes les illes el mes va ser càlid (amb anomalies de 0,5 °C a Mallorca, 0,6 °C a Menorca, i 0,9 °C a Eivissa) excepte a Formentera que va ser normal (- 0,1 °C de anomalia).

Les temperatures màximes van ser: 32,3 °C a Sant Antoni de Portmany (Eivissa); 31,5 °C a Petra (Mallorca), i 26,7 °C a Formentera, totes registrades el dia 30. A Menorca, 28,4 °C a es Mercadal el dia 27.

Les temperatures mínimes més baixes del mes van ser: a Mallorca, 1,7 °C a Son Torrella (Escorca) el dia 3; a Eivissa, 6,6 °C a Sant Joan de

Labritja el dia 1; a Menorca, 6,7 °C a cala Galdana (Ciutadella) el dia 3, i a Formentera, 11,6 °C el dia 1.

Només es va registrar una nit tropical a l'arxipèlag i va ser a la estació de Portopí (Palma) (el normal és que no n'hi hagi cap al mes de maig).

Pel que fa a les precipitacions, maig va ser un mes sec a les Balears, amb una mitjana de 18,2 l/m², un 43 % menys del que és habitual. El mes va ser normal a Menorca (amb una anomalia del -15 %); sec a Mallorca (-42 % de anomalia) i molt sec a Eivissa i Formentera (-90 % i -88 % respectivament).

Les precipitacions màximes diàries van ser: a Mallorca, 50,6 l/m² a la Torre d'Ariant (Pollença) el dia 15; a Menorca, 22,6 l/m² a es Mercadal el dia 20; a Formentera, 2,0 l/m² el dia 1; i a Eivissa, 1,4 l/m² a Sant Joan de Labritja i Sant Antoni de Portmany el dia 1.

Va haver-hi 7 dies de tempesta a Mallorca, dos dels quals amb calabruix. A Menorca, va haver-hi dos dies de tempesta. A més, es va veure una màniga marina des del Port de Sóller el dia 21. Des de Mallorca, es va veure una aurora boreal el dia 10.

Pel que fa al vent, el mes de maig va ser normal a tot l'arxipèlag. La ràfega màxima de vent va arribar als 84 km/h, de direcció W, a Cabrera.

Juny: Va ser un mes càlid a les Balears, amb una temperatura mitjana de 22,5 °C i una anomalia de 0,5 °C. El mes va ser càlid a totes les illes excepte a Formentera, on va ser fred. Les anomalies per illes foren de 0,7 °C a Eivissa i Menorca, 0,4 °C a Mallorca i -0,6 °C a Formentera.

Les temperatures màximes del mes varen ser: a Mallorca, 35,2 °C

a Sant Elm; a Menorca, 33,7 °C a Ciutadella, totes dues registrades el dia 27; a Eivissa, 33,4 °C a Sant Joan de Labritja i, a Formentera, 31,5 °C, registrades el dia 15.

Les temperatures mínimes més baixes del mes van ser: a Mallorca, 6,8 °C a Son Torrella (Escorca) el dia 1; a Eivissa, 11,0 °C a Sant Joan de Labritja el dia 3; a Menorca, 11,5 °C a cala Galdana (Ciutadella) el dia 1 i, a Formentera, 15,2 °C registrada el dia 3. Durant els darrers dies del mes es van registrar les temperatures mínimes més altes: a Mallorca, 23,9 °C a Portopí (Palma) i al Port de Sóller; a Eivissa, 23,3 °C a la depuradora; a Formentera, 23,1 °C i, a Menorca, 22,7 °C a Ciutadella.

A Portopí (Palma) hi va haver 22 nits tropicals (quan la mitjana de juny és 11); a l' Aeroport de Palma n'hi va haver 7 (el normal és 2); a l' Aeroport de Menorca, 8 (el normal és 4); al d'Eivissa, 10 (el normal és 6) i, a Formentera, n'hi va haver 13 (el normal és 10).

Pel que fa a les precipitacions, va ser un mes normal a les Balears, amb una mitjana de 12,9 l/m², un 14 % menys del que és habitual. A Menorca, el mes va ser sec, a Mallorca i Formentera normal, i a Eivissa humit amb anomalies de -70 %, -13 %, -12 % i 73 % respectivament.

A Mallorca, les precipitacions van ser de caràcter tempestuós i desigualment repartides. A l'Aeroport de Palma es van recollir en el mes 107,2 l/m² (quasi tot entre els dies 11 i 12) i va ser rècord de precipitació mensual de juny, amb dades des de 1951.

Les precipitacions màximes diàries van ser: a Mallorca, 98,2 l/m² a Sometimes (Palma); a Eivissa, 39,3 l/m² a Sant Antoni de Portmany i, a

Menorca, 7,0 l/m² a Sant Lluís totes el dia 11. A Formentera, 5,0 l/m² el dia 12.

Va haver-hi 3 dies de tempesta a Mallorca i 2 a Menorca i Formentera i 5 dies de precipitació amb fang a Mallorca i 3 a la resta de les illes (quan el normal es que n'hi hagi un dia de precipitació amb fang a cada illa).

En quant al vent, el mes de juny va ser normal. La ràfega més alta va ser de 84 km/h, direcció SSE a la serra d'Alfàbia.

Va haver-hi 3 rissagues al Port de Ciutadella. La màxima oscil·lació va ser de 140 cm el dia 19.

Juliol: Va ser un mes càlid a les Balears, amb una temperatura mitjana de 25,7 °C i una anomalia de 0,7 °C. El mes va ser molt càlid a Eivissa, càlid a Mallorca i Menorca i normal a Formentera. Les anomalies van ser les següents: a Eivissa 0,9 °C, a Mallorca 0,7 °C, a Menorca 0,6 °C, i a Formentera -0,1 °C.

Durant el mes, hi va haver dues onades de calor. La primera entre els dies 18 i 20 i la segona des del dia 28 fins al dia primer d'agost. Durant la segona, es van assolir fins a 41,6 °C a Binissalem (Mallorca); 39,2 °C a Sant Antoni de Portmany (Eivissa), i 38,9 °C a es Mercadal (Menorca). A Formentera, la temperatura màxima del mes va ser 34,1 °C el dia 21.

Les temperatures mínimes més altes van ser: a Mallorca, 27,1 °C a la Colònia Sant Pere el dia 20 (rècord, amb dades des de 2007); a Formentera, 25,7 °C el dia 28; a Eivissa, 25,2 °C a l'aeroport el dia 28 i, a Menorca, 24,9 °C a la Mola el dia 29.

A Portopí (Palma), totes les nits van ser tropicals (el normal serien 27) de les quals, 8 van ser tòrrides

(el normal serien 2). A l'Aeroport de Palma n'hi va haver 14, al de Menorca 18, i a Eivissa i Formentera 27 (amb dues tòrrides). El normal serien 9, 20, 23 i 27 respectivament.

Les precipitacions del mes van ser escasses, com és normal per a un mes de juliol. En promig, va ploure 5,7 l/m², un 9 % més del normal. El mes va ser normal a Mallorca i Menorca i sec a Eivissa i Formentera.

A Formentera no va ploure gens durant tot el mes i a Eivissa i Menorca, en promig, 0,1 l/m² i 2,3 l/m². A Mallorca, va ploure un 28 % més del normal, principalment, a causa d'una tempesta que va afectar a la mitat Nord de la serra Tramuntana el dia 1 i va a deixar 51,0 l/m² a Son Torrella (Escorca), dels quals, 36,4 l/m² es van recollir en 10 minuts.

Hi va a haver 3 dies de precipitació amb fang, quan el normal és que n'hi hagi 2.

Pel que fa al vent, el mes de juliol va ser normal. La ràfega més alta fou de 72 km/h, direcció N, a l'Aeroport de Menorca el dia 21.

Hi va haver 2 dies de rissaga al Port de Ciutadella (el normal és 1), totes dues de 92 cm d'oscil·lació.

Agost: Amb una temperatura mitjana de 26,4 °C i una anomalia de 1,0 °C, va ser un mes molt càlid a les Balears. Va ser molt càlid a totes les illes, excepte a Menorca on va ser càlid. Les anomalies van ser les següents: a Eivissa i Formentera, 1,3 °C; a Mallorca 1,0 °C; i a Menorca 0,8 °C.

El dia 1 va acabar la segona onada de calor de l'estiu, que havia començat el 28 de juliol. Aquest dia 1, es va arribar als 42,0 °C a Montuiri (Mallorca). Va haver-hi una altra onada de calor a Mallorca, del 7 al 12 d'agost,

assolint els 40,0 °C a Lluçmajor i 38,5 °C a Porreres el dia 9.

A Eivissa va haver hi una onada de calor entre els dies 6 i 11, amb una temperatura màxima de 38,9 °C a Sant Antoni de Portmany el dia 9. A Menorca, la temperatura màxima del mes va ser 39,1 °C a es Mercadal i a Formentera 33,9 °C, totes dues el dia 1.

Les temperatures mínimes més altes van ser: a Mallorca, 28,9 °C el dia 1 a la serra d'Alfàbia (rècord absolut de l'estació amb dades des de 1994); a Menorca, 25,9 °C a la Mola dia 12; a Eivissa, 25,2 °C a l'aeroport el dia 24; i a Formentera 26,3 °C el dia 8.

A Portopí (Palma) totes les nits del mes van ser tropicals i, d'elles, 15 van ser tòrrides (el normal és 4); a Formentera n'hi va haver 30 de tropicals i 12 de tòrrides (el normal són 3) i als aeroports de Palma i Menorca hi va haver 25 nits tropicals (el normal són 11 i 23) i cap de tòrrida, que és l'habitual.

Agost va ser un mes molt plujós a causa de una DANA que va afectar les illes durant els dies 14,15 i 16. En promig, va ploure 61,9 l/m² quan el normal són 19,6 l/m², va ploure un 216 % més. Per illes, el mes va ser molt humit a Menorca i Eivissa, va ploure un 619 % i 185 % més respectivament, es a dir, 7 i casi 3 vegades més del normal; a Eivissa va ser humit, va ploure un 102 % més (gairebé 2 vegades el normal), i a Formentera va ser normal.

El dia 15 es van registrar les precipitacions màximes diàries: a Menorca, 204,4 l/m² a es Mercadal (rècord absolut de l'estació) dels quals, 78,4 l/m² van caure en una hora; a Mallorca, 131,8 l/m² a Can

Cap de Bou (Pollença) (rècord), i a Eivissa, 35,4 l/m² a Sant Joan de Labritja. A Formentera, la màxima precipitació diària va ser de 30,5 l/m² a Can Vicenç den Xumeu el dia 14.

El mes d'agost va ser lleugerament ventós. Les ràfegues màximes de vent es van registrar el dia 14, associades a les tempestes que afectaren l'arxipèlag. La més forta va ser de 137 km/h (rècord absolut) a Cabrera.

Es van veure 3 mànigues marines: el dia 14 des de Peguera, Calvià; el dia 15, des de Cala Tirant, es Mercadal i el dia 18 des de Canyamel, Artà.

Setembre: Va ser, en promig, un mes normal a les Balears amb una temperatura mitjana de 22,1 °C i una anomalia de -0,2 °C. Per illes, el mes va ser càlid a Formentera amb una anomalia de 0,2 °C; normal a Eivissa i Mallorca amb 0,0 °C i -0,2 °C d'anomalia i fred a Menorca, amb -0,5 °C de anomalia.

Les temperatures màximes més altes del mes van ser les següents: a Mallorca, 35,8 °C a Artà; a Eivissa, 33,5 °C a Sant Joan de Labritja i, a Menorca, 31,9 °C a la Mola, totes registrades el dia 7. A Formentera, 31,7 °C, registrada el dia 2.

Las temperatures mínimes més altes del mes foren: a Mallorca, 26,1 °C al far de Capdepera; a Formentera, 25,0 °C; a Eivissa, 24,6 °C a l'aeroport, totes registrades el dia 1. A Menorca, 25,7 °C a la Mola el dia 7.

A Portopí (Palma) va haver-hi 16 nits tropicals (que és el normal) d'elles, dues de tòrrides (el normal és 0). A l'Aeroport d'Eivissa hi va haver 13 nits tropicals (el normal són 14) amb dues de tòrrides (el normal són 0) i a Formentera, n'hi va haver 16 (el normal són 17) amb una de tòrrida

(el normal és 1). Als aeroports de Menorca i Palma, n'hi va haver 7 (el normal és 10) i 4 (que és el normal).

El mes de setembre es considera normal en quant a precipitacions a les Balears, en promig va ploure 48,8 l/m², un 20 % menys del normal. El mes va ser normal a totes les illes excepte a Formentera que va ser sec. A Formentera va ploure un 48 % menys del normal; a Mallorca un 22 % menys; a Menorca un 16 % menys, i a Eivissa un 8 % menys.

Les precipitacions màximes diàries es van ser: a Menorca, 100 l/m² a la Torre d'en Quart (Ciutadella) el dia 3; a Mallorca, 88,4 l/m² al Pou d'Amunt (Porreres) el dia 2, i a Banyalbufar el dia 3; a Eivissa 58,6 l/m² a Sant Vicent i, a Formentera, 34,1 l/m² a Can Vicenç den Xumeu el dia 21.

Va haver-hi 5 dies de tempesta a Mallorca i Menorca i 3 a Eivissa i Formentera. I va haver hi un dia de precipitació amb fang a Mallorca i Menorca i cap a la resta de les illes (quan el normal es que hi hagi un dia de precipitació amb fang a cada illa).

Pel que fa al vent, el mes de setembre va ser ventós a les Balears i la ràfega màxima va ser de 99 km/h del NNW a la serra d'Alfàbia (Mallorca).

El dia 4 es van veure tubes des de Santa Eugènia (Mallorca).

Octubre: Amb una temperatura mitjana de 20,4 °C i una anomalia de 1,6 °C, va ser un mes molt càlid a les Balears. El mes va ser molt càlid a totes les illes, excepte a Formentera que va ser càlid. Les anomalies van ser les següents: a Mallorca, 1,7b°C; a Menorca i Eivissa 1,5 °C, i a Formentera 0,8 °C.

Les temperatures màximes més altes del mes van ser: a Mallorca, 34,4 °C a Binissalem el dia 14 (rècord, dades des de 2009); a Eivissa, 32,6 °C a Sant Joan de Labritja (iguala el rècord d'octubre de 2013, amb dades des de 1993), i 29,1 °C a Formentera, totes dues el dia 2 i, a Menorca, 28,7 °C a Ciutadella el dia 7.

Les temperatures mínimes més altes del mes se van registrar a totes les illes el dia 7 i van ser: a Mallorca, 25,0 °C a Banyalbufar; a Formentera, 22,7 °C (rècord, amb dades des de 2015); a Eivissa, 21,8 °C a Sant Antoni de Portmany; i a Menorca, 21,7 °C a Ciutadella. A Portopí (Palma) i a Formentera va haver-hi 10 nits tropicals (quan el normal són 3 per a les dues estacions). A l'aeroport de Eivissa i al de Menorca n'hi va haver 8 (el normal són 3 i 2 respectivament). A l'Aeroport de Palma hi va haver 2 nits tropicals, quan el normal és 0.

El mes d'octubre va ser, en general, humit a les Balears. En promig va ploure 84,1 l/m², quan el normal és 72,6 l/m², és a dir, va ploure un 16 % més. El mes va ser humit a Mallorca, normal a Menorca i sec a Eivissa i Formentera, amb anomalies del 26 %, 0 %, -47 % i -50 % respectivament.

A Mallorca, les precipitacions màximes diàries es van registrar el dia 28, a causa d'una DANA, i van ser les següents: a Manacor, 162,5 l/m², (rècord de la estació amb dades des de 1967); a Manacor s'Ermida, 120,7 l/m² (rècord amb dades des de 2016); a Can Sió (Campos), 101,2 l/m² (rècord, amb dades des de 1990). A Menorca, la precipitació màxima diària fou 49,0 l/m² recollida a es Mercadal el dia 18; a Eivissa, 30,0 l/m² a Sant Joan de Labritja; i

a Formetera 19,5 l/m² a Can Vicenç den Xumeu, totes dues recollides el dia 26.

Hi va haver 4 dies de tempesta a Mallorca, 2 a Menorca i 1 a Eivissa i Formentera. A Mallorca i Menorca hi va haver un dia de calabruix i un dia amb precipitacions amb fang (quan el normal es 0).

Pel que fa al vent, el mes d'octubre va ser ventós a l'arxipèlag. La ràfega màxima de vent va ser de 93 km/h, direcció NNW a la serra d'Alfàbia, el dia 8, a causa de la borrasca ex-Kirk.

Novembre: Amb una temperatura mitjana de 16,7 °C i una anomalia de 2,3 °C, va ser un mes extremadament càlid a les Balears. Va ser el més càlid des de 1961, empatat amb 2022. Per illes, el mes va ser extremadament càlid a Mallorca i Eivissa, i molt càlid a Menorca i Formentera, amb les següents anomalies: a Eivissa, 2,4 °C; a Mallorca 2,3 °C; a Menorca, 2,2 °C i a Formentera, 2,0 °C.

A Mallorca, hi va haver estacions a les quals va ser el més càlid des de que hi ha registres, amb anomalies properes als 3 °C: A Can Sió (Campos) la temperatura mitjana

va ser de 16,3 °C i la anomalia 2,9 °C; A Binissalem, 16,3 °C i la anomalia 2,8 °C; i a Portopí (Palma), 18,8 °C i la anomalia 2,7 °C (amb dades des de 1990, 2008 y 1978 respectivament).

Les temperatures màximes del mes van ser: a Mallorca, 26,4 °C a Portopí; a Eivissa, 25,8 °C a Sant Antoni de Portmany; i a Formentera, 25,0 °C, totes elles es van produir el dia 4; A Menorca, 25,1 °C, a Ciutadella el dia 5.

Les temperatures mínimes més altes van ser: a Mallorca, 21,0 °C al far de Portocolom el dia 4 (rècord amb dades des de 1993); a Menorca,

20,4 °C a la Mola el dia 3 (també rècord amb dades des de 1988); a Formentera, 19,8 °C el dia 3; i, a Eivissa, 17,4 °C a l'aeroport el dia 4.

Encara hi va haver una nit tropical a certes estacions: al far de Portocolom, al de Capdepera, al de Portopí, al de Santanyí, i a la Mola de Maó, quan el normal és que no n'hi hagi cap al mes de novembre.

El mes va ser normal en quant a precipitacions a les Balears. Va ploure en promig 83,7 l/m², quan el normal és 84,7 l/m². Per illes, va ser normal a totes les illes excepte a Menorca que va ser sec. A Eivissa va ploure un 16 % més, a Mallorca un 6 % més, a Formentera un 18 % menys, i a Menorca un 52 % menys.

A Mallorca, la precipitació es va repartir de manera molt desigual: així a la serra d'Alfàbia va ploure un total mensual de 250,4 l/m², un 133 % més del normal; i a sa Pobla sa Canova, va ploure 29,9 l/m², un 65 % menys del normal.

Les precipitacions màximes diàries van ser les següents: a Mallorca, 117,7 l/m² a Alfàbia Vell (Bunyola) el dia 1; a Eivissa, 63,3 l/m² a la Central Tèrmica el dia 12; a Menorca, 54,0 l/m² a cala Morell (Ciutadella) el dia 1; i a Formentera, 34,2 l/m² a Can Vicenç den Xumeu el dia 12.

Hi va haver un dia amb precipitació amb fang, quan el normal es zero. El mes de novembre, en general, va ser poc ventós a l'arxipèlag.

Es va veure una màniga marina des de Santa Eulària del Riu (Eivissa) el dia 12.

Desembre: Amb una temperatura mitjana de 11,5 °C i una anomalia de -0,2 °C, va ser un mes normal a les Balears. A Mallorca i Menorca, amb anomalies de -0,2 °C a les dues illes,

va ser normal i a Eivissa i Formentera, amb anomalies de -0,5 °C a les dues, va ser un mes fred.

Les temperatures màximes del mes es van produir a totes les illes el dia 7 i van ser: a Mallorca, 24,1 °C al far de Capdepera; a Eivissa, 24,0 °C a la depuradora; a Formentera, 21,6 °C; i a Menorca, 20,4 °C a la Mola.

Les temperatures mínimes més baixes van ser: a Mallorca -2,9 °C en Son Torrella (Escorca) el dia 30; a Menorca 2,3 °C a cala Galdana (Ciutadella) el dia 29; a Eivissa, 0,9 °C a Sant Joan de Labritja el dia 21; i a Formentera, 4,2 °C també el dia 21.

A Son Torrella (Escorca) se van registrar 11 dies de gelada, quan el normal és 7.

El mes va ser sec en general. En promig va ploure 40,2 l/m², quan el normal és 68,4 l/m², un 41 % menys. El mes va ser sec a Mallorca i Formentera i normal a Menorca i Eivissa, amb anomalies de -47 %, -42 %, -20 % i -15 % respectivament.

Les precipitacions màximes diàries van ser les següents: a Mallorca, 64,9 l/m² a Boscana Nou (Vilafranca) el dia 12; a Eivissa, 44,7 l/m² a Santa Gertrudis el dia 31; a Menorca, 37,6 l/m² a cala Galdana (Ciutadella) el dia 9; i a Formentera, 21,2 l/m² a Can Vicenç den Xumeu el dia 31.

Hi va haver 4 dies amb calabruix a Mallorca i 1 a Menorca. També 1 dia amb neu a Mallorca per damunt dels 1.300 metres (que és el normal per a un mes de desembre).

Pel que fa al vent, el mes va ser normal l'arxipèlag. La ràfega més forta es va registrar el dia 7 amb 152 km/h del nord a la serra d'Alfàbia.









MODELS DE BALANÇ HÍDRIC: Un element comú a tots els indrets de les Illes és l'aridesa estival. La coincidència, a l'estiu, de les altes temperatures i la manca de precipitació provoca un dèficit hídric, moment crític per al desenvolupament de la vegetació.

■ excés
d'aigua

■ aigua
aprofitable

■ aigua
aprofitada


■ dèficit hídric,
aridesa




ELS VENTS. Roses de vent de l'estació de Son Bonet, Marratxí, calculat a 500 metres d'alçada amb dades dels radiosondatge a les 00, i 12 hores UTC. S'indiquen les freqüències en tants per mil de direcció i velocitat del vent, i velocitat mitjana (Km/h) per direccions, durant l'any 2024.

■ 0-10 ■ 10-20 ■ 20-30 ■ 30-40 ■ 40-50 ■ ≥50


Gener




Febrer




Març




Abril




Maig




Juny




Juliol




Agost




Setembre




Octubre



Novembre



Desembre



ANNEX II: ESTATUS DE L'AVIFAUNA BALEAR

Llista sistemàtica dels aucells de les Balears i el seu estatus. En successives edicions de l'AOB hem anat perfilant l'estatus de cada espècie basant-nos en la informació acumulada dels nostres arxius. Aquest estatus és susceptible de ser sotmès a futures correccions amb l'aportació d'una major i més detallada informació.

La llista segueix partir del 2018 l'ordre sistemàtic de la llista mundial d'aus, editada per International Ornithological Congress (IOC) (GILL *et al.*, 2021).

L'estatus que presentam per espècies fa referència a les quatre illes, Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera. Se pot considerar que l'avifauna de les Balears està constituïda per les categories A, B i C, totalitzant 408 espècies. Els comentaris i referències de cada espècie que apareixen en aquesta llista es refereixen a la informació recollida des de 1950.

La llista d'aus de Balears s'actualitza cada any per Carles López-Jurado amb les cites publicades al AOB. Les últimes revisions globals per illes van ser: A Mallorca el 2008 per Joan Miquel González, Jordi Muntaner, Maties Rebassa, Josep Sunyer i Pere Vicens; A Menorca el 2008 per Félix de Pablo, Damià Coll, Óscar García i Antoni Pons; A Eivissa el 2007 per José Esteban Cardona, Alberto García, David García, Oliver Martínez i Joan Carles Palerm; A Formentera el 2020 per Santiago Costa.

Es suggereix la següent fórmula per a la citació d'aquest annex: AU-TOR/S. 2024, Annex II: Estatus de

l'Avifauna Balear. *Anuari Ornitològic de les Balears*. Vol. 38. GOB.

CODIS

Categories. Aquests codis per a les espècies observades en llibertat en un territori varen ser desenvolupats originalment per la BOURC i adaptats per l'AERC-TAC. Són els següents (apareix a l'esquerra del nom científic):

Categoria A.- Espècies enregistrades en aparent estat natural almenys una vegada des de l'1 de gener de 1950 (IB: 388 sp).

Categoria B.- Espècies enregistrades en aparent estat natural almenys una vegada entre 1801 i el 31 de desembre de 1949 però no amb posterioritat (IB: 5 sp).

Categoria C.- Espècies amb poblacions reproductores autosuficients (mínim d'uns 100 ex.) d'origen antròpic a l'àrea de referència o a països veïnats (espècies escapades i naturalitzades, introduïdes o reintroduïdes) (IB: 14 sp).

C1 Introduccions naturalitzades. Espècies que estan presents com a resultat d'una introducció (IB: 6 sp).

C2 Naturalitzacions parcials. Espècies amb poblacions establertes com a resultat de la introducció feta per l'home (IB: 2 sp).

C3 Reintroduccions. Espècies amb poblacions reintroduïdes amb èxit per l'home en àrees on es trobaven anteriorment (IB: 3 sp).

C4 Espècies assilvestrades. Espècies domèstiques (seleccionades artificialment) amb poblacions establertes en llibertat (IB: 1 sp).

C5 *Espècies naturalitzades erràtiques.* Espècies amb poblacions naturalitzades establertes en altres països dins la mateixa regió (IB: 2 sp).

Categoria D.- Espècies que es podrien incloure a les categories A o B però que es té la sospita que tots els registres corresponen a exemplars d'origen no natural ni naturalitzat (hi ha dubtes raonables sobre el seu origen natural). Figuren en un annex a títol informatiu en espera de la seva definitiva categorització (IB: 8 sp).

Categoria E. Espècies introduïdes o reintroduïdes per l'home de manera deliberada o accidental a les illes, que no han establert poblacions reproductores que se mantinguin per elles mateixes. No se contemplen com a integrants de la llista d'espècies de les Illes Balears (IB: 84 sp).

E1 Espècies de les quals s'ha comprovat la reproducció de forma regular i de les quals hi ha sospites que poden arribar a establir-se.

E2 Espècies de les quals s'ha comprovat la reproducció en llibertat de forma regular o ocasional (IB: 4 sp).

E3 Espècies observades només de forma ocasional, sense haver constatat la seva reproducció (IB: 80 sp).

Estatus. S'empren els següents símbols (apareix a la dreta del nom científic):

R: Reproductor; població que cria (IB 135 sp: 115 regularment, 18 esporádiques, 2 extingides).

S: Sedentari; població present tot l'any.

Estival no reproductor; població present a la primavera i estiu però no cria.

M: Migrant; població present sols en migració prenupcial i/o postnupcial.

H: Hivernant; població present sols a l'hivern.

A: Accidental; espècie molt rara, allunyada de la seva àrea normal de distribució, migració o hivernada (Si pertany al Paleàrtic occidental).

D: Divagant; espècie que apareix extralimitant el seu àmbit geogràfic de presència habitual (No pertany al Paleàrtic occidental).

?/F: estatus dubtós.

En les espècies on la població ha pogut ser quantificada, s'indiquen a més els següents paràmetres (apareix en minúscula a continuació del codi de l'estatus):

r: Rar	1-10
e: Escàs	11-100
m: Moderat	101-1.000
a: Abundant	> 1.000

Les xifres fan referència, en el cas de nidificants, al nombre de parelles i, en altres casos es refereixen a individus.

La darrera columna de la presentació es reserva a observacions diverses. El codi **F** significa que falta informació. Quan es tracta d'espècies polítípiques (amb més d'una subespècie descrita), s'indiquen les subespècies si les presents a les Balears no són la nominal i són formes àmpliament acceptades. També s'indica quines espècies estan sotmeses a gestió cinegètica.

REFERENCIES

- GILL, F, D DONSKER Y P RASMUSSEN (Eds.)
2021. Lista mundial de las aves del IOC (versión 11.1). doi: 10.14344 / IOC.ML.11.1.

Estatus					
Cat. Espècie	Mallorca	Menorca	Eivissa	Formentera	Observacions
CATEGORIES A, B, C					
ANATIDAE					
A <i>Branta leucopsis</i> (monotípica)	A	A	A	-	
A <i>Anser anser anser</i>	He	Hr	Hr	Hr	
A <i>Anser fabalis fabalis</i>	A	A	-	-	
A <i>Anser fabalis rossicus</i>	A	-	-	-	
A <i>Anser albifrons albifrons</i>	A	-	-	-	
C5,D <i>Anser erythropus</i> (monotípica)	A	A	-	-	
A <i>Cygnus olor</i> (monotípica)	A	A	A	-	
A <i>Cygnus columbianus bewickii</i>	A	-	-	-	
A <i>Cygnus cygnus</i> (monotípica)	A	A	-	-	
A <i>Tadorna tadorna</i> (monotípica)	Re, Hm	Rr, He, Me	Rr, Hm, Me	Rr, Hr, Me	Cria des de 2007 a Menorca
A <i>Tadorna ferruginea</i> (monotípica)	Hr, Mr	Mr	Mr	Mr	
A <i>Spatula querquedula</i> (monotípica)	Hr, Mm	Me	Me	Me	Cria 2007 i 2008 a Mallorca
A <i>Spatula discors</i> (monotípica)	D	D	-	-	
A <i>Spatula clypeata</i> (monotípica)	Rr, Ha, Mm	Hm, Mm	He, Me	Hr, Me	Cria esporàdica 2018 ME-FO
A <i>Mareca strepera</i> (monotípica)	R-Sm, Hr, Me	R-Se, He, Me	He, Mr	Hr, Mr	Cria des de 2009 a Menorca
A <i>Mareca penelope</i> (monotípica)	Hm, Mm	Hm, Mm	He, Me	Hr, Me	
A <i>Anas platyrhynchos platyrhynchos</i>	R-Sm, Ha	R-Sm, Ha, Ma	R-Sr, He, Me	R-Sr, Hr, Me	Cria des de 1998 a Eivissa, i a Formentera a 2005
A <i>Anas acuta acuta</i>	He	He	He, Me	Hr, Me	
A <i>Anas crecca crecca</i>	Ha, Mm	Hm, Mm	He, Me	He, Me	
AC3 <i>Marmaronetta angustirostris</i> (monot.)	Rr, Mr	Mr	Mr	Mr	
AC2 <i>Netta rufina</i> (monotípica)	R-Se.	R-Se	Hr, Mr	Hr, Mr	Reintroduït 1991 MA. Cria 2009 MA i des de 2011 ME
A <i>Aythya ferina</i> (monotípica)	Re, Hm	Hm, Mm	He, Me	Hr, Me	Cria esporàdica 2008, 2013, 2014 i 2015 a Menorca
A <i>Aythya nyroca</i> (monotípica)	Mr, Hr	Rr, Se, Mr	Mr	Mr	
A <i>Aythya collaris</i> (monotípica)	A	-	-	-	
A <i>Aythya fuligula</i> (monotípica)	Hm	He	Hr	-	
A <i>Aythya marila marila</i>	A	A	-	-	
A <i>Aythya affinis</i>	A	-	-	-	
A <i>Somateria mollissima mollissima</i>	A	A	-	-	
A <i>Melanitta fusca</i> (monotípica)	A	A	-	-	
A <i>Melanitta nigra</i> (monotípica)	Hr	Hr	Hr	Hr	
A <i>Clangula hyemalis</i> (monotípica)	A	-	-	-	
A <i>Bucephala clangula clangula</i>	A	A	-	-	
B <i>Mergellus albellus</i> (monotípica)	A	-	-	-	
B <i>Mergus merganser merganser</i>	A	-	-	-	
A <i>Mergus serrator</i> (monotípica)	He	He	Hr	Hr	
C1 <i>Oxyura leucocephala</i> (monotípica)	Ex	-	A	-	Introduït a MA el 1993. 95 i 04. I cria en 1996, 98, 99, 00 des de 2008
PHASIANIDAE					
C1 <i>Alectoris rufa intercedens</i>	R-Sa	R-Sm	R-Sa	R-Sm	Gestió cinegètica
A <i>Coturnix coturnix coturnix</i>	Rm, Mm	R-Sm, Mm	R-Sm, Mm	Re, Me	Gestió cinegètica
C1 <i>Phasianus colchicus ssp.</i>	R-Se	R-S	R-Se	R-Sr	Gestió cinegètica
GAVIIDAE					
A <i>Gavia stellata</i> (monotípica)	A	A	-	-	
A <i>Gavia arctica arctica</i>	A	-	-	-	
B <i>Gavia immer</i> (monotípica)	-	A	-	-	
HYDROBATIDAE					
A <i>Hydrobates pelagicus melitensis</i>	R-Sm	Re	R-Sa	Re, Sa	F.
A <i>Oceanodroma monorhis</i> (monotípica)	D	-	-	-	
A <i>Oceanodroma leucorhoa leucorhoa</i>	A	A	-	-	
PROCELLARIIDAE					
A <i>Calonectris diomedea</i> (monotípica)	Rm, He	Ra	Rm, He	Ra, He	
A <i>Calonectris borealis</i> (monotípica)	A	-	-	-	
A <i>Ardenna gravis</i> (monotípica)	A	A	-	-	
A <i>Puffinus yelkouan</i> (monotípica)	Hr	R-Se	Hr	Hr	
A <i>Puffinus mauretanicus</i> (monotípica)	Rm	-	Ra	Ra	
PODICIPEDIDAE					
A <i>Tachybaptus ruficollis ruficollis</i>	R-Sm, He	R-Sm, Hm, Mm	R-Sr, He, Me	Mr	F
A <i>Podiceps grisegena grisegena</i>	A	-	-	-	
A <i>Podiceps cristatus cristatus</i>	R-Sr, Hr, Mr	R-Se, He	Mr	Mr	Cria des de 2010 a Menorca
A <i>Podiceps auritus auritus</i>	A	A	-	-	
A <i>Podiceps nigricollis nigricollis</i>	He, Me	Hm, Mm	He, Me	Enr e, Ha	

		Estatus					
Cat.	Espècie	Mallorca	Menorca	Eivissa	Formentera	Observacions	
PHOENICOPTERIDAE							
A	<i>Phoenicopterus roseus</i> (monotípica)	He, Mm	He, Me	Enr, Hm, Mm	He, Me	Cria esporàdica 2022 i 23 a Mallorca	
C5	<i>Phoeniconaias minor</i>	D	-	-	-		
CICONIIDAE							
A	<i>Ciconia nigra</i> (monotípica)	Mr	Mr	Mr	Mr		
A	<i>Ciconia ciconia ciconia</i>	Hr, Mr	He, Me	Hr, Mr	Hr, Mr		
THRESKIORNITHIDAE							
A	<i>Plegadis falcinellus falcinellus</i>	R-Sr, Mr	Hr, Mr	Mr	Mr	Cria a partir de 2016 a Mallorca	
A	<i>Platalea leucorodia leucorodia</i>	Hr, Mr	Hr, Mr	Mr	-		
A	<i>Platalea alba</i> (monotípica)	D	-	-	-		
ARDEIDAE							
A	<i>Botaurus stellaris stellaris</i>	R-Sr, Mr	Mr	Mr	Mr	F. Cria esporàdica 2011 i 2012 a Menorca	
A	<i>Ixobrychus minutus minutus</i>	Re, Hr, Me	Me	Mr	Mr		
A	<i>Nycticorax nycticorax nycticorax</i>	R-Se, Mm, He	Enr, M	Me	Me	Cria esporàdica 1990 i 91 a Mallorca	
A	<i>Ardeola ralloides ralloides</i>	Rr, Me	Me	Me	Mr		
A	<i>Bubulcus ibis ibis</i>	R-Sm, Hm, Mm	R-Se, Hm, Mm	He, Me	He, Me		
A	<i>Ardea cinerea cinerea</i>	Enr r, Hm, Mm	Enr e, Hm, Mm.	Hm, Mm	Hr, Mm		
A	<i>Ardea purpurea purpurea</i>	Rm, Mm	Rr, Me	Me	Me		
A	<i>Ardea alba alba</i>	Enr, Hr, Me	He, Mr	Mr	Mr		
A	<i>Egretta garzetta garzetta</i>	Re, Hm, Mm	Enr e, Hm, Mm	He, Mm	Enr r, He, Mm		
A	<i>Egretta gularis gularis</i>	A	-	-	-		
SULIDAE							
A	<i>Morus bassanus</i> (monotípica)	He, Me	He, Me	He, Mr	He, Me		
A	<i>Sula leucogaster</i>	A	-	-	-		
PHALACROCORACIDAE							
A	<i>Phalacrocorax carbo sinensis</i>	Me, Hm	Ma, Ha	He, Mr	He		
A	<i>Phalacrocorax carbo carbo</i>	Hr	Hr	Hr	Hr		
A	<i>Gulosus aristotelis desmarestii</i>	R-Sm	R-Sa	R-Sm	R-Sm		
PANDIONIDAE							
A	<i>Pandion haliaetus haliaetus</i>	R-Sr, Hr, Me	R-Sr, Mr	R-Sr, Me	Me.	Extingit com a reproductor a Formentera	
ACCIPITRIDAE							
A	<i>Neophron percnopterus percnopterus</i>	R-Sr, Mr	R-Se	Mr	-	Cria a partir 2012 a Mallorca	
A	<i>Pernis apivorus</i> (monotípica)	Mm	Mm	Mm	Mm		
A	<i>Gyps fulvus fulvus</i>	R-Se	A	A	A		
A	<i>Aegypius monachus</i> (monotípica)	R-Se	A	A	-		
A	<i>Circus gallicus</i> (monotípica)	Hr, Mr	Hr, Mr	Hr, Mr	Mr		
A	<i>Clanga pomarina</i> (monotípica)	A	A	-	-		
A	<i>Hieraetus pennata</i> (monotípica)	R-Sm, Mm	R-Sm	He, Me	Hr, Me		
AC4	<i>Aquila chrysaetos homeyeri</i>	Ex	-	-	-		Extingit com a reproductor en la dècada de 1950 a Mallorca
AC3	<i>Aquila fasciata fasciata</i>	Rr, Se	A	A	-		
A	<i>Accipiter nisus nisus</i>	He, Me	Enr r, He, Me	He, Me	He, Mr		
A	<i>Accipiter gentilis gentilis</i>	-	A	-	-		
A	<i>Circus aeruginosus aeruginosus</i>	R-Se, He, Mm	He, Mm	Hr, Mm	Hr, Mm		
A	<i>Circus aeruginosus harterti</i>	Hr	-	-	-		
A	<i>Circus cyaneus cyaneus</i>	Hr, Me	He, Me	Hr, Me	Hr, Me		
A	<i>Circus macrourus</i> (monotípica)	Mr	Mr	Mr	Mr		
A	<i>Circus pygargus</i> (monotípica)	Me	Me	Me	Me	Cria esporàdica 1967, 2001, 03 i 04 a Mallorca, i 1977 a Eivissa	
A	<i>Milvus milvus milvus</i>	R-Se, He, Mr	R-Se	Mr	Mr		
A	<i>Milvus migrans migrans</i>	Hr, Me	Enr r, Hr, Mr	Me	Mr		
A	<i>Haliaeetus albicilla</i> (monotípica)	A	-	-	-		
A	<i>Buteo buteo buteo</i>	R-Se, Hr, Me	He, Me	Hr, Me	Hr, Me		
RALLIDAE							
A	<i>Rallus aquaticus aquaticus</i>	R-Sm	R-Se	R-Se, Mr	Hr, Mr	F	
A	<i>Crex crex</i> (monotípica)	Mr	Mr	Mr	Mr		
A	<i>Porzana porzana</i> (monotípica)	Hr, Me	He, Me	Hr, Me	Me		
A	<i>Gallinula chloropus chloropus</i>	R-Sa, He, Me	R-Sm, Mm	R-Se, He	R-Sr, Me		
A	<i>Fulica atra atra</i>	R-Sa, Ha, Me	R-Sm, Ha, Ma	He, Me	Hr, Me		

		Estatus				Observacions
Cat.	Espècie	Mallorca	Menorca	Eivissa	Formentera	
C3	<i>Fulca cristata</i> (monotípica)	R-Sr	A	-	-	Reintroduït el 2004 a Mallorca
A	<i>Porphyrio alleni</i> (monotípica)	D	-	D	-	
AC3	<i>Porphyrio porphyrio</i> (monotípica)	R-Sm	R-Se	A	A	Reintroduït a Mallorca en 1991. Crià des de 2000 a Menorca
A	<i>Zapornia pusilla intermedia</i>	A	A	A	-	F
A	<i>Zapornia parva</i> (monotípica)	Mr	Hr, Mr	Mr	Mr	F
GRUIDAE						
A	<i>Grus grus</i> (monotípica)	He, Me	He, Me	He, Mr	Me	
TURNICIDAE						
A	<i>Turnix sylvaticus sylvaticus</i>	-	-	-	A	
OTIDIDAE						
A	<i>Otis tarda tarda</i>	-	-	-	A	
BURHINIDAE						
A	<i>Burhinus oedicnemus saharae</i>	R-Sa, He, Me	R-Sm	R-Sa	R-Sm, He, Me	
HAEMATOPODIDAE						
A	<i>Haematopus ostralegus ostralegus</i>	Me	Mr	Mr	Mr	
RECURVIVIROSTRIDAE						
A	<i>Himantopus himantopus himantopus</i>	Rm, He, Mm	Re, Mm	Rm, Mm	Re	
A	<i>Recurvirostra avosetta</i> (monotípica)	Re, Hr, Me	He, Me	Hr, Me	Rr, Hr, Me	
CHARADRIIDAE						
A	<i>Vanellus vanellus</i> (monotípica)	Ha, Mm	Hm	He, Me	He, Me	
A	<i>Vanellus gregarius</i> (monotípica)	D	-	-	-	
A	<i>Anarhynchus alexandrinus alexandrinus</i>	R-Sm, Hm, Ma	R-Se, He, Me	R-Se, Hm, Mm	R-Se, Hr	
A	<i>Pluvialis fulva</i> (monotípica)	D	-	-	-	
A	<i>Pluvialis dominica</i> (monotípica)	D	-	-	-	
A	<i>Pluvialis apricaria</i> (monotípica)	Hm, Mm	Hm, Mm	Hm, Me	Hm	
A	<i>Pluvialis squatarola</i> (monotípica)	He, Me	He, Me	He, Me	Hr, Me	
A	<i>Charadrius hiaticula hiaticula</i>	Hr, Mm	Hr, Mm	Hr, Me	Hr, Mr	Cria esporàdica 1989 a Mallorca
A	<i>Charadrius dubius curonicus</i>	R-Se, He, Mm	Re, Mm	Rr, Hr, Me	Me	Cria esporàdica 2015 a Eivissa
A	<i>Charadrius morinellus</i> (monotípica)	Hr, Mr	Mr	Mr	Mr	
SCOLOPACIDAE						
A	<i>Numenius phaeopus phaeopus</i>	Hr, Me	Me	Hr, Me	Me	
B	<i>Numenius tenuirostris</i> (monotípica)	-	A	-	-	
A	<i>Numenius arqueta arquata</i>	He, Me	Hr, Mr	Hr, Mr	Mr	
A	<i>Limosa limosa limosa</i>	Hr, Me	He, Me	Mr	Me	
A	<i>Limosa lapponica lapponica</i>	Me	Mr	Hr, Me	Me	
A	<i>Arenaria interpres interpres</i>	Hr, Me	Me	Hr, Mr	Hr, Mr	
A	<i>Calidris canutus canutus</i>	Hr, Mr	Hr, Mr	Hr, Mr	Mr	
A	<i>Calidris pugnax</i> (monotípica)	He, Mm	Mm	Hr, Me	Me	
A	<i>Calidris falcinellus falcinellus</i>	A	-	-	-	
A	<i>Calidris himantopus</i> (monotípica)	D	-	-	-	
A	<i>Calidris ferruginea</i> (monotípica)	Hr, Mm	Mm	Hr, Me	Me	
A	<i>Calidris temminckii</i> (monotípica)	Hr, Me	Mr	Mr	Mr	
A	<i>Calidris alba</i> (monotípica)	Hr, Me	Me	Hr, Mr	Hr, Mr	
A	<i>Calidris alpina schinzii</i>	He, Me	Hr, Me	He, Me	Hr, Me	
A	<i>Calidris alpina alpina</i>	Hm, Mm	Hr, Mm	He, Me	Hr, Me	
A	<i>Calidris maritima</i> (monotípica)	A	A	-	-	
A	<i>Calidris bairdii</i> (monotípica)	D	-	-	-	
A	<i>Calidris minuta</i> (monotípica)	Hm, Mm	Mm	He, Me	Hr, Me	
A	<i>Calidris fuscicollis</i> (monotípica)	D	-	-	-	
A	<i>Calidris subruficollis</i> (monotípica)	D	-	-	-	
A	<i>Calidris melanotos</i> (monotípica)	D	-	D	-	
A	<i>Limnodromus scolopaceus</i> (monot.)	D	-	-	-	
A	<i>Scolopax rusticola</i> (monotípica)	Ha, Mm	Ha, Ma	Hm, Mm	Hm	
A	<i>Lymnocyrtes minimus</i> (monotíp.)	Hr, Me	Hr, Me	Hr, Me	Me	
A	<i>Gallinago media</i> (monotípica)	Mr	Mr	-	-	
A	<i>Gallinago gallinago gallinago</i>	Ha, Mm	Hm, Mm	Hm, Me	He, Me	
A	<i>Xenus cinereus</i> (monotípica)	A	-	-	-	
A	<i>Phalaropus tricolor</i> (monotípica)	D	-	-	-	
A	<i>Phalaropus fulicarius</i> (monotípica)	-	-	A	-	
A	<i>Phalaropus lobatus</i> (monotípica)	A	-	-	-	
A	<i>Actitis hypoleucos</i> (monotípica)	Hm, Mm	Enr,Hm, Mm	Enr, Hr, Mm	He, Mm	
A	<i>Tringa ochropus</i> (monotípica)	Hr, Mm	He, Mm	He, Me	Me	

		Estatus				Observacions
Cat.	Espècie	Mallorca	Menorca	Eivissa	Formentera	
A	<i>Tringa flavipes</i> (monotípica)	D	-	-	-	
A	<i>Tringa totanus totanus</i>	Re, Hm, Mm	Hr, Mm	Rr, He, Mm	Hr, Mm	
A	<i>Tringa stagnatilis</i> (monotípica)	Mr	Mr	Mr	Mr	
A	<i>Tringa glareola</i> (monotípica)	Hr, Mm	Mm	Me	Mm	
A	<i>Tringa erythropus</i> (monotípica)	Enr r, He, Mm	He, Me	Hr, Me	Me	
A	<i>Tringa nebularia</i> (monotípica)	He, Mm	Hr, Me	He, Me	Hr, Me	
A	<i>Tringa melanoleuca</i> (monotípica)	D	-	-	-	
GLAREOLIDAE						
A	<i>Cursorius cursor cursor</i>	-	D	-	-	
A	<i>Glareola pratincola pratincola</i>	Me	Mr	Mr	Mr	
A	<i>Glareola nordmanni</i> (monotípica)	A	-	-	-	
LARIDAE						
A	<i>Rissa tridactyla tridactyla</i>	Hr, Mr	He	Hr, Mr	Hr	
A	<i>Chroicocephalus genei</i> (monot.)	Hr, Me	Mr	Hr, Mr	Hr, Mr	
A	<i>Chroicocephalus ridibundus</i> (monot.)	Re, Ha, Ma	Hm, Me	Hm, Mm	Hm, Ma	Cria a Mallorca desde 2015
A	<i>Hydrocoloeus minutus</i> (monotípica)	Hr, Mr	Hr, Mr	Hr, Mr	Hr, Mr	
A	<i>Ichthyaetus audouinii</i> (monotípica)	Rm, He	Rm, Hr	Rm, Hm	R-Sm, Hm	
A	<i>Ichthyaetus melanocephalus</i> (monot.)	He, Me	Hr, Mr	He, Me	Hr	Cria esporàdica 1984 a Mallorca
A	<i>Larus canus canus</i>	A	A	-	A	
A	<i>Larus marinus</i> (monotípica)	A	A	-	-	
A	<i>Larus argentatus ssp.</i>	A	-	-	-	
A	<i>Larus cachinnans</i> (monotípica)	A	-	-	-	
A	<i>Larus michahellis michahellis</i>	R-Sa	R-Sa	R-Sa	R-Sa	
A	<i>Larus fuscus fuscus</i>	Hr, Mr	Hr	Hr, Mr	-	
A	<i>Larus fuscus intermedius</i>	He, Me	Hr	Hr, Mr	Mr	
A	<i>Larus fuscus graellsii</i>	Hr, Me	Hr	Hr, Mr	-	
A	<i>Gelochelidon nilotica nilotica</i>	Me	Mr	Mr	Me	
A	<i>Hydroprogne caspia</i> (monotípica)	Mr	Mr	Hr, Mr	Mr	
A	<i>Thalasseus bengalensis emigratus</i>	A	-	-	-	
A	<i>Thalasseus sandvicensis</i> (monot.)	He, Me	He, Me	Hm, Me	He, Me	
A	<i>Thalasseus elegans</i> (monotípica)	A	-	-	-	
A	<i>Sternula albifrons albifrons</i>	Me	Mr	Mr	Mr	Cria esporàdica 2020 a Formentera.
A	<i>Sterna dougalli dougalli</i>	-	-	-	A	
A	<i>Sterna hirundo hirundo</i>	Re, Me	Mr	Mr	Mr	
A	<i>Chlidonias hybrida hybrida</i>	Mm	Me	Me	Mr	
A	<i>Chlidonias leucopterus</i> (monotípica)	Me	Mr	Mr	Mr	
A	<i>Chlidonias niger niger</i>	Me	Mr	Mr	Mr	
STERCORARIIDAE						
A	<i>Stercorarius skua</i> (monotípica)	He, Me	He, Me	Hr, Mr	He, Me	
A	<i>Stercorarius pomarinus</i> (monotípica)	Mr	-	-	-	
A	<i>Stercorarius parasiticus</i> (monotípica)	Mr	Mr	-	-	
A	<i>Stercorarius longicaudus ssp.</i>	A	-	-	-	
ALCIDAE						
A	<i>Uria aalge albionis</i>	A	A	A	-	
A	<i>Alca torda islandica</i>	He	Hr	Hr	Hr	
A	<i>Fratercula arctica</i> (monotípica)	He	H	He	He	
COLUMBIDAE						
AC2	<i>Columba livia livia</i>	R-Sa	R-Sa	R-Se	Hr	
A	<i>Columba oenas oenas</i>	Mr	Mr	-	-	
A	<i>Columba palumbus palumbus</i>	R-Sa, He, Me	R-Sm, Hm	R-Sm, Hm	R-Sm	
A	<i>Streptopelia turtur turtur</i>	Mm	Ma	Mm	-	
A	<i>Streptopelia turtur arenicola</i>	Rm, Mm	Rm, Ma	Rm, Mm	Rm	
A	<i>Streptopelia decaocto decaocto</i>	R-Sa	R-Sa	R-Sa	R-Sr	Colonització a Mallorca dècada dels 90, a Menorca des de 1997, a Eivissa des de 1999, i a Formentera des de 2004.
A	<i>Spilopelia senegalensis phoenicophila</i>	A	-	A	-	
OTIDIDAE						
A	<i>Tetrax tetrax</i>	A	A	-	-	
CUCULIDAE						
A	<i>Clamator glandarius</i> (monotípica)	Mr	Mr	Mr	Mr	
A	<i>Coccyzus americanus</i> (monotípica)	D	-	-	-	
A	<i>Cuculus canorus canorus</i>	Mm	Mm	Mm	Mm	
A	<i>Cuculus canorus bangsi</i>	Rm, Me	Re, Me	Re, Me	R?, Me	
TYTONIDAE						
A	<i>Tyto alba alba</i>	R-Sm	R-Sm	R-Sm	R-Sm	

Estatus					
Cat. Espècie	Mallorca	Menorca	Eivissa	Formentera	Observacions
A <i>Tyto alba gutata</i>	Mr	-	-	-	
STRIGIDAE					
A <i>Otus scops scops</i>	He, Me	Hm, Mm	He	He, Me	
A <i>Otus scops mallorcae</i>	R-Sa	R-Sm	R-Sa	R-Sr	
A <i>Athene noctua vidalii</i>	Hr	Hr	Hr, Me	A	Cria esporàdica 1973, 75 i 83 a Mallorca i 1993 a Menorca.
A <i>Asio otus otus</i>	R-Sm, Me	Rr, Me	R-Se	R-Sm	F
A <i>Asio flammeus flammeus</i>	Hr, Me	He, Me	Me	Me	Cria esporàdica 1976 a Mallorca
CAPRIMULGIDAE					
A <i>Caprimulgus ruficollis ruficollis</i>	Mr	Mr	Mr	Mr	
A <i>Caprimulgus europaeus meridionalis</i>	Rm, Mm	Rm, Mm	Re, Mm	Me	F
APOCIDAE					
A <i>Tachymarpis melba melba</i>	Re, Mm	Re, Me	R?, Me	-	
A <i>Apus apus apus</i>	Ra, Ma	Ra, Ma	Ra, Ma	Ra, Ma	
A <i>Apus pallidus brehmorum</i>	Rm, Mm	Rm, Mm	Rm, Mm	-	F
CORACIIDAE					
A <i>Coracias garrulus garrulus</i>	Mr	Me	Mr	Mr	
ALCEDINIDAE					
A <i>Alcedo atthis atthis</i>	Hr, Mr	Hr, Mr	Hr, Mr	Hr, Mr	
A <i>Alcedo atthis ispida</i>	He, Mm	He, Me	He, Me	He, Me	
MEROPIIDAE					
A <i>Merops persicus ssp.</i>	A	-	-	-	
A <i>Merops apiaster</i> (monotípica)	Re, Ma	Rm, Mm	Re, Mm	Mm	
UPUPIDAE					
A <i>Upupa epops epops</i>	R-Sa, He, Me	R-Sm, Mm	R-Sm, Mm	R-Se	
PICIDAE					
A <i>Jynx torquilla torquilla</i>	R-Sa, Ha, Ma	Rr, He, Mm	R-Sm, Hm, Mm	Rr, He, Mm	
A <i>Dryobates minor buturlini</i>	A	-	-	-	
A <i>Dendrocopos major hispanus</i>	A	-	-	A	
A <i>Picus sharpei</i>	A	-	-	-	
FALCONIDAE					
A <i>Falco naumanni</i> (monotípica)	Mr	Mr	Mr	Mr	F. Extintit com a reprod. a Menorca
A <i>Falco tinnunculus tinnunculus</i>	R-Sa, He, Mm	R-Sm, Hm, Mm	R-Sm, He	R-Sm	Darrer any de cria 1993 a Cabrera
A <i>Falco vespertinus</i> (monotípica)	Me	Me	Me	Mr	
A <i>Falco eleonorae</i> (monotípica)	Rm	Me	Rm	Me	
A <i>Falco columbarius aesalon</i>	Hr, Mr	Hr, Mr	Hr, Mr	Hr, Mr	
A <i>Falco subbuteo subbuteo</i>	Me	Me	Hr, Mr	Mr	Cria esporàdica 1988, 89, 90 a Mallorca, i 2003 a Menorca
A <i>Falco biarmicus erlangeri</i>	A	A	-	-	
A <i>Falco cherrug cherrug</i>	-	A	-	-	
A <i>Falco peregrinus peregrinus</i>	Hr	-	Hr	-	
A <i>Falco peregrinus calidus</i>	Hr, Mr	Mr	-	-	
A <i>Falco peregrinus brookei</i>	R-Sm	R-Se	R-Se	R-Se	
PSITTACIDAE					
C1 <i>Myiopsitta monachus ssp.</i>	R-Se.	-	R-Se	-	Colonització a Mallorca des del 1985, des del 1998 a Eivissa. Cria esporàdica 1987 a Menorca. Control poblacional.
C1 <i>Psittacula krameri ssp.</i>	Se	-	Se	-	Control poblacional.
LANIIDAE					
A <i>Lanius collurio collurio</i>	Mr	Mr	Mr	Mr	
A <i>Lanius isabellinus isabellinus</i>	D	-	D	-	
A <i>Lanius minor</i> (monotípica)	A	A	-	-	
A <i>Lanius excubitor excubitor</i>	Mr	-	Mr	Mr	
A <i>Lanius meridionalis meridionalis</i>	Hr, Mr	Mr	Hr, Mr	Hr, Mr	
A <i>Lanius senator senator</i>	Ma	Mm	Ma	Ma	
A <i>Lanius senator badius</i>	Ra, Ma	Rm, Mm	Ra, Ma	Re, Ma	
A <i>Lanius senator niloticus</i>	A	A	-	-	
A <i>Lanius nubicus</i> (monotípica)	A	-	-	-	
ORIOLIDAE					
A <i>Oriolus oriolus oriolus</i>	Me	Me	Me	Me	Cria esporàdica el 1978 a Mallorca
CORVIDAE					
A <i>Garrulus glandarius fasciatus</i>	A	-	-	-	

		Estatus				Observacions
Cat.	Espècie	Mallorca	Menorca	Eivissa	Formentera	
A	<i>Pyrrhocorax pyrrhocorax erythrorhamphus</i>	Hr	Hr	Hr	-	
A	<i>Pyrrhocorax graculus graculus</i>	A	-	A	-	
A	<i>Coloeus monedula spermologus</i>	A	A	-	-	
A	<i>Corvus frugilegus frugilegus</i>	A	A	A	-	
A	<i>Corvus corone</i> (monotípica)	A	-	A	-	
A	<i>Corvus cornix</i> ssp.	A	-	A	-	
A	<i>Corvus corax hispanus</i>	R-Se	R-Sm	R-Sr	R-Sr	
PARIDAE						
A	<i>Periparus ater vieirae</i>	A	-	A	-	
A	<i>Cyanistes caeruleus balearicus</i>	R-Sm	-	A	-	F
A	<i>Parus major mallorcae</i>	R-Sa	R-Sm	R-Sa	-	
REMIZIDAE						
A	<i>Remiz pendulinus pendulinus</i>	Hr, Mr	He	Hr	-	
ALAUDIDAE						
A	<i>Alaemon alaudipes alaudipes</i>	-	A	-	-	
A	<i>Ammomanes cinctura arenicolor</i>	A	-	-	-	
A	<i>Lullula arborea arborea</i>	A	-	A	-	
A	<i>Alauda arvensis arvensis</i>	Hm, Mm	Hm, Mm	Hm, Mm	Hm	
A	<i>Alauda arvensis cantarella</i>	Ha, Ma	Hm, Mm	Ha, Mm	Hm	
A	<i>Galerida theklae theklae</i>	R-Sm	R-Sm	R-Sm	R-Sm	
A	<i>Calandrella brachydactyla brachydactyla</i>	Rm, Mm	Rm, Mm	Rm, Mm	Re	
A	<i>Melanocorypha bimaculata</i> (monotípica)	A	-	-	-	
A	<i>Melanocorypha calandra calandra</i>	A	-	-	-	
A	<i>Alauda rufescens apetzii</i>	A	A	-	-	
HIRUNDINIDAE						
A	<i>Riparia riparia riparia</i>	Ma	Mm	Mm	Me	
A	<i>Hirundo rustica rustica</i>	Rm, Ma	Re, Ma	Rm, Ma	Re, Ma	
A	<i>Ptyonoprogne rupestris</i> (monotípica)	R-Sa, Hm, Mr	He, Me	R-Se, Hm	Mr	
A	<i>Delichon urbicum urbicum</i>	Ra, Hr, Ma	Rm, Hr, Ma	Rm, Ma	Ma	
A	<i>Cecropis daurica rufala</i>	Me	Mr	Me	Mr	Cria 2007, 2011 i 2014 a Mallorca, i 2011, 2017 i 2018 a Menorca.
CETTIDAE						
A	<i>Cettia cetti cetti</i>	R-Sa	R-Sa	R-Se, Hm	Mr	
AEGITHALIDAE						
A	<i>Aegithalos caudatus taiti</i>	R-Se	-	-	-	Cria a Mallorca des del 2003.
PHYLLOSCOPIDAE						
A	<i>Phylloscopus sibilatrix</i> (monotípica)	Mm	Me	Me	Mm	
A	<i>Phylloscopus bonelli</i> (monotípica)	Me	Me	Mm	Me	
A	<i>Phylloscopus humei humei</i>	D	-	-	-	
A	<i>Phylloscopus inornatus</i> (monotípica)	Mr	Mr	Mr	-	
A	<i>Phylloscopus proregulus</i> (monot.)	D	-	-	-	
A	<i>Phylloscopus schwarzi</i> (monotípica)	D	-	-	-	
A	<i>Phylloscopus fuscatus fuscatus</i>	-	D	-	-	
A	<i>Phylloscopus trochilus trochilus</i>	Ma	Ma	Ma	Ma	
A	<i>Phylloscopus trochilus acredula</i>	A	A	A	A	
A	<i>Phylloscopus collybita collybita</i>	E no reproduir, Ha, Ma	Ha, Ma	Ha, Mm	Ha, Ma	Cria esporàdica 2008 i 2009 a Mallorca.
A	<i>Phylloscopus collybita abietinus</i>	A	A	-	-	
A	<i>Phylloscopus collybita tristis</i>	A	-	-	-	
A	<i>Phylloscopus ibericus</i> (monotípica)	Me	Me	Mr	Mr	
A	<i>Phylloscopus trochiloides viridanus</i>	-	A	-	-	
A	<i>Phylloscopus borealis</i> (monotípica)	A	-	-	-	
ACROCEPHALIDAE						
A	<i>Acrocephalus arundinaceus arundinaceus</i>	Rm, Hr, Mm	Re, Me	Me	Mr	
A	<i>Acrocephalus melanopogon melanopogon</i>	R-Sa, Me	R-Se	Hr	-	
A	<i>Acrocephalus paludicola</i> (monot.)	A	A	-	-	
A	<i>Acrocephalus schoenobaenus</i> (monot.)	Me	Me	Me	Me	
A	<i>Acrocephalus dumetorum</i> (monot.)	A	-	-	-	
A	<i>Acrocephalus scirpaceus scirpaceus</i>	Rm, Ma	Rm, Mm	Rm, Mm	Rr, Mm	
A	<i>Acrocephalus palustris</i> (monot.)	A	-	-	-	
A	<i>Iduna calligata</i> (monotípica)	D	-	-	-	
A	<i>Iduna opaca</i> (monotípica)	Mr	Mr	Mr	Mr	
A	<i>Hippolais polyglotta</i> (monotípica)	Mm	Mm	Mm	Mm	
A	<i>Hippolais icterina</i> (monotípica)	Mm	Mm	Mm	Mm	

Estatus					
Cat. Espècie	Mallorca	Menorca	Eivissa	Formentera	Observacions
LOCUSTELLIDAE					
A <i>Locustella naevia naevia</i>	Me	Me	Me	Me	
A <i>Locustella luscinioides luscinioides</i>	Rr	Mr	Mr	-	
CISTICOELIDAE					
A <i>Cisticola juncidis cisticola</i>	R-Sa	R-Sm	R-Sm	R-Sr	
SYLVIIDAE					
A <i>Sylvia atricapilla atricapilla</i>	Ha, Ma	Hm, Mm	Ha, Ma	Hm, Ma	
A <i>Sylvia atricapilla paulucci</i>	R-Sa	R-Sm	R-Sr	-	
A <i>Sylvia borin borin</i>	Ma	Ma	Ma	Ma	
A <i>Curruca nisoria nisoria</i>	Mr	Mr	-	Mr	
A <i>Curruca curruca curruca</i>	Mr	Mr	-	Mr	
A <i>Curruca hortensis hortensis</i>	Mr	Me	Mr	Mr	
A <i>Curruca ruppeli</i> (monotípica)	A	-	-	-	
A <i>Curruca melanocephala melanocephala</i>	R-Sa, He, Me	R-Sa, Me	R-Sa	R-Sm	
A <i>Curruca iberiae</i> (monotípica)	Mm	Mm	Mm	Mm	
A <i>Curruca subalpina</i> (monotípica)	Rm, Mm	Mm	Mm	Mm	Cria esporàdica 2004 a Menorca.
A <i>Curruca cantillans cantillans</i>	-	A	-	-	
A <i>Curruca cantillans albirostris</i>	A	A	-	-	
A <i>Curruca communis communis</i>	Ma	Ma	Mm	Ma	
A <i>Curruca conspicillata conspicillata</i>	Rr, Mr	Re, Me	Me	Mr	
A <i>Curruca sarda</i> (monotípica)	-	Mr	-	-	
A <i>Curruca undata dartfordiensis</i>	He, Me	He, Me	He, Me	Me	
A <i>Curruca undata undata</i>	R-Se	R-Sm	-	-	
A <i>Curruca balearica</i> (monotípica)	R-Sa	-	R-Sa	R-Sm	
REGULIDAE					
A <i>Regulus regulus regulus</i>	He, Me	He, Me	He	Me	
A <i>Regulus ignicapilla ignicapilla</i>	He, Me	-	-	Me	
A <i>Regulus ignicapilla balearicus</i>	R-Sa	R-Sm	R-Sa	R-Se	
TROGLODYTLIDAE					
A <i>Troglodytes troglodytes kabyorum</i>	R-Sa	He, Me	R-Sm	Hr, Mr	
TICHODROMADIDAE					
A <i>Tichodroma muraria muraria</i>	A	A	-	-	
STURNIDAE					
A <i>Pastor roseus</i> (monotípica)	A	A	-	-	
A <i>Sturnus vulgaris vulgaris</i>	R-Se, Ha, Ma	Ha, Ma	Ha, Mm	Hm, Mm	
A <i>Sturnus unicolor</i> (monotípica)	R-Se	R-Se	R-Sr	A	Cria desde 2012 a Eivissa
TURDIDAE					
A <i>Zoothera dauma aurea</i>	A	A	-	-	
A <i>Turdus torquatus torquatus</i>	Hm, Mm	Me	He, Me	Me	
A <i>Turdus torquatus alpestris</i>	Hm, Mm	Me	He, Me	Me	
A <i>Turdus merula merula</i>	R-Sa, Hm, Mm	R-Sm, Hm, Mm	R-Sa, Hm, Mm	R-Sr, He, Me	
A <i>Turdus pilaris</i> (monotípica)	He, Me	He, Me	He, Me	Mr	
A <i>Turdus iliacus iliacus</i>	He, Me	He, Me	He, Me	Hr, Mr	
A <i>Turdus philomelos clarkei</i>	Hr, Mr	Hr, Mr	Hr, Mr	Hr, Mr	
A <i>Turdus philomelos philomelos</i>	Ha, Ma	Ha, Ma	Ha, Ma	Ha, Ma	
A <i>Turdus viscivorus viscivorus</i>	Hm, Mm	He, Me	Hm, Me	Me	
MUSCICAPIDAE					
A <i>Cercotrichas galactotes galactotes</i>	Mr	Mr	Mr	Mr	
A <i>Muscicapa striata striata</i>	Ma	Mm	Ma	Mm	
A <i>Muscicapa tyrrenica balearica</i>	Ra	Rm	Ra	Rm	
A <i>Muscicapa tyrrenica tyrrenica</i>	-	Mr	-	-	
A <i>Erithacus rubecula rubecula</i>	R-Sr, Ha, Ma	Ha, Ma	Ha, Ma	Ha, Ma	Cria 2005 i 2009 a Mallorca
A <i>Luscinia svecica cyanecula</i>	Hm, Me	He, Me	He, Me	Mr	
A <i>Luscinia megarhynchos megarhynchos</i>	Ra, Ma	Rm, Mm	Re, Ma	Ma	
A <i>Tarsiger cyanurus</i> (monotípica)	A	-	-	-	
A <i>Ficedula hypoleuca hypoleuca</i>	Ma	Mm	Mm	Mm	
A <i>Ficedula hypoleuca iberiae</i>	Mr	-	-	-	Cria a Mallorca el 1993
A <i>Ficedula albicollis</i> (monotípica)	Mr	Mr	Mr	Mr	
A <i>Ficedula semitorquata</i> (monotípica)	-	A	-	-	
A <i>Ficedula parva</i> (monotípica)	Mr	Mr	-	-	
A <i>Phoenicurus ochruros gibraltariensis</i>	Ha, Ma	Hm, Mm	Ha, Mm	Hm, Mm	
A <i>Phoenicurus phoenicurus phoenicurus</i>	Ma	Mm	Mm	Mm	
A <i>Phoenicurus moussieri</i> (monotípica)	A	-	-	-	

		Estatus					
Cat.	Espècie	Mallorca	Menorca	Eivissa	Formentera	Observacions	
A	<i>Monticola saxatilis</i> (monotípica)	Rr, Me	Me	Mr	Mr	Cria esporàdica 1990 a Mallorca	
A	<i>Monticola solitarius solitatus</i>	R-Sa	R-Sm	R-Sm	R-Se		
A	<i>Saxicola rubetra</i> (monotípica)	Ma	Mm	Mm	Me		
A	<i>Saxicola maurus hemprichii</i>	D	-	-	-		
A	<i>Saxicola rubicola rubicola</i>	R-Sa, Hm, Mm	R-Sa, He, Me	R-Sa, Mm	He, Me		
A	<i>Oenanthe oenanthe leucorhoa</i>	Mr	Mr	Mr	Mr		
A	<i>Oenanthe oenanthe oenanthe</i>	Ma	Mm	Mm	Mm		
A	<i>Oenanthe oenanthe libanotica</i>	Re, Ma	Mm	Rr, Mm	Mm		
A	<i>Oenanthe isabellina</i> (monotípica)	A	-	-	-		
A	<i>Oenanthe deserti</i> ssp.	-	-	-	A		
A	<i>Oenanthe hispanica</i> (monotípica)	Me	Me	Me	Me		
A	<i>Oenanthe melanoleuca</i> (monotípica)	A	-	-	-		
A	<i>Oenanthe leucura leucura</i>	A	A	-	A		
PASSERIDAE							
A	<i>Passer domesticus balearoibericus</i>	R-Sa	R-Sa	R-Sa	R-Sa	F	
A	<i>Passer hispaniolensis</i>	<i>hispaniolensis</i>	A	-	-		
A	<i>Passer montanus montanus</i>	R-Sm, Mr	Mr	R-Se	-		
A	<i>Petronia petronia petronia</i>	R-Se	A	R-Sm	R-Sm		
A	<i>Montifringilla nivalis nivalis</i>	Hr	Hr	Hr	Hr		
ESTRIDIDAE							
C1	<i>Estrilda astrild</i> ssp.	R-Sr	-	R-Sr	-	Colonització a Mallorca 1996	
PRUNELLIDAE							
A	<i>Prunella collaris collaris</i>	He, Me	He	He, Mr	-		
A	<i>Prunella modularis modularis</i>	Hm, Mm	Hm, Mm	Hm, Me	Me		
A	<i>Prunella modularis mabbotti</i>	Hr, Mr	Hr, Mr	Hr, Mr	Mr		
MOTACILLIDAE							
A	<i>Motacilla flava cinereocapilla</i>	Mm	Mm	Mm	Mm	Cria esporàdica 2008 a Mallorca	
A	<i>Motacilla flava flava</i>	Ma	Mm	Ma	Mm		
A	<i>Motacilla flava flavissima</i>	Me	Me	Me	Me		
A	<i>Motacilla flava iberiae</i>	Rm, Ma	Mm	Rm, Ma	Rr, Mm		
A	<i>Motacilla flava thunbergi</i>	Me	Me	Me	Me		
A	<i>Motacilla flava feldegg</i>	A	-	-	-		
A	<i>Motacilla citreola citreola</i>	A	-	-	-		
A	<i>Motacilla cinerea cinerea</i>	Hm, Mm	He, Me	He, Me	Mr		
A	<i>Motacilla alba alba</i>	Ha, Ma	Ha, Ma	Ha, Ma	Ha, Ma		
A	<i>Motacilla alba yarrellii</i>	Hr, Mr	Hr, Mr	Hr, Mr	Hr, Mr		
A	<i>Anthus richardi</i> ssp.	Hr, Mr	Mr	-	-		
A	<i>Anthus campestris campestris</i>	Rm, Mm	Rm, Mm	Re, Me	Re, Mm		
A	<i>Anthus pratensis pratensis</i>	Ha, Ma	Ha, Ma	Ha, Mm	Ha, Mr		
A	<i>Anthus trivialis trivialis</i>	Mm	Mm	Mm	Mm		
A	<i>Anthus hodgsoni yunnanensis</i>	D	-	-	-		
A	<i>Anthus cervinus</i> (monotípica)	Mr	Mr	Mr	-		
A	<i>Anthus spinoletta spinoletta</i>	Hm, Me	He, Me	He, Me	He		
A	<i>Anthus petrosus littoralis</i>	A	-	-	-		
FRINGILLIDAE							
A	<i>Fringilla coelebs coelebs</i>	R-Sa, Ha, Ma	R-Sm, Mm	Ha, Mm	Hm, Mm		
A	<i>Fringilla montifringilla</i> (monotípica)	He, Me	He, Me	Hr	Hr		
A	<i>Coccothraustes coccothraustes coccothraustes</i>	Hm, Me	He, Me	Hr, Mr	Mr		
A	<i>Pyrrhula pyrrhula iberiae</i>	Hr	Hr	-	Hr		
A	<i>Bucanetes githagineus zedlitzii</i>	A	A	-	-		
A	<i>Carpodacus erythrinus erythrinus</i>	Mr	Mr	Mr	Mr		
A	<i>Chloris chloris chloris</i>	He, Me	He, Me	He	He		
A	<i>Chloris chloris aurantiiventris</i>	R-Sa, He, Me	R-Sm, Hm, Mm	R-Sa, Hm	R-Se		
A	<i>Linaria cannabina cannabina</i>	He, Me	Hm, Mm	-	-		
A	<i>Linaria cannabina mediterranea</i>	R-Sa	R-Sm	R-Sa	R-Sm		
A	<i>Acanthis flammea flammea</i>	A	A	-	-		
A	<i>Loxia curvirostra curvirostra</i>	A	A	A	A		
A	<i>Loxia curvirostra balearica</i>	R-Sa	A	R-Sm,	A		
A	<i>Carduelis carduelis parva</i>	R-Sa	R-Sa	R-Sa	R-Sm		
A	<i>Carduelis carduelis carduelis</i>	He, Me	Hm, Mm	Hm, Mm	-		
A	<i>Carduelis citrinella</i>	A	A	-	-		
A	<i>Serinus serinus</i> (monotípica)	R-Sa, He, Me	He, Me	R-Sa, Ha, Me	R-Sa		
A	<i>Spinus spinus</i> (monotípica)	Hm, Mm	He, Me	Hm, Me	He, Me		
						Cria esporàdica 1996 i 98 a Cabrera	
						Cria esporàdica 1980 a Mallorca	

Cat. Espècie	Estatus				Observacions
	Mallorca	Menorca	Eivissa	Formentera	
CALCARIIDAE					
A <i>Calcarius lapponicus lapponicus</i>	A	-	-	-	
A <i>Plectrophenax nivalis nivalis</i>	Hr, Mr	Mr	Hr	-	
EMBERIZIDAE					
A <i>Emberiza calandra calandra</i>	R-Sa	R-Sa	R-Sm	R-Se, Me	
A <i>Emberiza citrinella citrinella</i>	Hr, Mr	A	A	-	
A <i>Emberiza leucocephalos leucocephalos</i>	A	-	-	-	
A <i>Emberiza cia cia</i>	Hr, Mr	Hr, Mr	-	Hr, Mr	
A <i>Emberiza hortolana</i> (monotípica)	Me	Me	Mr	Me	
A <i>Emberiza caesia</i> (monotípica)	A	-	-	-	
A <i>Emberiza cirius</i> (monotípica)	R-Sm	A	R-Se	-	
A <i>Emberiza pusilla</i> (monotípica)	Mr	Mr	-	Mr	
A <i>Emberiza rustica rustica</i>	-	A	-	-	
A <i>Emberiza aureola aureola</i>	A	-	-	-	
A <i>Emberiza melanocephala</i> (monot.)	A	-	-	-	
A <i>Emberiza schoeniclus schoeniclus</i>	Hm, Mm	He, Me	He, Mr	Mr	
A <i>Emberiza schoeniclus whitherbyi</i>	R-Se	He	Mr	-	

ANNEX 1: CATEGORIA D

Els taxons amb la categoria D no formen part pròpiament de la llista dels ocells de les Illes Balears.

Cat. Espècie		Estatus				Observacions
		Mallorca	Menorca	Eivissa	Formentera	
ANATIDAE						
D	<i>Anser caerulescens caerulescens</i>	D	-	-	-	
THRESKIORNITHIDAE						
D	<i>Platalea alba</i> (monotípica)	D	-	-	-	
PELECANIDAE						
D	<i>Pelecanus onocrotalus</i> (monotípica)	A	-	-	-	
D	<i>Pelecanus rufescens</i> (monotípica)	D	-	-	-	
FALCONIDAE						
D	<i>Falco rusticolus</i> (monotípica)	A	-	-	-	
CORVIDAE						
D	<i>Pica pica melanotos</i>	A	-	-	-	
PASSERIDAE						
D	<i>Passer italiae</i> (monotípica)	A	-	-	-	
FRINGILLIDAE						
D	<i>Rhodospiza obsoleta</i> (monotípica)	-	D	-	-	

ANNEX 2: CATEGORIA E

Els taxons amb la categoria E no formen part pròpiament de la llista dels ocells de les Illes Balears.

ANATIDAE		
E3	<i>Dendrocygna viidata</i> ssp.	
E3	<i>Dendrocygna autumnalis</i> (monotípica)	
E3	<i>Dendrocygna bicolor</i> (monotípica)	
E3	<i>Branta canadensis</i>	
E3	<i>Anser indicus</i>	
E3	<i>Anser anser</i> var. <i>domestica</i>	
E3	<i>Anser rossii</i>	
E3	<i>Anser caerulescens</i>	
E3	<i>Cygnus atratus</i>	
E3	<i>Cygnus olor</i>	
E2	<i>Alopochen aegyptiaca</i>	
E2	<i>Cairina moschata</i> var. <i>domestica</i>	
E3	<i>Aix sponsa</i>	
E3	<i>Aix galericulata</i>	
E3	<i>Espatula discors</i>	
E3	<i>Espatula cyanoptera</i>	
E3	<i>Anas platyrhynchos</i> var. <i>domestica</i>	
E3	<i>Anas bahamensis</i>	
E3	<i>Anas erythrorhyncha</i>	
E3	<i>Netta peposaca</i>	
E3	<i>Oxyura jamaicensis</i>	
ODONTOPHORIDAE		
E3	<i>Colinus virginianus</i>	
PHASIANIDAE		
E2	<i>Alectoris chukar</i>	
E3	<i>Alectoris barbara</i>	
E3	<i>Francolinus francolinus</i>	
E3	<i>Coturnix japonica</i>	
E3	<i>Gallus gallus</i> var. <i>domestica</i>	
E3	<i>Lophura nycthemera</i>	
E3	<i>Pavo cristatus</i> var. <i>domestica</i>	
PHOENICOPTERIDAE		
E3	<i>Phoeniconaias minor</i>	
CICONIIDAE		
E3	<i>Mycteria ibis</i>	
THRESKIORNITHIDAE		
E3	<i>Threskiornis aethiopicus</i>	
PELECANIDAE		
E3	<i>Pelecanus rufescens</i>	
ACCIPITRIDAE		
E3	<i>Gyps bengalensis</i>	
E3	<i>Sarcogyps calvus</i>	
E3	<i>Aquila chrysaetos</i>	
E3	<i>Accipiter gentilis</i>	
E3	<i>Parabuteo unicinctus harrisi</i>	
E3	<i>Geranoaetus melanoleucus</i>	
STRIGIDAE		
E3	<i>Glucidium minutissimum</i>	
FALCONIDAE		
E3	<i>Falco sparverius</i>	
E3	<i>Falco cherrug</i>	
PSITTACIDAE		
E3	<i>Psittacus erithacus</i>	
E3	<i>Poicephalus senegalus</i>	
E3	<i>Brotogeris pyrrhopterus</i>	
E3	<i>Amazona aestiva</i>	
E3	<i>Cyanoliseus patagonus</i>	
E3	<i>Aratinga nenday</i>	
E3	<i>Ara ararauna</i>	
E3	<i>Thectocercus acuticaudatus</i>	
E3	<i>Psittacara mitratus</i>	
E3	<i>Psittacara erythrogenys</i>	
E3	<i>Psittacara leucophthalmus</i>	
E3	<i>Melopsittacus undulatus</i> var. <i>domestica</i>	
E3	<i>Agapornis personatus</i>	
E3	<i>Agapornis roseicollis</i>	
CORVIDAE		
E3	<i>Coloeus monedula</i>	
E3	<i>Corvus albus</i>	
STURNIDAE		
E3	<i>Gracula religiosa</i>	
E2	<i>Acridotheres tristis</i>	
E3	<i>Lamprotornis chalybaeus</i>	
E3	<i>Lamprotornis chloropterus</i>	
E3	<i>Lamprotornis purpureus</i>	
PLOCEIDAE		
E3	<i>Ploceus cucullatus</i>	
E3	<i>Ploceus melanocephalus</i>	
E3	<i>Quelea quelea</i>	
E3	<i>Euplectes afer</i>	
E3	<i>Euplectes nigroventris</i>	
E3	<i>Euplectes hordeaceus</i>	
E3	<i>Euplectes orix</i>	
ESTRILDIDAE		
E3	<i>Amandava amandava</i>	
E3	<i>Taeniopygia guttata</i>	
VIDUIDAE		
E3	<i>Vidua macroura</i>	
FRINGILLIDAE		
E3	<i>Pyrrhula erythra</i>	
E3	<i>Crithagra mozambica</i>	
E3	<i>Serinus canaria</i> var. <i>domestica</i>	

ANNEX III: LLISTA DE RARESES

LLISTA DELS TAXONS SOTMESES A HOMOLOGACIÓ A
ESPANYA I LES ILLES BALEARS

Aquesta és la llista dels taxons considerats com a «rars» pel «Comité de Rarezas de la Sociedad Española de Ornitología» (CR-SEO/BirdLife), per al conjunt d'Espanya (Excepto Canarias, Ceuta y Melilla). A més el Comitè de Rareses del GOB-GEN-SOM considera una sèrie de taxons com «rareses regionals» per a les illes Balears. Llista actualizada en gener de 2022.

Les observacions relatives a aquestes espècies, hauran de ser estudiades pel comitè respectivament, el qual, basant-se en la qualitat de les descripcions aportades, emetrà dictàmens sobre la seva fiabilitat i procedirà a la seva publicació periòdica a la revista *Ardeola* o l'AOB respectivament.

Cada taxón esta determinado por una o varias categorías en la medida que cada una de sus citas lo establezca. La definición de estas categorías se resumen de la siguiente forma:

Categoria A: Espècies enregistrades en aparent estat natural almenys una vegada des de l'1 de gener de 1950. En (A) indica que no cuenta con ninguna cita homologada.

Categoria B: Espècies enregistrades en aparent estat natural almenys una vegada entre 1801 i el 31 de desembre de 1949 però no amb posterioritat. En (B) indica que no cuenta con ninguna cita homologada.

Categoria C: Espècies amb poblacions reproductores autosuficients (mínim d'uns 100 ex.) d'origen antròpic a l'àrea de referència o a països veïnats (espècies escapades i naturalitzades, introduïdes o reintroduïdes)

Categoria D: Espècies que es té la sospita que tots els registres corresponen a exemplars d'origen no natural ni naturalitzat, hi ha dubtes raonables sobre el seu origen natural.

Para facilitar su presentación al Comité de Rarezas existe una hoja estándar en Catalán, Español e Inglés en al web: rareresesornibalears.blogspot.com.es

A aquest efecte es consideren rareses a Espanya i rareses regionals a Balears (amb asterisc*), de forma provisional, els taxons que segueixen:

Categ	Espècies Espanya i Balears*	Categ	Espècies	Categ	Espècies
D	<i>Dendrocygna bicolor</i>	A	<i>Branta bernicla hrota</i>	A	<i>Anas rubripes</i>
D	<i>Dendrocygna viduata</i>	D	<i>Branta hutchinsii</i>	A	<i>Aythya collaris</i> *
A	<i>Cygnus olor</i> *	A, D	<i>Branta ruficollis</i>	A	<i>Aythya marila</i> *
A	<i>Cygnus columbianus</i>	D	<i>Aix sponsa</i>	A	<i>Aythya affinis</i>
A	<i>Cygnus cygnus</i>	A	<i>Tadorna ferruginea</i> *	A	<i>Somateria spectabilis</i>
A	<i>Anser fabalis</i>	D	<i>Spatula cyanoptera</i>	A	<i>Clangula hyemalis</i> *
A	<i>Anser albifrons</i> *	A	<i>Spatula discors</i>	A	<i>Melanitta nigra</i> *
A	<i>Anser albifrons flavirostris</i>	A	<i>Anas americana</i>	A	<i>Melanitta americana</i>
C5, D	<i>Anser erythropus</i>	A, D	<i>Anas falcata</i>	A	<i>Melanitta perspicillata</i>
A, D	<i>Anser caerulescens</i>	A, D	<i>Anas formosa</i>	(A)	<i>Melanitta fusca</i> *
A	<i>Branta leucopsis</i> *	A	<i>Anas carolinensis</i>	A	<i>Melanitta deglandi</i>

Categ	Espècies Espanya i Balears*	Categ	Espècies	Categ	Espècies
A, D	<i>Bucephala albeola</i>	A, D	<i>Geronticus eremita</i>	A	<i>Calidris fuscicollis</i>
A	<i>Bucephala islandica</i>	D	<i>Platalea alba</i>	A	<i>Calidris minutilla</i>
A	<i>Bucephala clangula</i>	A	<i>Elanoides forficatus</i>	A	<i>Calidris subruficollis*</i>
A	<i>Mergellus albellus</i>	A	<i>Haliaeetus albicilla</i>	A	<i>Calidris melanotos*</i>
A, D	<i>Mergus cucullatus</i>	D	<i>Necrosyrtes monachus</i>	A	<i>Calidris mauri</i>
A	<i>Mergellus merganser</i>	A	<i>Gyps africanus</i>	A	<i>Calidris pusilla</i>
A	<i>Gavia stellata*</i>	A	<i>Terathopus ecaudatus</i>	A	<i>Phalaropus lobatus*</i>
A	<i>Gavia arctica*</i>	A	<i>Circus macrourus*</i>	A	<i>Phalaropus tricolor</i>
A	<i>Gavia pacifica</i>	A	<i>Accipiter gentilis*</i>	A	<i>Xenus cinereus</i>
(B)	<i>Gavia immer*</i>	A	<i>Buteo buteo vulpinus</i>	A	<i>Actitis macularius</i>
A	<i>Podylimbus podiceps</i>	A	<i>Buteo rufinus</i>	A	<i>Tringa solitaria</i>
A	<i>Podiceps grisegena</i>	A	<i>Buteo lagopus</i>	A	<i>Tringa melanoleuca</i>
(A)	<i>Podiceps auritus*</i>	A	<i>Clanga pomarina</i>	A	<i>Tringa flavipes</i>
A	<i>Thalassarche melanophris</i>	A	<i>Aquila clanga</i>	A	<i>Limnodromus griseus</i>
C4	<i>Phoeniconaias minor*</i>	A	<i>Aquila nipalensis</i>	A	<i>Limnodromus scolopaceus</i>
A	<i>Daption capense</i>	A	<i>Aquila heliaca</i>	A	<i>Gallinago delicata</i>
A	<i>Pterodroma madeira</i>	A	<i>Aquila chrysaetos*</i>	A	<i>Gallinago media</i>
A	<i>Pterodroma feae</i>	A, D	<i>Falco biarmicus</i>	(A)	<i>Turnix sylvaticus</i>
A	<i>Pterodroma hasitata</i>	A	<i>Falco cherrug</i>	A	<i>Otis tarda*</i>
A	<i>Bulweria bulwerii</i>	A	<i>Falco rusticolus</i>	A	<i>Cursorius cursor</i>
A	<i>Calonectris borealis*</i>	A	<i>Porzana carolina</i>	A	<i>Glareola nordmanni</i>
A	<i>Calonectris edwardsi</i>	A	<i>Zapornia pusilla*</i>	A	<i>Stercorarius pomarinus*</i>
A	<i>Ardenna gravis*</i>	A	<i>Zapornia parva*</i>	A	<i>Stercorarius parasiticus*</i>
A	<i>Puffinus baroli</i>	A	<i>Porzana marginalis</i>	A	<i>Stercorarius longicaudus*</i>
A	<i>Puffinus (baroli) boydi</i>	A	<i>Crex egregia</i>	A	<i>Stercorarius maccormicki</i>
A	<i>Pelagodroma marina</i>	A	<i>Crex crex</i>	A	<i>Uria aalge*</i>
A	<i>Fregetta tropica</i>	A	<i>Gallinula angulata</i>	A	<i>Cephus grylle</i>
(A)	<i>Oceanites oceanicus*</i>	A	<i>Porphyrio alleni</i>	A	<i>Alle alle</i>
A	<i>Hydrobates leucorhous*</i>	A	<i>Porphyrio martinicus</i>	A	<i>Onychoprion fuscatus</i>
A	<i>Hydrobates monorhis</i>	A	<i>Porphyrio porphyrio mada-gascarensis</i>	A	<i>Onychoprion anaethetus</i>
A	<i>Oceanodroma castro</i>	A	<i>Fulica americana</i>	A	<i>Sterna elegans</i>
A	<i>Phaeton aethereus</i>	A	<i>Grus canadensis</i>	A	<i>Sterna maxima</i>
A	<i>Sula sula</i>	(B), D	<i>Grus virgo</i>	A	<i>Thalasseus bengalensis*</i>
A	<i>Sula dactylatra</i>	(B), D	<i>Pluvianus aegyptius</i>	A	<i>Thalasseus elegans</i>
A	<i>Sula leucogaster</i>	A	<i>Pluvialis fulva</i>	A	<i>Sterna forsteri</i>
A	<i>Phalacrocorax auritus</i>	A	<i>Pluvialis dominica</i>	(A)	<i>Sterna dougallii*</i>
A	<i>Phalacrocorax pygmeus</i>	A	<i>Vanellus gregarius</i>	A	<i>Rhodostethia rosea</i>
D	<i>Phalacrocorax africanus</i>	A	<i>Charadrius semipalmatus</i>	A	<i>Croicocephalus philadelphia</i>
A, D	<i>Pelecanus onocrotalus</i>	A	<i>Charadrius vociferus</i>	A	<i>Croicocephalus cirrocephalus</i>
A, D	<i>Pelecanus rufescens</i>	A	<i>Charadrius pecuarius</i>	A	<i>Larus atricilla</i>
D	<i>Pelecanus crispus</i>	A	<i>Charadrius mongolus</i>	A	<i>Larus pipixcan</i>
A	<i>Fregata magnificens</i>	A	<i>Charadrius leschenaultii</i>	A	<i>Larus ichthyaetus</i>
A	<i>Botaurus lentiginosus</i>	A	<i>Bartramia longicauda</i>	A	<i>Larus dominicanus</i>
A	<i>Ixobrychus sturmi</i>	A	<i>Numenius hudsonicus</i>	A	<i>Larus canus*</i>
A	<i>Butorides virescens</i>	(B)	<i>Numenius tenuirostris</i>	A	<i>Larus fuscus fuscus</i>
A	<i>Egretta tricolor</i>	A	<i>Calidris acuminata</i>	A	<i>Larus argentatus*</i>
A	<i>Egretta gularis</i>	A	<i>Calidris himantopus</i>	A	<i>Larus cachinnans*</i>
A	<i>Egretta gularis x garzetta*</i>	A	<i>Calidris ruficollis</i>	A	<i>Larus michahellis atlantis</i>
A	<i>Ardea herodias</i>	A	<i>Calidris falcinellus</i>	A	<i>Larus smithsonianus</i>
D	<i>Mycteria ibis</i>	A	<i>Calidris maritima*</i>	A	<i>Larus glaucescens</i>
A, D	<i>Leptoptilos crumeniferus</i>	A	<i>Calidris bairdii</i>	A	<i>Larus thayeri</i>

Categ	Espècies Espanya i Balears*	Categ	Espècies	Categ	Espècies
A	<i>Larus glaucoideus kumlieni</i>	A	<i>Oenanthe oenanthe seebohmi</i>	A	<i>Lanius meridionalis*</i>
A	<i>Larus marinus*</i>			A	<i>Lanius meridionalis pallidirostris</i>
A	<i>Columba oenas*</i>	A	<i>Oenanthe hispanica melanoleuca</i>	A	<i>Lanius senator niloticus</i>
A	<i>Streptopelia orientalis</i>	A	<i>Oenanthe deserti</i>	A	<i>Lanius nubicus</i>
A, D	<i>Spilopelia senegalensis</i>	A	<i>Oenanthe leucopyga</i>	D	<i>Pica pica*</i>
D	<i>Oena capensis</i>	(A)	<i>Oenanthe leucura*</i>	A	<i>Nucifraga caryocatactes</i>
D	<i>Zenaidra macroura</i>	B	<i>Zoothera dauma</i>	(A)	<i>Garrulus glandarius*</i>
A	<i>Coccyzus americanus</i>	A	<i>Turdus obscurus</i>	(A)	<i>Pyrrhocorax graculus*</i>
B	<i>Sumia ulula</i>	A	<i>Turdus naumanni</i>	A	<i>Corvus monedula*</i>
A	<i>Athene noctua*</i>	A	<i>Turdus migratorius</i>	A	<i>Corvus monedula monedula</i>
A	<i>Asio capensis</i>	A	<i>Locustella fluviatilis</i>	(A)	<i>Corvus frugilegus*</i>
A	<i>Caprimulgus ruficollis*</i>	A	<i>Iduna caligata</i>	(A)	<i>Corvus corone*</i>
A	<i>Caprimulgus aegyptius</i>	A	<i>Iduna opaca*</i>	A, D	<i>Corvus cornix</i>
A	<i>Chordeiles minor</i>	A	<i>Iduna pallida</i>	D	<i>Corvus albus</i>
A	<i>Chaetura pelagica</i>	(A)	<i>Acrocephalus paludicola*</i>	D	<i>Corvus ruficollis</i>
A	<i>Megascops alcyon</i>	A	<i>Acrocephalus agricola</i>	A	<i>Pastor roseus</i>
A	<i>Merops persicus</i>	A	<i>Acrocephalus dumetorum</i>	D	<i>Passer italiae</i>
A	<i>Coracias abyssinicus</i>	A	<i>Acrocephalus palustris</i>	A	<i>Passer hispaniolensis*</i>
(A)	<i>Picus sharpei*</i>	A	<i>Acrocephalus palustris</i>	A	<i>Montifringilla nivalis*</i>
A	<i>Picus vaillantii</i>	A	<i>Curruca nisoria</i>	A	<i>Vireo olivaceus</i>
(A)	<i>Dendrocopos major*</i>	A	<i>Curruca curruca</i>	A	<i>Fringilla coelebs africana</i>
A	<i>Dryobates minor*</i>	A	<i>Curruca hortensis*</i>	A	<i>Carduelis citrinella*</i>
A	<i>Ammomanes cinctura</i>	A	<i>Curruca deserti</i>	A	<i>Carduelis flavirostris</i>
A	<i>Alaemon alaudipes</i>	A	<i>Curruca nana</i>	A	<i>Carduelis flammea</i>
A	<i>Eremophila alpestris</i>	A	<i>Curruca deserticola</i>	D	<i>Rhodospiza obsoleta</i>
A	<i>Melanocorypha bimaculata</i>	A	<i>Curruca cantillans cantillans/albistriata</i>	A	<i>Bucanetes githagineus*</i>
A	<i>Melanocorypha calandra*</i>	A	<i>Curruca sarda</i>	A	<i>Carpodacus erythrinus</i>
A	<i>Calandrella rufescens*</i>	A	<i>Phylloscopus trochiloides</i>	A	<i>Pyrrhula pyrrhula*</i>
A	<i>Lullula arborea*</i>	A	<i>Phylloscopus borealis</i>	A	<i>Mniotilta varia</i>
A	<i>Anthus richardi*</i>	A	<i>Phylloscopus proregulus</i>	A	<i>Setophaga coronata</i>
A	<i>Anthus godlewskii</i>	A	<i>Phylloscopus inornatus*</i>	A	<i>Parkesia noveboracensis</i>
A	<i>Anthus hodgsoni</i>	A	<i>Phylloscopus humei</i>	A	<i>Geothlypis trichas</i>
A	<i>Anthus rubescens</i>	A	<i>Phylloscopus schwarzi</i>	A	<i>Melospiza melodia</i>
A	<i>Anthus petrosus*</i>	A	<i>Phylloscopus fuscatus</i>	A	<i>Calcarius lapponicus</i>
A	<i>Motacilla flava feldegg</i>	A	<i>Phylloscopus collybita tristis</i>	A	<i>Plectrophenax nivalis*</i>
A	<i>Motacilla alba subpersonata</i>	A	<i>Phylloscopus borealis</i>	D	<i>Emberiza cioides</i>
A	<i>Motacilla citreola*</i>	A	<i>Ficedula parva</i>	A	<i>Emberiza leucocephalus</i>
D	<i>Pycnonotus barbatus</i>	A	<i>Ficedula semitorquata</i>	A	<i>Emberiza citrinella*</i>
A	<i>Bombycilla garrulus</i>	A	<i>Ficedula albicollis</i>	A	<i>Emberiza cia*</i>
D	<i>Mimus polyglottos</i>	A	<i>Ficedula albicollis x hypoleuca</i>	A, D	<i>Emberiza sahari</i>
D	<i>Mimus gilvus</i>	D	<i>Cyanistes teneriffae</i>	A	<i>Emberiza caesia</i>
A	<i>Dumetella carolinensis</i>	A	<i>Parus ater*</i>	A	<i>Emberiza rustica</i>
A	<i>Cercotrichas galactotes*</i>	A	<i>Tichodroma muraria*</i>	A	<i>Emberiza pusilla</i>
A	<i>Muscicapa tyrrenica tyrrenica</i>	(A)	<i>Certhia brachydactyla*</i>	A	<i>Emberiza aureola</i>
A	<i>Larivora cyane</i>	A	<i>Tchagra senegalus</i>	A, D	<i>Emberiza bruniceps</i>
A	<i>Tarsiger cyanurus</i>	A	<i>Lanius cristatus</i>	A	<i>Emberiza melanocephala</i>
A	<i>Phoenicurus ochruros phoenicuroides</i>	A	<i>Lanius isabellinus</i>	A	<i>Dolichonyx oryzivorus</i>
A	<i>Phoenicurus moussieri</i>	A	<i>Lanius collurio*</i>		
A	<i>Saxicola maurus</i>	(A)	<i>Lanius minor*</i>		
A	<i>Oenanthe isabellina</i>	A	<i>Lanius excubitor</i>		

NORMES DE PUBLICACIÓ

A l'*ANUARI ORNITOLÒGIC DE LES BALEARS* es publiquen articles de recerca sobre qualsevol aspecte de l'ornitologia, notes breus i dades d'observació. El termini per al lliurament dels originals acaba el 30 d'abril; no es garanteix la presa en consideració dels materials lliurats amb posterioritat a aquesta data.

ARTICLES

- Se recomana l'enviament dels treballs en qualsevol soport informàtic.
- L'extensió màxima d'un article serà de 16 pàgines, incloent-hi text, resums, bibliografia, taules i figures. S'evitarà al màxim la inclusió de notes a peu de pàgina.
- S'acceptaran originals en català, castellà o anglès.
- En el titular i a la primera menció que es faci d'una espècie dins el text, s'hi indicaran tant el nom popular com el científic, per aquest ordre.
- S'inclourà un resum breu (trenta línies d'extensió màxima), acompanyat (optativament) d'una traducció fidel del resum a l'anglès.
- Paraules clau, se n'elegiran sis com a màxim, que orientin sobre el contingut del treball. S'aconsella seguir l'ordre següent: nom comú, nom llatí, tema del treball i àrea geogràfica.
- La bibliografia recollida al final del treball seguirà la pauta definida en el present volum, i únicament inclourà els treballs que han estat esmentats en el text.
- Les taules i figures hauran de ser esmentades en el text, i s'indica el lloc més adient per intercalar-les.
- Les fotografies seran en color o en blanc i negre, i s'indica el nom dels autors.

NOTES BREUS

- L'extensió màxima serà de 3 pàgines.
- S'inclourà un resum breu (quinze línies d'extensió màxima), acompanyat (optativament) d'una traducció fidel del resum a l'anglès.
- Paraules clau, sis com a màxim.

REGISTRES ORNITOLÒGICS

- S'admeten dades sobre observacions rellevants sobre l'avifauna balear, encara que també es publiquen registres d'anys anteriors, si l'interès ho justifica. Les observacions que s'enviïn han d'incloure els aspectes següents:
 - Nom científic de l'espècie, és preferible que la llista d'espècies s'ordini sistemàticament segons el model usat en el present Anuari.
 - Localitat (terme municipal) en què es va realitzar l'observació.
 - Data o període del registre.
 - Nombre d'exemplars observats i, si és possible, el sexe i l'edat.
 - Circumstàncies que acompanyaren l'observació.
 - Nom dels observadors i, almenys, una adreça i un telèfon de contacte.
 - S'agraeix un comentari breu de l'interès del registre, com: presència rara a la zona, dates extremes en reproducció, hivernada i pas migratori, concentracions notables d'aus, albiraments inusuals, etc. Para facilitar su tramitación ver <https://citau.gobmallorca.com/index.php>
 - En el cas d'observacions d'espècies rares (vegeu l'Annex III), han de seguir els punts anteriors i afegir-hi una descripció de l'au, les dades se sotmetran, si escau, al dictamen del Comitè de Rareses de la SEO o del GOB <http://rareresesornibalears.blogspot.com.es/>.

FITXA D'OBSERVACIÓ

Per tal de facilitar la recopilació i tramitació de les observacions d'aus, existeix una fitxa model en la qual es poden anotar totes les dades sobre l'espècie de forma ordenada i, així, s'evita oblidar informació útil, aquesta fitxa la podeu trobar a la pàgina web www.gobmallorca.com. No és imprescindible usar aquesta fitxa a l'hora de tramitar els registres, però pot servir de guia orientativa.

INSTRUCTIONS FOR PUBLICATION

The *ANUARI ORNITOLÒGIC DE LES BALEARS* publishes articles about research on all aspects of ornithology, short notes and bird records. The deadline for submission of originals is the 30th April; publication of papers submitted after this date cannot be guaranteed.

ARTICLES

- It is advisable on disquette in order to shorten publication procedures.
- The length of the paper should not exceed 16 pages, including text, summaries, reference list, tables and figures.
- Papers will be accepted in Catalan, Spanish or English.
- In the title and the first time that a species is mentioned in the text, both the common name and the Latin name (in this order) should be mentioned.
- A short summary (with a maximum of 30 lines) should be submitted, together with a translation into English (optional).
- Key words: no more than six key words should be used. They must be informative of the main contents of the paper. The following order is recommended: vernacular name, scientific name, general subject, and geographical area.
- The reference list attached to the end of the paper should follow the same format as in this volume, and it should only contain publications cited in the text.
- Tables and figures must be cited in the text, and the author should give an indication of desired location for their insertion in the text.
- Photographs should be in colour or black and white, mentioning the name of the photographer or their source.

SHORT NOTES

- The length should not exceed three pages.
- A short summary (with a maximum of 15 lines) should be submitted, together with a translation into English (optional).
- Key words: no more than six key words should be used.

BIRD RECORDS

- We accept data of sightings that are related to the Balearic Islands, although we also publish records from past years if there are of any special interest. The records should include:
 - Scientific name of the species, it is preferable that the list of species are in a systematic order according to the example used in this years Anuario.
 - Location (municipal area) of the sighting.
 - Date or season.
 - Number of birds observed, and if possible sex and age.
 - Circumstances of the sighting.
 - Name and if possible address and telephone.
 - A brief commentary would be appreciated concerning: rarity in the zone, breeding dates, wintering and migration passages, large concentration of birds.
 - In the case of a rarity (see Anex III) one should follow the above points and add a description of the bird. This record will be submitted to the Rarities Committee.

SIGHTING FILE

To facilitate the compilation and processing of sightings, there is a standard file where all the data can be taken down in a orderly way, preventing useful data to be forgotten, you can find this file on the web page www.gobmallorca.com . It is no necessary to use this file, but it can be used as a guide.

ÍNDIX DE GÈNERES, ESPÈCIES, SUBESPÈCIES I NOMS COMUNS

Es presenten els noms científics i comuns dels ocells de la llista sistemàtica i rareses, i també dels cetacis.

A

- Abejaruco común 167
 Abejaruco papirrojo 167
 Abejero europeo 152
 Abellerol 167
 Abellerol gola-roig 167
 Abubilla 165
Acanthis flammea 232
Accipiter nisus 156
 Acentor alpino 220
 Acentor común 220
Acrocephalus arundinaceus 193
Acrocephalus dumetorum 194
Acrocephalus melanopogon 193
Acrocephalus paludicola 193
Acrocephalus palustris 194
Acrocephalus schoenobaenus 193
Acrocephalus scirpaceus 194
Actitis hypoleucos 109
Aegithalos caudatus 188
Aegypius monachus 154
 African Spoonbill 143
 Agachadiza chica 107
 Agachadiza común 108
 Agachadiza real 108
 Agapornis de Namíbia 240
Agapornis roseicollis 240
 Agró blanc 144
 Agró blanc gros 146
 Agró blau 148
 Agró d'escull 146
 Agró roig 150
 Àguila calçada 155
 Àguila calzada 155
 Àguila coabarrada 156
 Àguila cridanera 154
 Àguila culebrera 154
 Àguila de Bonelli 156
 Àguila marcenca 154
 Àguila moteada 154
 Àguila peixatera, 151
 Àguila pescadora 151
 Àguila pomerana 154
 Àguila pomerània 154
 Àguila real 155, 240
 Àguila reial 155, 240
 Aguilucho cenizo 159
 Aguilucho lagunero 157
 Aguilucho pàlido 158
 Aguilucho papialbo 47, 159
 Aguja colinegra 106
 Aguja colipinta 106
 Agujeta escolopàcea 106
 Aix galericulata 239
 Alaemon alaudipes 178
 Alauda arvensis 178
 Alaudala rufescens 181
 Alca 133
 Alca torda 133
 Alcaraván 95
 Alcatraz 138
 Alcaudón chico 176
 Alcaudón común 174, 175
 Alcaudón común del Mediterràneo 175
 Alcaudón dorsirrojo 175
 Alcaudón isabel 176
 Alcaudón núbico 176
 Alcaudón real 176
 Alcaudón real ibérico 174
 Alcedo atthis 166
 Alcotán 172
 Alektoris rufa 80
 Aligot de Harris 240
 Aligot vesper 152
 Alimoche 152
 Allen's Gallinule 89
 Alondra común 178
 Alondra ibis 178
 Alosa 178
 Alpine Accentor 220
 Alpine Chough 176
 Alpine Swift 81
 Alzacola 207
 American Golden Plover 100
 Ammomanes cinctura 178
 Ànade azulón 71
 Ànade friso 69
 Ànade gargantillo 239
 Ànade rabudo 72
 Ànade silbón 70
 Anarhynchus alexandrinus 104
 Anas acuta 72
 Anas bahamensis 239
 Anas crecca 73
 Anas platyrhynchos 71
 Andarríos bastardo 112
 Andarríos chico 109
 Andarríos de Terek 108
 Andarríos grande 110
 Àneda griseta 69
 Ànnera blanca 65
 Ànnera canyella 67
 Ànnera capblanca 79
 Ànnera d'ulls grocs 78
 Ànnera de les Bahames 239
 Ànnera fosca 78
 Ànnera glacial 78
 Ànnera mandarina 239
 Ànnera muda 239
 Ànnera negra 78
 Ànnera peixatera 78
 Anser campestre 64
 Anser careto chico 64
 Anser careto. 64
 Ànsar común 238
 Anser común 64
 Anser albifrons. 64

Anser anser 64, 238
Anser cisne 238
Anser cygnoides 238
Anser erythropus 64
Anser fabalis 64
Anthus campestris 226
Anthus cervinus 229
Anthus hodgsoni 228
Anthus petrosus 229
Anthus pratensis 226
Anthus richardi 226
Anthus richardi 58
Anthus spinoletta 229
Anthus trivialis 227
Apus apus 81
Apus pallidus 82
Aquatic Warbler 193
Aquila chrysaetos 155, 240
Aquila fasciata 156
Ara ararauna 240
Arao comú 133
Archibebe claro 114
Archibebe comú 113
Archibebe fino 112
Archibebe oscuro 114
Archibebe patigualdo chico 113
Archibebe patigualdo grande 115
Arctic Warbler 193
Ardea alba 146
Ardea cinerea 148
Ardea ibis 147
Ardea purpurea 150
Ardenna gravis 136
Ardeola ralloides 146
Arenaria interpres 115
Arner 166
Arpella 157
Arpella cendrosa 159
Arpella pàl·lida 158
Arpella pàl·lida russa 47
Arpella russa 159
Arrendajo 174
Asio flammeus 165
Asio otus 164
Astor 157

Astur gentilis 157
Athene noctua Miula.
Atlantic Puffin 133
Audouin's Gull 127
Autillo 164
Avefría 103
Avetorillo 143
Avetoro 143
Avión comú 185
Avión roquero 182
Avión zapador 181
Avisador 96
Avoceta 98
Avutarda comú 91
Aythya affinis 78
Aythya collaris 77
Aythya ferina 75, 76
Aythya fuligula 77
Aythya marila 78
Aythya nyroca 77
Azor 157

B

Baikal Teal 239
Baillon's Crake 47, 90
Baird's Sandpiper 120
Balearic Shearwater 137
Balearic Warble 201
Bar-tailed Godwit 106
Bar-tailed Lark 178
Barn Swallow 182
Barnacle cariblanca 64
Barnacle Goose 64
Barred Warbler 197
Bataillaire 116
Bec d'alena 98
Bec de corall 220
Bec planer 142
Bec planer africà 143
Becassineta 110
Becvermell 75
Bimaculated Lark 180
Bisbita arbóreo 227
Bisbita campestre 226
Bisbita comú 226
Bisbita de Hodgson 228
Bisbita de Richard 58, 226
Bisbita gorgirrojo 229

Bisbita ribereño alpino 229
Bisbita ribereño costero 229
Bitó 143
Black Kite 161
Black Redstart 213
Black Stork 138
Black Swan 238
Black Tern 123
Black Wheatear 218
Black-crowned Night Heron 144
Black-headed Bunting 237
Black-headed Gull 126
Black-legged Kittiwake 126
Black-necked Grebe 93
Black-tailed Godwit 106
Black-throated Loon 134
Black-winged Pratincole 121
Black-winged Stilt 96
Blaveta 210
Blue Rock Thrush 215
Blue-and-yellow macaw 240
Blue-cheeked Bee-eater 167
Blue-winged Teal 67
Bluethroat 210
Blyth's Reed Warbler 194
Bonelli's Eagle 156
Booted Eagle 155
Booted Warbler 194
Boscaler 195
Boscaler pintat 195
Boscarla de Blyth 194
Botaurus minutus 143
Botaurus stellaris 143
Botxí meridiona 174
Botxí septentrional 176
Brambling 230
Branta leucopsis 64
Broad-billed Sandpiper 116, 117
Brown Booby 139

Bucanetes githagineus 231
Bucanetes githagineus 58
 Bucephala clangula 78
 Buff-breasted Sandpiper 121
 Búho chico 164
 Buitre leonado 153
 Buitre negro 154
 Buitrón 195
 Burhinus oedicnemus 95
 Busardo de Harris 240
 Buscarla d'aigua 193
 Buscarla de canyar 194
 Buscarla dels joncs 193
 Buscarla grossa 193
 Buscarla menjamoscards 194
 Buscarla mostatxuda 193
 Buscarla pintoja 195
 Buscarla unicolor 195
 Busqueret coallarg 201
 Busqueret de batzer 199
 Busqueret de capell 196
 Busqueret de capnegre 197
 Busqueret de garriga 198, 199
 Busqueret de garriga tirrènica 198
 Busqueret emmascarat 197
 Busqueret esparverenc 197
Busqueret garriguer 56
 Busqueret gros 196
 Busqueret roig 200
 Busqueret sard 200
 Busqueret trencamates 200
 Busqueret xerraire 197
 Busqueta 195
 Busqueta asiàtica 194
 Busqueta icterina 195
 Busqueta pàl·lida 194
 Buteo buteo 163
 Butxaqueta 195

C

Cabot 185
 Cabot de roca 182
 Cabot de vorera 181
 Cabussó gros 46, 134
 Cabussonera 93
 Cacatua de les nimfes 240
 Cacatúa ninfa 240
 Cadafet 133
 Cadernera 233
 Cairina moschata 239
 Calàbria agulla 134
 Calàbria petita 134
 Calamón 89
 Calamoncillo africano 89
 Calandra Lark 180
 Calandrella brachydactyla 180
 Calandria 180
 Calàndria 180
 Calandria bimaculada 180
 Calàndria oriental 180
 Calcarius lapponicus 234
 Calidris alba 118
 Calidris alpina 119
 Calidris bairdii 120
 Calidris canutus 116
 Calidris falcinellus 116, 117
 Calidris ferruginea 116, 117
 Calidris fuscicollis 120
 Calidris himantopus 116, 117
 Calidris maritima 119
Calidris melanotos 49, 121
 Calidris minuta 120
 Calidris pugnax 116
 Calidris subruficollis 121
 Calidris temminckii 118
Calonectris borealis 46, 135
 Calonectris diomedea 135
 Cama-roja 113
 Cama-roja pintada 114
 Camachuelo carminoso 231

Camachuelo común 231
 Camachuelo trompetero 231
 Camachuelo trompetero 58
 Camagroga 113
 Camagroga grossa 115
 Camaverda 114
 Camaverda menuda 112
 Canastera 121
 Canastera alinegra 121
 Caprimulgus europaeus 80
Caprimulgus ruficollis 49, 80
 Capsigrany 174, 175
 Capsigrany balear 175
 Capsigrany emmascarat 176
 Capsigrany pàl·lid 176
 Capsigrany reial 176
 Capsigrany roig 175
 Carbonero balear 178
 Carbonero garrapinos 177
 Carduelis carduelis 233
 Carduelis citrinella 233
 Carpodacus erythrinus 231
 Carraca 166
 Carricerín cejudo 193
 Carricerín común 193
 Carricerín real 193
 Carricero común 194
 Carricero de Blyth 194
 Carricero poliglota 194
 Carricero tordal 193
 Carrion Crow 176
 Caspian Gull 129
 Caspian Tern 122
 Cecropis rufula 187
 Cega 107
 Cegall 108
 Cegall becllarg 106
 Cegall de mosson 106
 Cegall de mosson coabarrat 106
 Cegall menut 107
 Cegall reial 108
 Cerceta alizazul 67

- Cerceta carretona 67
 Cerceta común 73
 Cerceta del Baikal 239
 Cerceta pardilla 74
 Cercotrichas galactotes 207
 Cernícalo 169
 Cernícalo patirrojo 170
 Cernícalo primilla 169
 Cetla alablava 67
 Cetla blanca 67
 Cetla rossa 73
 Cetti's Warbler 188
 Cettia cetti 188
 Charadrius dubius 101
 Charadrius hiaticula 101
 Charrán bengalí 125
 Charrán común 124
 Charrán elegante 125
 Charrán patinegro 125
 Charrán rosado 124
 Charrancito 121
 Chibec peposaca 238
 Chlidonias hybrida 123
 Chlidonias leucopterus 124
 Chlidonias niger 123
 Chloris chloris 231
 Chocha perdiz 107
 Chochín 202
 Chorlito chico 101
 Chorlito grande 101
 Chorlito patinegro 104
 Chorlito carambolo 100
 Chorlito dorado 99
 Chorlito dorado americano 100
 Chorlito dorado siberiano 100
 Chorlito gris 99
 Chorlito sociable 103
 Chotacabras 80
 Chotacabras pardo 49, 80
 Chova piquigualda 176
 Chova piquirroja 176
 Chroicocephalus genei 126
 Chroicocephalus ridibundus 126
 Ciconia ciconia 138
 Ciconia nigra 138
 Cigne cantaire 65
 Cigne coscoraba 238
 Cigne mut 65
 Cigne negre 238
 Cigne petit 65
 Cigonya 138
 Cigonya negra 138
 Cigüeña blanca 138
 Cigüeña negra 138
 Cigüeñuela 96
 Cinereous Vulture 154
 Circaetus gallicus 154
 Circus aeruginosus 157
 Circus cyaneus 158
 Circus macrourus 47, 159
 Circus pygargus 159
 Cirl Bunting 236
 Cisne cantor 65
 Cisne chico 65
 Cisne común 65
 Cisne coscoraba 238
 Cisne negro 238
 Cisticola juncidis 195
 Citril Finch 233
 Citrine Wagtail 224
 Clamator glandarius 83
 Clanga clanga 154
 Clanga pomarina 154
 Clangula hyemalis 78
 Coa-roja 213
 Coa-roja de barraca 213
 Coa-roja diademada 214
 Coablanca 217, 218
 Coablanca del desert 218
 Coablanca pal·lida 218
 Coablanca ros 218
 Coablava 211
 Coadreta 207
 Coal Tit 177
 Coccothraustes coccothraustes 230
 Coccyzus americanus 83
 Cockatiel 240
 Codorniz 79
 Coer 72
 Cogujada montesina 179
 Colimbo ártico 134
 Colimbo chico 134
 Colimbo grande 134
 Colimbo grande 46
 Colirrojo diademado 214
 Colirrojo real 213
 Colirrojo tizón 213
 Collalba desértica 218
 Collalba gris 217
 Collalba gris 218
 Collalba isabel 218
 Collalba negra 218
 Collalba rubia occidental 218
 Collalba rubia oriental 218
 Collared Flycatcher 56, 212
 Collared Pratincole 121
 Collverd 71
 Coloeus monedul 176
 Colom salvatge 83
 Columba livia 83
 Columba oenas 84
 Columba palumbus 84
 Combatiente 116
 Common Blackbird 206
 Common Buttonquail 91
 Common Chaffinch 229, 230
 Common Chiffchaff 54, 191, 192
 Common Crane 90
 Common Cuckoo 83
 Common Eider 78
 Common Firecrest 201
 Common Goldeneye 78
 Common Grasshopper Warbler 195
 Common Greenshank 114
 Common Gull 49, 129
 Common House Martin 185
 Common Kestrel 169
 Common Kingfisher 166
 Common Linnet 232
 Common Moorhen 86
 Common Murre 133
 Common Nightingale 210

Common Pheasant 79	Correlimos pectoral 121	Cullerot 68
Common Pochard 75	Correlimos tridàctilo 118	Curlera cantaire 105
Common Quail 79	Correlimos zancolín 116, 117	Curlera reial 105
Common Redpoll 232	Correlimos zarapitín 116, 117	Curlew 105
Common Redshank 113	Correlimos pectoral 49	Curlew Sandpiper 116, 117
Common Redstart 213	Corriol becadell 116, 117	Curruca balear 201
Common Reed Bunting 237	Corriol becllarg 116, 117	Curruca balearica 201
Common Ringed Plover 101	Corriol camallarg 116, 117	Curruca cabecinegra 197
Common Rosefinch 231	Corriol coablanc 120	Curruca cantillans 56, 199
Common Sandpiper 109	Corriol de Baird 120	Curruca cantillans albistriata 199
Common Scoter 78	Corriol de Temminck 118	Curruca capirota 196
Common Shelduck 65	Corriol fosc 119	Curruca carrasqueña 56
Common Snipe 108	Corriol gros 116	Curruca carrasqueña occidental 198
Common Starling 202	Corriol menut 120	Curruca carrasqueña oriental 199
Common Swift 81	Corriol pectoral 49, 121	Curruca carrasqueña oriental 199
Common Tern 124	Corriol rorenc 121	Curruca communis 199
Common Waxbill 220	Corriol tres-dits 118	Curruca conspicillata 200
Common Whitethroat 199	Corriol variant 119	Curruca curruca 54, 197
Common Wood Pigeon 84	Corvus corax 177	Curruca de Moltoni/ Curruca carrasqueña 199
Coracias garrulus 166	Corvus cornix 177	Curruca gavilana 197
Corb 177	Corvus corone 176	Curruca hortensis 197
Corb marí 141	Corvus frugilegus 176	Curruca iberiae 198
Corb marí gros 139	Cory's Shearwater 46, 135	Curruca melanocephala 197
Cormorán grande 139	Coscoroba coscoroba 238	Curruca mirlona 197
Cormorán moñudo mediterráneo 141	Coscoroba Swan 238	Curruca mosquitera 196
Corn Bunting 235	Cotoliu 178	Curruca nisoria 197
Corn Crake 86	Cotorra argentina 173	Curruca rabilara 200
Corneja cenicienta 177	Cotorra de cap gris 173	Curruca sarda 200
Corneja negra 176	Cotorra de Kramer 173	Curruca subalpina 198
Cornella emmantellada 177	Coturnix coturnix 79	Curruca subalpina/ cantillans 199
Cornella negra 176	Cream-colored Courser 121	Curruca tarrénica 198
Corredor 121	Crested Coot 89	Curruca tomillera 200
Corredor sahariano 121	Cretzschmar's Bunting 236	Curruca undata 200
Correlimos canelo 121	Crex crex 86	Curruca zarcera 199
Correlimos común 119	Críalo 83	Curruca zarcerilla 197
Correlimos culiblanco 120	Cuclillo piquigualdo 83	Cursorius cursor 121
Correlimos de Baird 120	Cuco 83	Cyanistes caeruleus balearicus 177
Correlimos de Temminck 118	Cucui 83	Cygnus atratus 238
Correlimos Falcinelo 116, 117	Cucui becroc 83	Cygnus columbianus 65
Correlimos gordo 116	Cucui reial 83	
Correlimos menudo 120	Cucullada 179	
Correlimos oscuro 119	Cuculus canorus 83	
	Cuervo 177	

Cygnus cygnus. 65
Cygnus olor 65

D

Dartford Warbler 200
Delichon urbicum 185
Dendrocopos major 168
Desert Wheatear 218
Dryobates minor 168
Dunlin 119
Dunnock 220
Durbec 230
Dusky Warbler 52, 190

E

Eastern Black-eared
Wheatear 218
Eastern Subalpine
Warbler 199
Eastern Subalpine
Warbler 199
Eastern Subalpine War-
bler 56
Eastern Yellow Wagtail 224
Egretta garzetta 144
Egretta gularis 146
Egyptian Vulture 152
Eider 78
Elegant Tern 125
Eleonora's Falcon 171
Emberiza aureola 237
Emberiza caesia 236
Emberiza calandra 235
Emberiza cia 235
Emberiza cirrus 236
Emberiza citrinella 235
Emberiza hortulana 236
Emberiza leucocephalos
235
Emberiza melanocephala
237
Emberiza pusilla 236
Emberiza rustica 237
Emberiza schoeniclus 237
Emberiza schoeniclus
schoeniclus 237
Enganapastors 80
Erithacus rubecula 209
Escribano aureolado 237

Escribano cabeciblanco
235
Escribano cabecinegro 237
Escribano ceniciento 236
Escribano cerillo 235
Escribano hortelano 236
Escribano lapón 234
Escribano montesino 235
Escribano nival 60, 235
Escribano palustre 237
Escribano pigmeo 236
Escribano rústico 237
Escribano soteño 236
Escrufascons 109
Escrufascons becgròs
109
Escrufascons de Wilson
109
Esmerejón 171
Esmerla 171
Esparver 156
Espátula 142
Espátula africana 143
Esplugabous 147
Estornell 202
Estornell negre 203
Estornell rosat 202
Estornino negro 203
Estornino pinto 202
Estornino rosado 202
Estrilda astrild 220
Eudromias morinellus 100
Eurasian Bittern 143
Eurasian Blackcap 196
Eurasian Blue Tit 177
Eurasian Bullfinch 231
Eurasian Collared Dove 85
Eurasian Coot 87
Eurasian Crag Martin 182
Eurasian Dotterel 100
Eurasian Golden Oriole
173
Eurasian Hobby 172
Eurasian Hoopoe 165
Eurasian Jay 174
Eurasian Magpie 238
Eurasian Oystercatcher 96
Eurasian Penduline Tit 178

Eurasian Reed Warbler
194
Eurasian Scops Owl 164
Eurasian Siskin 234
Eurasian Skylark 178
Eurasian Sparrowhawk
156
Eurasian Spoonbill 142
Eurasian Stone-curlew 95
Eurasian Teal 73
Eurasian Tree Sparrow
219
Eurasian Whimbrel 105
Eurasian Wigeon 70
Eurasian Woodcock 107
Eurasian Wren 202
Eurasian Wryneck 168
European Bee-eater 167
European Golden Plover
99
European Goldfinch 233
European Greenfinch 231
European Herring Gull 129
European Honey Buzzard
152
European Pied Flycatcher
211
European Pied Flycatcher
212
European Robin 209
European Rock Pipit 229
European Roller 166
European Serin 233
European Stonechat 216
European Storm Petrel
134
European Turtle Dove 84

F

Faisà 79
Faisán 79
Falaropo picofino 109
Falaropo tricolor 109
Falcó 172
Falco biarmicus 52, 172
Falcó cama-roig 170
Falco cherrug 172
Falco columbarius 171

Falco eleonorae 171
Falcó llaner 52, 172
Falcó marí 171
Falco naumanni 169
Falco peregrinus bookei 172
Falcó sagrat 172
Falco subbuteo 172
Falco tinnunculus 169
Falco vespertinus 170
Falconet 172
Faloropo picogruesso 109
Falzia 81
Falzia pàl·lida 82
Falzia reial 81
Faraona 239
Ferrerico 178
Ferrerico blau 177
Ferrerico petit 177
Ferruginous Duck 77
Ficedula albicollis 56, 212
Ficedula hypoleuca 211
Ficedula hypoleuca iberiae 212
Ficedula parva 213
Ficedula semitorcuata 213
Fieldfare 206
Flamenc 94
Flamenc nan 47, 95
Flamenco comú 94
Flamenco enano 47, 95
Focha 87
Focha cornuda 89
Formiguer 168
Fotja 87
Fotja banyuda 89
Frailecillo 133
Fratricula arctica 133
Fringilla coelebs 229
Fringilla coelebs balearica 230
Fringilla montifringilla 230
Fuell 99
Fuell daurat americà 100
Fuell de collar 100
Fuell gris 99
Fuell siberià 100
Fulica atra 87

Fulica cristata 89
Fumarel aliblanco 124
Fumarel cariblanco 123
Fumarel comú 123
Fumarell 123
Fumarell alablanc 124
Fumarell carablanc 123

G

Gafarró 233
Gaig 174
Gaig blau 166
Galerida theklae 179
Gall faver 89
Gall faveret 89
Gallinago gallinago 108
Gallinago media 108
Gallinula chloropus 86
Ganso cisne 238
Garceta comú 144
Garceta dimorfa 146
Garceta grande 146
Garcilla bueyera 147
Garcilla cangrejera 146
Garden Warbler 196
Garganey 67
Garrulus glandarius 174
Garsa 238
Garsa de mar 96
Garza imperial 150
Garza real 148
Gavia arctica 134
Gavia immer 46, 134
Gavia stellata 134
Gavilán 156
Gavina 130
Gavina atlàntica 129
Gavina camagroga 129
Gavina capnegre 128
Gavina cendrosa 129
Gavina cendrosa 49
Gavina d'hivern 126
Gavina de bec prim 126
Gavina fosca 131, 132
Gavina roja, 127
Gavina tres-dits 126
Gavinó 126
Gavinot 129

Gavió 129
Gaviota argentea 129
Gaviota cabecinegra 128
Gaviota cana 49, 129
Gaviota de Audouin 127
Gaviota del Caspio 129
Gaviota enana 126
Gaviota patiamarilla 130
Gaviota picofina 126
Gaviota reidora 126
Gaviota sombría 131, 132
Gaviota tridàctila 126
Gelochelidon nilotica 122
Girapedres 115
Glareola nordmanni 121
Glareola pratincola 121
Glossy Ibis 141
Goldcrest 201
Golden Eagle 155
Golondrina comú 182
Golondrina daurica 187
Gorrió barraquer 219
Gorrió d'ala blanca 220
Gorrió de passa 219
Gorrió roquer 219
Gorrió teulader 219
Gorrió alpino 220
Gorrió chillón 219
Gorrió comú 219
Gorrió molinero 219
Gorrió moruno 219
Graja 176
Grajilla 176
Gralla 176
Gralla de bec groc 176
Gralla de bec vermell 176
Graul 176
Great Black-backed Gull 129
Great Bustard 91
Great Cormorant 139
Great Crested Grebe 92
Great Egret 146
Great Grey Shrike 176
Great Northern Diver 46, 134
Great Reed Warbler 193
Great Shearwater 136

Great Skua 133
Great Snipe 108
Great Spotted Cuckoo 83
Great Spotted
Woodpecker 168
Great Tit 178
Greater Flamingo 94
Greater Scaup 78
Greater Short-toed Lark
180
Greater Spotted Eagle 154
Greater White-fronted
Goose 64
Greater Yellowlegs 115
Green Sandpiper 110
Greenish Warbler 192
Grey Heron 148
Grey Plover 99
Grey Wagtail 224
Greylag Goose 64, 238
Griffon Vulture 153
Griseta, grisa 69
Griva daurada 203
Grívia, 204
Grua 90
Grulla 90
Grus grus 90
Guacamai ararauna 240
Guacamayo azul y
amarillo 240
Guàtlera 79
Guàtlera andalusa 91
Guàtlera maresa 86
Guatlereta de mar 121
Guatlereta de mar
alanegra 121
Guión de codornices 86
Gull-billed Tern 122
Gulosus aristotelis 141
Gyps fulvus 153

H

Haematopus ostralegus 96
Halcón borní 52, 172
Halcón de Eleonor 171
Halcón peregrino 172
Halcón sacre 172
Haliaeetus albicilla 163

Harris's Hawk 240
Havelda 78
Hawfinch 230
Helmeted Guineafowl 239
Hen Harrier 158
Herrerillo mallorquín 177
Híbrido de moretó x parda
76
Híbrido de Porrón común
76
Hieraetus pennatus 155
Himantopus himantopus
96
Hippolais icterina 195
Hippolais polyglotta 195
Hirundo rustica 182
Hooded Crow 177
Hoopoe Lark Alaemon 178
Horned Grebe 93
Hortolà 236
Hortolà blanc 235
Hortolà capblanc 235
Hortolà capnegre 237
Hortolà caranegra 237
Hortolà cellard 235
Hortolà cendrós 236
Hortolà de canyet 237
Hortolà de Lapònia 234
Hortolà groc 235
Hortolà menut 236
Hortolà rústic 237
House Sparrow 219
Hume's Leaf Warbler 189
Hyrobates monorhis 134
Hyrobates leucorhous
135
Hyrobates pelagicus 134
Hydrocoloeus minutus 126
Hydroprogne caspia 122

I

Iberian Chiffchaff 192
Iberian Green Woodpecker
168
Iberian Grey Shrike 174
Ibis negre 141
Ichthyaetus audouinii 127
Ichthyaetus melano-
cephalus 128

Icterine Warbler 195
Iduna caligata 194
Iduna opaca 194
Indian Peafowl 239
Idiot reial 239
Inseparable de Namibia
240
Isabelline Shrike 176
Isabelline Wheatear 218

J

Jack Snipe 107
Jilguero 233
Juia 103
Juia gregària 103
Jynx torquilla 168

K

Kentish Plover 104

L

Lanius collurio 175
Lanius excubitor 176
Lanius isabellinus 176
Lanius meridionalis 174
Lanius minor 176
Lanius nubicus 176
Lanius senator 174
Lanius senator badius 175
Lanius senator senator
175
Lanner Falcon 52, 172
Lapland Longspur 234
Larus argentatus 129
Larus cachinnans 129
Larus canis 49, 129
Larus fuscus 131
Larus fuscus graellsii 132
Larus fuscus intermedius
132
Larus marinus 129
Larus michahellis 130
Laughing Dove 85
Lavandera blanca 225
Lavandera boyera 221,
222, 223
Lavandera boyera balcàni-
ca 224

- Lavandera cascadeña 224
Lavandera cetrina 224
Lavandera de Chukotka 224
Leach's Storm-petrel 135
Lechuza campestre 165
Lesser Black-backed Gull 131, 132
Lesser Crested Tern 125
Lesser flamingo 47, 95
Lesser Grey Shrike 176
Lesser Kestrel 169
Lesser Scaup 78
Lesser Spotted Eagle 154
Lesser Spotted Woodpecker 168
Lesser White-fronted Goose 64
Lesser Whitethroat 197
Lesser Yellowlegs 113
Limnodromus scolopaceus 106
Limosa lapponica 106
Limosa limosa 106
Linaria cannabina 232
Little Bittern 143
Little Bunting 236
Little Bustard 85
Little Crake 90
Little Egret 144
Little Grebe 91
Little Gull 126
Little Ringed Plover 101
Little Stint 120
Little Tern 121
Llambritja 124
Llambritja bengalí 125
Llambritja de bec llarg 125
Llambritja de bec negre 122
Llambritja de bec vermell 122
Llambritja elegant 125
Llambritja menuda 121
Llambritja rosat 124
Lluçeta 233
Lluonet 234
Locustella luscinioides 195
Locustella naevia 195
Long-billed Dowitcher 106
Long-eared Owl 164
Long-tailed Duck 78
Long-tailed Jaeger 133
Long-tailed Tit 188
Loxia curvirostra 232
Lúgano 234
Lullula arborea 178
Luscinia megarhynchos 210
Luscinia svecica 210
Lymnocyptes minimus 107
- M**
- Mallard 71
Malvasía cabeciblanca 79
Mandarin Duck 239
Marbled Duck 74
Mareca penelope 70
Mareca strepera 69
Marmaronetta angustirostris 74
Marmora's Warbler 200
Marsh Sandpiper 112
Marsh Warbler 194
Martín pescador 166
Martinete 144
Mascarell 138
Mascarell bru 139
Masked Shrike 176
Meadow Pipit 226
Mediterranean Flycatcher 208
Mediterranean Flycatcher 209
Mediterranean Gull 128
Mediterranean Short-toed Lark 181
Melanitta fusca 78
Melanitta nigra 78
Melanocorypha bimaculata 180
Melanocorypha calandra 180
Melodious Warbler 195
Menjamosques de collar 56
Menjamosques de mig collar 213
Mergus serrator 78
Mèrlera 206
Mèrlera coablanca 218
Mèrlera vermella 214
Merlin 171
Merops apiaster 167
Merops persicus 167
Milà negre 161
Milà reial 160
Milano negro 161
Milano real 160
Miloca 152
Milvus migrans 161
Milvus milvus 160
Mirlo capiblanco 206
Mirlo común 206
Mistle Thrush 204
Mito 188
Moltoni's Warbler 198, 199
Monk Parakeet 173
Montagu's Harrier 159
Monticola saxatilis 214
Monticola solitarius 215
Montifringilla nivalis 220
Moretó buixot 78
Moretó capvermell 75
Moretó de collar 77
Moretó de plomall 77
Moretó menut 78
Morito 141
Morus bassanus 138
Mosquitero bilistado 52, 189
Mosquitero boreal 193
Mosquitero común 54, 191
Mosquitero común siberiano 192
Mosquitero de Hume 189
Mosquitero de Pallas 190
Mosquitero de Schwarz 190
Mosquitero ibérico 192
Mosquitero musical 190
Mosquitero papialbo 189

Mosquitero silbador 188
Mosquitero sombrío 52,
190
Mosquitero verdoso 192
Motacilla alba 225
Motacilla alba yarrellii 225
Motacilla cinerea 224
Motacilla citreola 224
Motacilla flava 221
Motacilla flava cinereocapi-
lla 222
Motacilla flava feldegg 224
Motacilla flava flava 222
Motacilla flava flavissima
222
Motacilla flava iberiae 223
Motacilla flava thunbergi
223
Motacilla tschutschensis
224
Moussier's Redstart 214
Moustached Warbler 193
Muscicapa striata striata
207
Muscicapa striata/thyrreni-
ca 208
Muscicapa tyrrhenica bale-
arica 208
Muscicapa tyrrhenica
tyrrhenica 209
Muscovy Duck 239
Mussol 164
Mussol banyut 164
Mussol emigrant 165
Mute Swan 65
Myiopsitta monachus 173

N

Negrón común 78
Negrón especulado 78
Neophron percnopterus
152
Netta peposaca 238
Netta rufina 75
Noneta 134
Noneta de Swinhoe 134
Noneta grossa 135
Northern Gannet 138

Northern Goshawk 157
Northern Lapwing 103
Northern Pintail 72
Northern Raven 177
Northern Shoveler 68
Northern Wheatear 217,
218
Numenius arquata 105
Numenius phaeopus 105
Numida meleagris 239
Nycticorax nycticorax 144
Nymphicus hollandicus
240
O
Oca carablanca petita 64
Oca carablanca. 64
Oca domestica 238
Oca galta blanca 64
Oca pradenca 64
Oca salvatge 64
Oenanthe deserti 218
Oenanthe hispanica 218
Oenanthe isabellina 218
Oenanthe leucura 218
Oenanthe melanoleuca
218
Oenanthe oenanthe 217
Oenanthe oenanthe
leucorhoa 218
Olive-backed Pipit 228
Oriol 173
Oriolus oriolus 173
Oronella 182
Oronella coa-rogenca 187
Oropéndola 173
Ortolan Bunting 236
Orval 144
Ostrero 96
Otis tarda 91
Otus scops 164
Oxyura leucocephala 79

P

Pacific Golden Plover 100
Págalo grande 133
Págalo parásito 133
Págalo pomarino 133
Págalo rabero 133

Pagaza piconegra 122
Pagaza piquirroja 122
Paíño boreal 135
Paíño de Swinhoe 134
Paíño europeo 134
Pájaro moscón 178
Pallas's Leaf Warbler 190
Pallid Harrier 159
Pallid Harrier 47
Pallid Swift 82
Paloma bravía 83
Paloma torcaz 84
Paloma zurita 84
Pandion haliaetus 151
Papamoscas acollarado 56
Papamoscas balear 208
Papamoscas cerrojillo
211, 212
Papamoscas collarino 212
Papamoscas gris 207
Papamoscas mediterráneo
208
Papamoscas gris
mediterráneo 209
Papamoscas papirrojo
213
Papamoscas semicollarino
213
Papamosques 207, 208,
209
Papamosques de collar
212
Papamosques menut 213
Papamosques negre 211,
212
Parabuteo unicinctus
harrisi 240
Paràsit coaample 133
Paràsit coallarg 133
Paràsit coapunxegut 133
Paràsit gros 133
Parasitic Jaeger 133
Parda 77
Pardela balear 137
Pardela capilotada 136
Pardela cenicienta atlànti-
ca 135

- Pardela cenicienta atlàn-
tica. 46
- Pardela cenicienta medi-
terrànea 135
- Pardela mediterrànea 136
- Pardillo comú 232
- Pardillo sizerín 232
- Parus major mallorcae 178
- Passaforadí 202
- Passer domesticus 219
- Passer hispaniolensis 219
- Passer montanus 219
- Pàssera 215
- Passerell 232
- Passerell carminat 231
- Passerell golanegre 232
- Passerell trompeter 231
- Pastor roseus 202
- Pato colorado 75
- Pato criollo domèstic 239
- Pato cuchara 68
- Pato mandarín 239
- Pato picaso 238
- Pavo cristatus 239
- Pavo real comú 239
- Pechiazul 210
- Pectoral Sandpiper 49,
121
- Pela-roques 202
- Pelecanus rufescens 240
- Pelica rosat 240
- Pelícano rosado 240
- Perdiu 80
- Perdiz roja 80
- Peregrine Falcon 172
- Periparus ater 177
- Pernis apivorus 152
- Petirrojo 209
- Petronia petronia 219
- Phalacrocorax carbo 139
- Phalaropus fulicarius 109
- Phalaropus lobatus 109
- Phalaropus tricolor 109
- Phasianus colchicus 79
- Phoeniconaias minor* 47,
95
- Phoenicopterus roseus 94
- Phoenicurus moussieri
214
- Phoenicurus ochruros 213
- Phoenicurus phoenicurus
213
- Phylloscopus bonelli 189
- Phylloscopus borealis 193
- Phylloscopus collybita 191
- Phylloscopus collybita
tristis 192
- Phylloscopus collybita tris-
tis* 54
- Phylloscopus fuscatus* 52,
190
- Phylloscopus humei 189
- Phylloscopus ibericus 192
- Phylloscopus inornatus
189
- Phylloscopus inornatus* 52
- Phylloscopus proregulus
190
- Phylloscopus schwarzi
190
- Phylloscopus sibilatrix 188
- Phylloscopus trochiloides
192
- Phylloscopus trochilus 190
- Pica pica 238
- Picaplatges camanegra
104
- Picaplatges gros 101
- Picaplatges petit 101
- Pico de coral 220
- Pico menor 168
- Pico picapinos 168
- Picogordo 230
- Picot gros 168
- Picot menut 168
- Picot verd 168
- Picus sharpei 168
- Pied Avocet 98
- Pine Bunting 235
- Pingdai 133
- Pingdai becfí 133
- Pinsà 229, 230
- Pinsà borroner 231
- Pinsà mè 230
- Pinsà trompeter* 58
- Pintada comú 239
- Pinzón real 230
- Pinzón vulgar 229, 230
- Pioc salvatge 91
- Piquero pardo 139
- Piquituerto 232
- Pito ibérico 168
- Platalea alba 143
- Platalea leucorodia 142
- Plectrophenax nivalis 235
- Plectrophenax nivalis* 60
- Plegadis falcinellus 141
- Pluvialis apricaria 99
- Pluvialis dominica 100
- Pluvialis fulva 100
- Pluvialis squatarola 99
- Podiceps auritus 93
- Podiceps cristatus 92
- Podiceps grisegena 92
- Podiceps nigricollis 93
- Polla d'aigua 86
- Polla de agua 86
- Polluela bastarda 90
- Polluela chica 47, 90
- Polluela pintoja 86
- Pomarine Jaeger 133
- Porphyrio alleni 89
- Porphyrio porphyrio 89
- Porrón bastardo 78
- Porrón bola 78
- Porrón comú 75
- Porrón de collar 77
- Porrón moñudo 77
- Porrón osculado 78
- Porrón pardo 77
- Porzana porzana 86
- Prunella collaris 220
- Prunella modularis 220
- Psittacula krameri 173
- Ptyonoprogne rupestris
182
- Puffinus mauretanicus 137
- Puffinus yelkouan 136
- Puput 165

Purple Heron 150
Purple Sandpiper 119
Pyrrhocorax graculus 176
Pyrrhocorax pyrrhocorax 176
Pyrrhula pyrrhula 231

R

Radde's Warbler 190
Rallus aquaticus 86
Rasclet menut 90
Rasclet petit 47
Rasclet pintat 86
Rascletó 90
Rascló 86
Rascón 86
Razorbill 133
Recurvirostra avosetta 98
Red Crossbill 232
Red Kite 160
Red Knot 116
Red Phalarope 109
Red-backed Shrike. 175
Red-billed Chough 176
Red-breasted Flycatcher 213
Red-breasted Merganser 78
Red-crested Pochard 75
Red-flanked Bluetail 211
Red-footed Falcon 170
Red-legged Partridge 80
Red-necked Grebe 92
Red-necked Nightjar 49, 80
Red-necked Phalarope 109
Red-rumped Swallow 187
Red-throated Loon 134
Red-throated Pipit 229
Redwing 205
Regulus ignicapilla 201
Regulus regulus 201
Reietó cellablanc 201
Reietó d'hivern 201

Remiz pendulinus 178
Reyezuelo listado 201
Reyezuelo sencillo 201
Richard's Pipit 226
Ring Ouzel 206
Ring-necked Duck 77
Riparia riparia 181
Rissa tridactyla 126
Rock Bunting 235
Rock Dove 83
Rock Sparrow 219
Rook 176
Roquero rojo 214
Roquero solitario 215
Rose-ringed Parakeet 173
Roseate Tern 124
Roseta 74
Rossinyol 210
Rossinyol bord 188
Rosy Starling 202
Rosy-billed Pochard 238
Rosy-faced Lovebird 240
Ruddy Shelduck 67
Ruddy Turnstone 115
Ruff 116
Rufous-tailed Scrub Robin 207
Ruiseñor bastardo 188
Ruiseñor coliazul 211
Ruiseñor común 210
Rupit 209
Rustic Bunting 237

S

Saker Falcon 172
Sand Martin 181
Sanderling 118
Sandwich Tern 125
Sardinian Warbler 197
Savi's Warbler 195
Saxicola maurus hemprichii 216
Saxicola maurus hemprichii 58
Saxicola rubetra 215
Saxicola rubicola 216
Scaly Thrush 203
Scolopax rusticola 107

Scopoli's Shearwater 135
Sebel·lí 95
Sedge Warbler 193
Sel·la del Baikal 239
Semicollared Flycatcher 213
Senyoreta 188
Serinus serinus 233
Serreta mediana 78
Setmesó 91
Shag 141
Short-eared Owl 165
Short-toed Snake Eagle 154
Siberian Stonechat 58, 216
Sibirionetta formosa 239
Siboc 49, 80
Sisó 85
Sisón 85
Siulador 70
Slender-billed Gull 126
Snow Bunting 260, 35
Sociable Lapwing 103
Sól·lera boscana 236
Sól·lera Triguero 235
Somateria mollissima 78
Somormujo cuellirrojo 92
Somormujo lavanco 92
Song Thrush 203
Soterí gris 92
Soterí gros 92
Soterí orellut 93
Spanish Sparrow 219
Spatula clypeata 68
Spatula discors 67
Spatula querquedula 67
Spectacled Warbler 200
Spilopelia senegalensis 85
Spinus spinus 234
Spotless Starling 203
Spotted Crane 86
Spotted Flycatcher 207

Spotted Flycatcher Medi-
terranean 208
Spotted Redshank 114
Squacco Heron 146
Stercorarius longicaudus
133
Stercorarius parasiticus
133
Stercorarius pomarinus
133
Stercorarius skua 133
Sterna dougallii 124
Sterna hirundo 124
Sternula albifrons 121
Stilt Sandpiper 116, 117
Stock Dove 84
Streptopelia decaocto 85
Streptopelia turtur 84
Sturnus unicolor 203
Sturnus vulgaris 202
Suís 143
Sula leucogaster 139
Swan Goose 238
Swinhoe's Storm-petrel
134
Sylvia atricapilla 196
Sylvia borin 196

T

Tachybaptus ruficollis 91
Tachymarptis melba 81
Tadorna ferruginea. 67
Tadorna tadorna. 65
Taiga Bean Goose 64
Tarabilla común 216
Tarabilla norteña 215
Tarabilla siberiana de
Hemprich 216
Tarabilla siberiana de
Hemprich 58
Tarro blanco 65
Tarro canelo 67
Tarsiger cyanurus 211
Tawny Pipit 226
Teixidor 178

Temminck's Stint 118
Terek Sandpiper 108
Terrera colinegra 178
Terrera común 180
Terrera marismeña 181
Terrola 180
Terrola coabarrada 178
Terrola de prat 181
Terrola del desert 178
Tetrax tetrax 85
Thalasseus bengalensis
125
Thalasseus elegans 125
Thalasseus sandvicensis
125
Thekla's Lark 179
Tichodroma muraria 202
Titina d'aigua 229
Titina d'arbre 227
Titina d'estiu 226
Titina de Hodgson 228
Titina de muntanya 229
Titina de Richard 58
Titina gola-roja 229
Titina grossa 226
Titina sorda 226
Torcecuello 168
Tord 203
Tord burell 206
Tord cellard 205
Tord flassader 206
Toret 146
Torillo 91
Tórtera del Senegal 85
Tórtera turca 85
Tórtola europea 84
Tórtola senegalesa 85
Tórtola turca 85
Tórtora 84
Totovia 178
Tree Pipit 227
Trenca 176
Trencapinyons 232
Treparriscos 202
Tringa erythropus 114
Tringa flavipes 113
Tringa glareola 112
Tringa melanoleuca 115

Tringa nebularia 114
Tringa ochropus 110
Tringa stagnatilis 112
Tringa totanus 113
Troglodytes troglodytes
202
Trumpeter Finch 231
Trumpeter Finch 58
Tudó 84
Tufted Duck 77
Tundra Swan 65
Turdus iliacus 205
Turdus merula 206
Turdus philomelos 203
Turdus pilaris 206
Turdus torquatus 206
Turdus viscivorus 204
Turnix sylvaticus 91
Tyto alba 163

U

Ull de bou 54, 191
Ull de bou fosc 52
Ull de bou boreal 193
Ull de bou cellard 189
Ull de bou de dues retxes
52
Ull de bou de Hume 189
Ull de bou de passa 190
Ull de bou de Schwarz 190
Ull de bou fosc 190
Ull de bou ibèric 192
Ull de bou pàl·lid 189
Ull de bou reietó 190
Ull de bou siberià 192
Ull de bou siulador 188
Ull de bou verdós 192
Upupa epops 165
Uria aalge 133
Urraca 238

V

Valona 112
Vanellus gregarius 103
Vanellus vanellus 103
Velvet Scoter 78
Vencejo común 81
Vencejo pàlido 82

Vencejo real 81
Verdecillo 233
Verderol 231
Verderón 231
Verderón serrano 233
Virot capnegre 136
Virot de llevant 136
Virot gros atlàntic 135
Virot gros atlàntic 46
Virot gros mediterrani 135
Virot petit 137
Vitrac 216
Vitrac barba-roig 215
Vitrac siberià de Hemprich
216
Vitrac siberià de Hemprich
58
Vultur lleonat 153
Vultur negre 154
Vuelvepedras 115

W

Wallcreeper 202
Water Pipit 229
Water Rail 86
Western Black-eared
Wheatear 218
Western Bonelli's Warbler
189
Western Cattle Egret 147
Western Jackdaw 176
Western Marsh Harrier
157
Western Olivaceous
Warbler 194
Western Orphean Warbler
197
Western Osprey 151
Western Reef Heron 146
Western Subalpine
Warbler 198
Western Swamphen 89
Western Yellow Wagtail
221, 222, 223, 224
Whinchat 215
Whiskered Tern 123
White Stork 138
White Wagtail 225

White-cheeked Pintail 239
White-headed Duck 79
White-rumped Sandpiper
120
White-winged Snowfinch
220
White-winged Tern 124
Whooper Swan 65
Willow Warbler 190
Wilson's Phalarope 109
Wood Sandpiper 112
Wood Warbler 188
Woodchat Shrike 174, 175
Woodlark 178

X

Xalambrí 220
Xalambrí de muntanya
220
Xàtxero 225
Xàtxero cendrós 224
Xàtxero citrí 224
Xàtxero de Txukotka 224
Xàtxero groc 221, 222,
223, 224
Xenus cinereus 108
Xivitona 109
Xivitona cendrosa 108
Xixell 84
Xoriguer 169
Xoriguer petit 169

Y

Yelkouan Shearwater 136
Yellow-billed Cuckoo 83
Yellow-breasted Bunting
237
Yellow-browed Warbler
52, 189
Yellow-legged Gull 130
Yellowhammer 235

Z

Zampullín chico 91
Zampullín cuellinegro 93
Zapornia parva 90
Zapornia pusilla 47, 90
Zarapito real 105

Zarapito trinador 105
Zarcero bereber 194
Zarcero común 195
Zarcero escita 194
Zarcero icterino 195
Zitting Cisticola 195
Zoothera dauma 203
Zorzal alirrojo 205
Zorzal charlo 204
Zorzal común 203
Zorzal Dorado 203
Zorzal real 206